

14.

M. Pic. (Digoïn-France):

NOUVELLES ESPÈCES DE COLÉOPTÈRES EXOTIQUES DU MUSÉUM
NATIONAL DE PRAGUE.

NOVÉ DRUHY EXOTICKÝCH BROUKŮ VE SBÍRKÁCH NÁRODNÍHO
MUSEA V PRAZE.

V této práci podány jsou diagnosy četných nových druhů Coleopter Národního Musea. Nové formy, zde popsané, přináležejí ponejvíce skupině *Heteromer*, poměrně velmi málo známé a studované. Zvláště zajímavé a cenné nové druhy nalezeny byly neúnavným a obětavým sběratelem a příznivcem entomologického oddělení Musea, panem Jaro Mrázem v São Paulu v Brasilii.

1° Coléoptères du Brésil.

Les Coleoptères, originaires du Brésil proviennent des récoltes de Mráz faites surtout à Sao Paulo et environs; les types uniques font partie des collections du Musée de Prague.

Chaulionotatus luteonotatus v. nov. Mrázi ♂.

Capite nigro, luteo notato; thorace opaco, luteo, in disco late nigro; scutello nigro; elytris luteis, ad basin et ad medium nigro maculatis, his parum nitidis diverse punctatis, subovalibus, humeris prominulis. Long. 10 mill. Sao Paulo.

Distinct, à première vue, de la forme type par les élytres 4 maculés de noir sur fond jaune.

Dromanthus atripennis n. sp. Oblongo-elongatus, postice paulo dilatatus, nitidus, griseo-fusco pubescens et hirsutus, niger, thorace flavo, in disco nigro vittato. Capite inter oculos triimpresso postice minute et sparse punctato; antennis dentatis, nigris articulo 1° apice et 2° rufescentibus; thorace brevi et robusto, antice attenuato, indistincte punctato; elytris parum elongatis, medicore punctatis et pro parte minute plicatis, apice subrotundatis et paulo impressis Long. 4, 5 mill. Rio de Janeiro. Voisin de *P. testaceicollis* Pic, s'en distingue par les élytres moins allongés, le prothorax nettement élargi en arrière et orné d'une bande médiane foncée.

Lobopoda Mrázi n. sp. Elongata subparallela nitida, sparse pubescens, nigro-piceo vage aenescens, elytris viridescentibus, membris pro parte rufis. Oculis parum distantibus; capite thoraceque fortiter et sparse punctatis, illo brevi postice triimpresso; elytris striato-punctatis, postero subcostulatis, intervallis sparse punctatis. Long. 8 mill. Sao Paulo.

Peut se placer près de *L. viridis* Chp. dont il diffère par la taille plus petite, les élytres moins atténués en arrière les tibias intermédiaires non arqués, etc.

Enneboeus ruficolor (1) n. sp. Subovatus, convexus, nitidus, luteo pubescens, rufus, oculis nigris. Capite fortiter sat dense punctato, inter oculos impresso, articulis 9—10 antennarum dilatatis, ultimo truncato, articulo 3° longissimo; thorace breve, antice attenuato, angulis anticis parum prominulis, medio sulcato, parum fortiter et sparse punctato; elytris

*) Cette espèce ainsi que *Lobopoda Mrázi*, *Strongylium Mrázi* figurent aussi dans la coll. Pic.

convexis, postice attenuatis, irregulariter et sparse punctatis. Long 4—5 mill. Sao Paulo.

Voisin de *E. uniformis* Chp. et très distinct par la coloration, la forme plus ovalaire, le revêtement pubescent non pruineux et les 3 derniers articles des antennes plus larges.

Mrázius nov. gen. Corpus robustum; capite valido, auriculis arcuatis munito, labro deplanato, arcuato, oculis minutis, integris, valde prominulis; articulo ultimo palparum triangulare; antennis elongatis apice paulo dilatatis, articulo ultimo subovato; thorace particulare, antice valte transverso, postice strangulato, lateraliter et antice marginato; élytris subglobosis, convexis lateraliter compressis humeris nullis; pedibus validis, intermediis et posticis valde distantibus tibiis anticis et intermediis valde arcuatis.¹⁾

Genre curieux, très caractérisé par la particulière structure de son prothorax et les épaules nulles. Ressemble, par le faciès général et la forme des élytres, à *Dicpethes arachnoides* Pascoe mais le prothorax est très différent de structure, les pattes intermédiaires et postérieures semblent plus éloignées entre elles.

Mrázius nodulosus n. sp. Subovatus, glaber, rufus et castaneus, membris rufis. Capite rufo, postice castaneo, fortiter et dense punctato; thorace castaneo, circa rufo, dense punctato et pro parte longitudinaliter plicato; élytris rufo-castaneis, convexis, lateraliter compressis et lineato punctatis, supra inaequalibus, antice foveatis aut plicatis, postice pro parte et breviter tuberculatis, apice declivibus et subacuminatis. Long. 5 mill. Sao Paulo.

Strongylium Mrázi n. sp. Angustatum, nitidum, glabrum, viridimetallicum, femoribus ad basin late testaceis. Antennis elongatis, satis latis, nigris, ad basin viridibus; capite dense punctatoplicato, oculis distantibus; thorace subquadrato, antice paulo attenuato, dense punctatoplicato, medio impresso; élytris thorace paulo latioribus, elongatis, postice attenuatis, fortiter striatofoveolatis, intervallis subcarinatis; tibiis parum validis, fere rectis. Long. 10—11 mill. Sao Paulo.

Peut se placer près de *S. annulipes* Mäkl, dont il diffère, à première vue, par la grosse ponctuation fovéolées des élytres.

Strongylium argentatum n. sp. Elongatum, nitidum, sparse et irregulariter et argenteo pubescens, nigro-piceum, supra metallicum, Antennis brevibus, validis; capite ruguloso, inter oculos impresso, oculis distantibus; thorace brevi, antice subrotundato, postice valde marginato, supra multi impresso; élytris thorace satis latioribus, apice subacuminato-rotundatis, inaequalibus, pro parte multi et diverse impressis et irregulariter plicatis; pedibus validis, tibiis anticis et posticis valde curvatis. Long. 9 mill. Sao Paulo.

Espèce distincte entre toutes par sa singulière structure multiimpressionnée, en même temps que sa pubescence argentée.

Strongylium brevemarginatum n. sp. Oblongo-elongatum, glabrum, nigro-piceum, membris élytris que rufescentibus. Antennis elongatis, satis gracilibus; capite thoraceque dense punctato, subopacis; oculis satis distantibus; thorace brevi, lateraliter subarcuato, antice et postice valde marginato, lateraliter postice minute marginato; élytris thorace valde latioribus, convexis, postice attenuatis et subacuminato-rotundatis, lieato foveolatis, foveis elongatis aut subrotundatis, in fundo

*) Je n'ai pas examiné le dessous du corps de l'exemplaire unique collé.

biplicatis, postice pro parte et irregulariter junctis; tibiis elongatis, anticis brevioribus, paulo curvatis. Long. 12 mill. Sao Paulo.

Peut se placer près de *S. Sahlbergi* Mäkl., en diffère par la coloration non métallique et le prothorax non tuberculé latéralement.

Mordellistena Mrázín. sp. Angustata, nitida, griseo pubescens, pallido-testacea, thorace, infra corpore pro parte, elytris ad suturam et lateraliter antice et sulcis membrarum nigris. Capite lato, antennis brevibus; thorace subquadrato, sparse punctato; scutello magno, rufescente; elytris thorace non latioribus, elongatis, postice attenuatis, apice subrotundatis, sparse granuloso-punctatis; tibiis posticis breve nigro quadri sulcatis, sulco 1^o interno, ceteris externis, his parum obliquiis; infra corpore testaceo, pectore pro parte et abdomine medio nigris, pygidio paulo rufescente, longissimo, apice non truncato. Long. 4 mill. Sao Paulo.

A placer près de *M. mutabilis* Chp., mais pattes postérieures moins robustes, testacées et coloration élytrale particulière, ces organes étant ornés antérieurement, sur fond clair, d'une bande suturale, rétrécie postérieurement et d'une bande latérale plus longue, à contours irréguliers, celles-ci noires.

Stenotarsus bicoloriceps n. sp. Subovatus, nitidus, luteo pubescens et pro parte hirsutus, rufus, capite antice, palpis antennisque nigris, his ad basin rufis. Articulis 3—8 antennarum subglobulosis, lato obconico, 10. breve et transverso, ultimo subovato; thorace breve et lato, lateraliter subarcuato, valde marginato, medio convexo, parum punctato, elytris subovatis, apice paulo attenuatis, irregulariter pro parte sat fortiter punctatis humeris prominulis. Long. 3 mill. Sao Paulo.

Voisin de *S. minutus* Gerst. en diffère, à première vue, par les antennes rousses à la base et la tête antérieurement foncée.

2^o Insectes de Madagascar.

Les trois nouveautés ci-dessous décrites font partie des collections du Musée de Prague; *Cacoplesia* Nikerli figure aussi dans ma collection.

Nemostira cyanipennis (nov.) Angustata, nitida, pro parte longe pilosa, nigra, capite antice et membris rufis, antennis ad medium pallidioribus. Thorace subcaeruleo, sat elongato, subalutaceo, pro parte et irregulariter punctato; elytris cyaneis, striatocrenulatis, intervallis angustatis, sparse punctato-foveolatis et pilosis. Long. 3 mill. Madagascar.

Distinct de *N. janthinipennis* Frm. par le corps allongé, la disposition de la pubescence, celle-ci rappelle celle de *N. striatopunctata* Frm. (ex description) dont cette nouveauté pourrait bien être qu'une simple variété à coloration foncée.

Nemostira striatipennis v. nov. reductelineata. Elongata, nitida, fere glabra, nigro-picea, capite antice membrisque testacis, femoribus brunneo notatis. Capite elongato, alutaceo; thorace satis brevi, alutaceo, minute punctato, postice testaceo marginato; elytris parum latis, minute striatopunctatis, intervallis satis latis, subconvexis, minute punctatis, his postice testaceo marginatis, ad humeros testaceo notatis, in disco testaceo lineatis. Long. 10 mill. Madagaskar.

Très distinct de *N. striatipennis* Pic par la tête longue et la coloration, notamment par le 5ème intervalle des élytres, en partie testacé.

Cacoplesia Nickerli n. sp. Oblongo-elongata, parum nitida, glabra, rufa, thorace cyaneo, elytris purpureis, pro parte viridi tinctis, lateraliter diverse coloratis, striis viridibus. Capite fortiter parum sparse punctato, antice impresso; antennis elongatis, articulis 3—4 fere aequalibus; thorace breve, lateraliter subarcuato, subalutaceo, fortiter sat sparse punctato; elytris subparallelis, apice attenuatis, humeris paulo prominulis, striato punctatis, intervallis subconvexis. Long. 8 mill. Madagascar.

Peut se placer près de *C. aenescens* Frm., coloration du dessus différente et dessous non bleuté.

3° Coléoptères exotiques nouveaux.

Les Coléoptères faisant l'objet de cet article appartiennent au Musée de Prague.

Scirtes Nickerli n. sp.

Subovatus, postice attenuatus, nitidus, griseo pubescens et pro parte hirsutus, rufo-testaceus, membris elytrisque pallidioribus, sutura antennisque apice brunneis.

Subovalaire, atténué postérieurement, brillant, orné d'une pubescence grise en partie redressée, roux testacé avec les membres et les élytres plus clairs, suture étroitement rembrunie ainsi que le sommet des antennes. Tête peu densément ponctuée, large, yeux petits, très distants; antennes à 2. article épaissi, 3. étroit et long, de la longueur du 4.; prothorax court et très transversal, à ponctuation fine, un peu écartée; écusson triangulaire; élytres un peu plus larges que le prothorax, relativement courts, nettement atténués à l'extrémité, à ponctuation plus forte que celle du prothorax, peu écartée. Long. 2 mill. environ. Afrique: Linokana (ex coll. Nickerl).

Voisin de *S. nitidus* Pic, en diffère à première vue, par la suture rembrunie.

Anthicus Brýdli n. sp. ♂.

Oblongo-elongatus, nitidus, griseo pubescens, niger, coxis testaceis,

Oblong-allongé, brillant, revêtu d'une pubescence grise fine, noir, hanches testacées. Tête large, peu courte, tronquée postérieurement, à ponctuation forte et rapprochée; prothorax court et large, dilaté et subarrondi en avant, à peu près de la largeur de la tête, rebordé à la base, faiblement impressionné sur les côtés en arrière, assez fortement et densément ponctué; élytres nettement plus larges que le prothorax, pas très longs, subparallèles sur les côtés, subtronqués au sommet avec une petite dent médiane apicale, à ponctuation pas très fine, espacée, épaules arrondies; pattes foncées, base des tibias rembrunie. Long. 3 mill. environ. N. V. Afrique: Mosamborika (ex coll. Brýdl).

Voisin de *A. Babaulti* Pic, en diffère par la tête moins courte, nettement tronquée en arrière et plus fortement ponctuée, les pattes plus foncées.

Mordella Gounellei v. nov. *latejuncta*.

Cette variété, originaire du Brésil et de la coll. Brýdl., se distingue de la forme type par le corps robuste, la pubescence blanche largement étendue sur tout le milieu des élytres avec, au milieu de celle-ci, un petit point noir de chaque côté et derrière l'écusson ainsi qu'une macule postmédiane externe, jointe à la bordure latérale noire, entaillant fortement la pubescence grise, tandis que le sommet des élytres est largement noir.

Pyrogaster hecticus v. nov. *atriventris*.

Elongatus et *parum robustus*, *niger*, thorace circa late elytrisque rufo-testaceis, abdomine apice cereo. Long. 17 mill. Costa-Rica (ex coll. Brýdl.)

Diffère au moins de *P. hecticus* F. par l'abdomen, moins son sommet, noir.

Discodon nigripes v. nov. *atrocephalus*.

Niger, thorace, scutello elytrisque ochraceis, capite ante oculos albo notato. Mexique: Cuernavaca (ex coll. Brýdl.).

Diffère à première vue, de la forme type par la tête noire, sauf en avant des yeux.

Chauliognathus Haversii v. nov. Brýdli.

Parum elongatus, fere *opacus*, elytris postice attenuatis, *nigris*, ad medium flavo fasciatis; thorace rufo, idisco immaculto, antice nigro marginato. Brésil (ex coll. Brýdl.).

C. Haversii Wat. est décrit comme ayant le prothorax ocré et maculé de noir sur son milieu.

Chauliognathus maculaticeps n. sp.

Angustatus, subparallelus, *opacus*, pro parte rufus, pro parte *niger*, supra rufus, capite nigro bimaculato, elytris elongatis, granulatis, *nigris*, antice flavo marginatis et ad humeros rufo maculatis.

Étroit, subparallèle, opaque, dessous du corps roux avec la poitrine maculée de foncé et l'abdomen noir, dessus roux avec la tête bimaculée de noir entre les yeux; les élytres noirs, à étroite bordure suturale et latérale, effacée à l'extrémité, flave et macule humérale rousse, membres bicolores. Tête courte et assez large, yeux très saillants, antennes filiformes, longues, presque entièrement noires; prothorax peu transversal, arqué en avant, échancré en arrière; élytres peu plus larges que le prothorax, longs, atténués à l'extrémité, ornés de petites granulations brillantes assez espacées; pattes en partie testacées et en partie rembrunies, longues, surtout les postérieures, cuisses et tibias postérieurs un peu courbés. Long. 10 mill. Brésil (ex coll. Brýdl.).

Espèce très caractérisée par sa coloration jointe à la forme allongée et les granulations des élytres; peut se placer près de *C. circumdatus* Blanch.

Hymenorus nigronotatus n. sp.

Elongatus, *parum nitidus*, sparse griseo pubescens, rufus, membris elytrisque apice pallidioribus, elytris signaturis *nigris* ornatis.

Allongé, subparallèle, peu brillant, éparsément pubescent de gris, roux avec les membres et le sommet des élytres plus clairs, un peu flaves, les cuisses étant vaguement tachées de brunâtre au sommet et le prothorax en partie rembruni sur son milieu. Tête avec les yeux à peu près de la largeur du prothorax, à ponctuation forte, seulement dense derrière les yeux; antennes (cassées), à premiers articles flaves; prothorax pas très court, un peu rétréci en avant, droit sur les côtés postérieurs, à ponctuation forte et rapprochée, marqué postérieurement de très petites impressions; élytres peu plus larges que le prothorax, longs, parallèles, courtement atténués à l'extrémité, striés, les striés bordés, de chaque côté, de points assez gros et peu réguliers, ornés des dessins noirs suivants; une bande latérale joignant les épipleures, ceux-ci roux, allant des épaules au delà du milieu et joignant, à son extrémité, une fascie transversale ondulée dentée, en outre, avant le sommet et sur le disque, une sorte de fascie raccourcie circonflexe, faite de 3 macules jointes; cuisses un peu

épaissies, tibias amincis, ou un peu courbés, à la base. Long. 8 mill. Brésil: Sao Paulo (ex Mráz).

Espèce distincte entre toutes par ses élytres à dessins noirs; par sa forme se rapproche de *H. tarsalis* Chp.

Strongylium ornatum v. nov. *subelongatum*.

Oblongo-elongatum, nigrum, elytris signaturis flavis ornatis, ore abdomineque rufis. Long. 11 mill. Brésil: Sao Paulo (Mráz).

Distinct de la forme type par le ventre entièrement roux et les dessins élytraux différents présentant, sur fond noir, les dessins flaves suivants; une bordure basale suturale antérieure et latérale presque complète, deux macules antérieures jointes, l'interne à la bordure suturale, l'externe à la bordure latérale, une sorte de lunule ouverte en arrière, ondulée antérieurement, celle-ci en dessous du milieu.