

15.

*Julien Achard:*DESCRIPTIONS DE TROIS VARIÉTÉS NOUVELLES DU GENRE  
SCAPHIDIOLUM ACHARD.

(Col. Scaphidiidae.)

*Scaphidiolum lunatum* Motch.

Cette espèce, brièvement décrite comme provenant du continent indien, semble assez commune en Birmanie et Tenasserim.

M. Pic en a décrit deux variétés. L' une, var. *inconjunctum* Pic, ayant la lunule rouge divisée en deux parties, ne se rencontre qu' exceptionnellement; mais on trouve fréquemment des individus chez lesquels les dilata-tions antérieure et postérieure de la lunule ne sont réunies que par un mince filet rectiligne. La seconde, var. *rufithorax* Pic, caractérisée par le pronotum rufescent et les lunules élytrales flaves, concerne les individus qui, sans être précisément immatures, n' ont pas encore pris toute leur coloration; on en trouve souvent qui ont non seulement le prothorax, mais encore tout le dessous rufescent et les pattes rougeâtres.

Var. *bioculatum* n. var. — Extrémités internes de la lunule élytrale dilatées et réunies le long de la suture, isolant ainsi une macule noire arrondie sur le disque de chaque élytre.

Tenasserim (Helfer). — Coll. J. Achard et Mus. Prag.

*Scaphidiolum longithorax* Pic.

Cette espèce est décrite de Bornéo: Kina-Balu. Elle se retrouve à Brunei et Martapoera (Doherty) et à Malacca: Perak (Doherty), Singapour (Ridley). Les individus de Perak sont semblables à ceux de Bornéo, mais ceux de Singapour ont la coloration noire du pronotum et des élytres plus étendue; les macules antérieures des élytres sont aussi plus étendues.

Var. *nigriventre* n. var. — Dessus semblable à la forme typique de Bornéo, avec les macules antérieures plus arrondies. Dessous entièrement noir, ainsi que le pygidium et le progydium. Ponctuation des élytres plus forte.

Singapour (Ridley). — Coll. J. Achard et British Museum.

*Scaphidiolum grande* Gestro.

Les individus de cette espèce provenant du continent semblent en général être plus petits et plus atténués en arrière que la forme typique de Bornéo. Ils sont quelquefois aussi un peu plus fortement ponctués et enfin ont tendance à perdre l' anneau rouge des quatre fémurs postérieurs.

Var. *melanopus* n. var. — Quatre fémurs postérieurs entièrement noirs. —

Haut Laos (Vitalis). — Assam: Khasis. — Coll. J. Achard, British Museum.

Cette variété peut, à première vue, se confondre facilement avec le *S. anthrax* Achard, de Java.