

## 16.

Dr. Jan Obenberger — Praha.

DE BUPRESTIDARUM SPECIEBUS NOVIS. (Diagnoses praeliminares.)  
NOVÉ DRUHY ČELEDI KRASCŮ (COL.)

V této práci podávám krátké diagnosy nových druhů a variet čeledi krasců, jež se průběhem času nahromadily v mé sbírce, tvořící součást sbírek Národního Musea v Praze. Dosavadní zeměpisné znalosti tropů jsou namnoze značně kusé a hmyz exotický přichází většinou z určitého počtu stereotypních lokalit. Dnes, kdy kultura evropská spolu s komunikačními prostředky nové doby vniká nezadržitelně do dosud uzavřených krajů tropů Starého i Nového světa, otevírá se sběratelské a badatelské činnosti celý svět dosud nepřístupných končin, odkud již teď přicházejí zvolna první sběry, jež nejprve ovšem přijdou na pracovní stůl specialistův. Tak v posledním čase byl jsem požádán o vědeckou konsultaci a determinaci většinou evropských muzeí a velkých firem i různými soukromými odborníky, kteří zaslali mi celé řady dosud neznámých forem. Za svou námahu osobní dostávám doublety druhů mne zajímajících, jež neustále pak doplňují mou sbírku, takže všechny typy druhů zde i jinde mnou popsanych jsou takto majetkem Národního Musea, jež touto cestou, spojenou ovšem se soukromou námahou v mimořádném čase, již posouditi dovede jen zapracovaný odborník, z toho nejzajímavějšího všech těch sběrů dostane — to nejkrásnější a nejvzácnější.

1. *Sternocera Hildebrandti* ssp. *elytralis* m. n. ssp.

Hab.: Usambara.

A typo sculptura elytrorum oblitterata ac elytris dimidio antico ochraceis, postice sensim brunneo-rubris differt.

2. *Sternocera orissa* ssp. *Benguellae* m. n. ssp.

Hab.: Angola-Benguella.

Ornamentatione elytrorum uti apud orissam Buquet, sed impressionibus illis albo, longius ac suberecte pilosis. Superficie nigra, nitida, multo subtilius quam apud orissam punctata, pronoto sparse ac minutissime punctato, nitido, plagis lateralibus magnis. Corpore quam apud orissam nitidiore ac latiore, minus postice acuminato.

3. *Sternocera monacha* ssp. *parviplagis* m. n. ssp.

Hab.: Usumbara.

Formae typicae similis, cyanea, sed plagis lateralibus thoracis multo minoribus, multo fortius ad latera reductis itaque spatio illo medio triangulari multo maiore differens. Plagis illis lateribus desuper haud visibilibus.

Subspecies haec parum variabilis mihi videtur; exemplaria multa cum forma typica comparare potui.

4. *Acmaeodera Bruchi* m. n. sp.

Hab.: Argentina, Sta Elena (Reimoser-Carlos Bruch). Long.: 6.5 mm.

Lat.: 2 mm.

Pertinet ad sectionem »*Emarginatae*« sensu Kerremans.

Nigra, nitida, longiuscula, haud fortiter convexa. Elytris ochraceis, fere

uti apud *A. adspersulam* Ill. marmoratis. Corpore toto pube tenui, regulari, sparsa, longa, erecta, albida tecto. Capite cellis hexagonalibus regulariter tecto; fronte inter oculos longitudine haud latiori. Antennis tenuibus ac satis longis. Thorace longitudine  $1\frac{1}{2}$  latiori, lateribus ad basim minus fortiter, ad anticem fortiter rotundatis; latitudinem maximam in parte basali tertia attingente; basi utrimque impressione punctiformi parva; superficie punctis latis celliformibus regulariter tecta. Elytris usque ad partem tertiam apicalem subparallelis, incisione laterali humerali nulla, ad apicem longe ac haud fortiter rotundatim attenuatis, grosse ac dense seriatim striato punctatis, apice denticulatis. Corpore subtus nitido, sparse albopiloso. Segmento apicali lateribus levibus. Pedibus satis longis, nigris.

Honorandi causa amici clari domini Carlos Bruch, Musaei de la Plata denominata. Typi in collectione mea ac in illa D. Carlos Bruch. Species haec maxime illae *A. meridionalis* Kerr. affinis esse mihi videtur.

##### 5. *Acmaeodera philippinensis* m. n. sp.

Hab.: Philippines. Long.: 7 mm. Lat.: 2 mm.

Speciei *A. Luzonica* Nonfried valde affinis, eodem colore ac ab ea, uti sequitur divergens: Corpore minus convexo, minore, depressiusculo, magis subparallelo. Fronte minus lata. Thorace lateribus multo minus fortiter rotundatis, in parte basali media fere parallelo, punctis duplo maioribus magisque sparsis tecto, disco minus fortiter convexo. Elytris plus parallelis, parum fortiter punctatis, nigris, solum in medio longitudinis macula laterali rubra ornatis, margine basali ac laterali nigro.

##### 6. *Acmaeodera beharensis* m. n. sp.

Hab.: India orientalis: Behar. Long.: 9.4 mm. Lat.: 2.8 mm.

Forma speciei *A. Luzonica* Nonfried similis, supra (lateraliter observata) convexa, apice subdeclivis, subtus recta. Nigra nitida, pube albida sparsissime ac haud satis distincte antice ac postice tecta. Capite parvo, convexo, linea media nulla; fronte inter oculos subparallela, latitudine distincte longiore, punctis rotundis celliformibus tecta. Thorace longitudine fere  $1\frac{3}{4}$  latiori, in medio latitudinem maximam attingente, lateribus ad anticem fortiter, ad basim leviter rotundatim attenuatis; disco subconvexo, impressione nulla, sparsim, simpliciter ac satis fortiter punctato, nitido. Elytris uti apud *A. Luzonicam* Nonfried formatis, 10. striatopunctatis, interstitiis minute uniseriatim punctatis; striis regularibus; ncisione laterali forti, uti apud *Luzonicam* formatis, interstitiis haud convexis. Elytris nigris, universis luteo 12. maculatis, uti sequitur: 1. macula parva rotundata basali utrimque apud suturam posita. 2. vitta brevi basali laterali subhumerali. 3. macula parva rotunda in quarta parte anteriori in medio elytri posita. 5. fascia obliqua simili, in parte suturali interrupta, in tertia parte apicali. 6. Macula praeapicali rotunda parva. Corpore subtus nigro, nitido, albido longe piloso.

##### 7. *Acmaeodera pinguicula* m. n. sp.

Hab.: Madagascar. Long.: 9 mm. Lat.: 3 mm.

Speciei *sparsuta* Fairm. similis ac valde affinis.

Nigra, corpore fere glabro, solum fronte ac thoracis lateribus pilis aliquot albidis ornata. Fronte parallela (apud *sparsutam* lateribus leviter

rotundatis), spatio interoculari latitudine paullulo longiori. Thorace uti apud *s p a r s u t a m* formato, paullulo latiori ac ad basim parum attenuato, punctis densis ac minoribus tecto. Elytris amplis, latitudine  $2\frac{1}{4}$  longioribus, uti apud *s p a r s u t a m* formatis, sed striarum interstitiis convexioribus, striis, imprimis antice profundioribus. Colore elytrorum valde differente: elytris rubrotestaceis, basi late transverse nigromarginata, macula ante medium triangulari angulo antico acuto cum illo margine nigro conjuncta, fascia in tertia parte apicali lata, transversa, recta, latera huad attingente ac cum illa triangulari in sutura conjuncta, fasciaque transversa praeapicali ac macula suturali ibidem formam *T* efficientibus, illis maculis omnibus nigris.

#### 8. *Acmaeodera howa* m. n. sp.

Hab.: Madagascar. Long.: 9.8 mm. Lat.: 3 mm.

Speciei *s p a r s u t a* Frm. affinis.

Nigra nitida, unicolor; corporis subtus ac elytrorum lateribus pube albida squammulosa adhaerenti vage tectis. Capite haud convexo, spatio interoculari frontis longitudinis parum latiore, simpliciter punctato. Thorace uti apud *s p a r s u t a m* formato, satis dense, satis subtiliter punctato. Elytris forma generali illis *s p a r s u t a e* similibus, sed apice valde longioribus ac acuminatis; elytrorum striis haud profunde impressis, antice in punctura interstitiali evanescentibus. Interstitiis dense ac satis fortiter (fere uti prothorax) punctatis.

#### 9. *Acmaeodera insolita* m. n. sp.

Hab.: Cap Bonae Spei. Long.: 7 mm. Lat.: 1.8 mm.

*Acmaeoderae gracili* Wied. similis ac affinis. Nigra, haud nitida, punctulata, fere glabra, pilis aliquot in capite ac thorace, pilorumque seriis haud distinctis elytrorum tenuibus ac sparsis. Elongata, formae *A. gracilis*, subparallela satis convexa. Capite parum convexo, simpliciter minute punctato, spatio interoculari parallelo quadrato, impressione nulla. Thorace longitudine  $1\frac{1}{2}$  latiore, lateribus leviter rotundatis, in medio latitudinem maximam attingente, ad basim leviter, ad anticem fortius rotundatim attenuato. Superficie dense regulariterque granulosa, lateribus indistincte longitudinaliter rugulosis. Elytris latitudine fere  $2\frac{1}{4}$  longioribus, usque ad partem apicalem tertiam parallelis, leviter convexis, dein ad apicem rotundatim attenuatis ac minute denticulatis. Incisione humerolaterali fere indistincta. Elytris striato punctatis, striis postice profunde impressis, tenuibus, antice in punctis densis satis magnis evanescentibus nigris; lateribus totaliter satis late rufotestaceo marginatis. Corpore subtus, pedibusque nigris.

#### 10. *Acmaeodera Boviei* m. n. sp.

Hab.: Congo belge; Elisabethville — IV. 1914 (M. Bovie) Long.: 5 mm. Lat.: 1.4 mm.

Elongatula, subparallela, corpore fere glabro, solum subtus abdomine squammulis aliquot albidis. Nigroaenea, haud fortiter convexa. Capite glabro, pilis solum aliquot albidis indistinctissimis tecto, sculptura satis grossa celliformi subumbilicata; spatio interoculari parallelo ac quadrato. Thorace satis leviter convexo, paullo pone medio latitudinem maximam attingente, longitudine  $1\frac{1}{2}$  latiore, lateribus satis fortiter rotundatis, ad anticem fortius quam ad basim rotundatim attenuatis, ante angulis basa-

libus leviter constrictis; utrimque in basi impressione punctiformi parva. Sculptura thoracis satis grossa ac aequali celliformi ac satis elevata, haud rugosa. Elytris usque ad tertiam partem apicalem subparallelis, dein ad apicem rotundatim attenuatis, apice denticulato; humeris distincte prominulis; superficie decemstriata, interstitus uniseriatim, antice minute, ad apicem versus gradatim fortiter punctatis, striis in parte apicali fortius impressis. Interstitiis haud convexis, in parte humerali subrugosis. Incisione laterohumerali laevi. Elytris nigroviolaceis, plaga laterali subhumerali elongata utrimque ochracea, punctis aliquot parvis irregularibus in medio ac ante apicem luteis; colore hoc ochraceo satis variabili.

In honorem domini Cl. Bovie, qui speciem hanc mihi donavit, denominata.

**11. *Acmaeodera Boviei* var. *simiola* m. n. var.**

Hab.: Congo belge.

A forma typica colore elytrorum differt. Elytris nigris, vitta obliqua tenui postmediana, in parte suturali interrupta ac ad anticem convergente, maculaque subtransversa praeapicali utrinque luteis ornatis.

**12. *Acmaeodera Angolae* m. n. sp.**

Hab.: Angola. Long.: 9 mm. Lat.: 3 mm.

Nigra, satis nitida. Elytris nigris, paullo cyanescentibus, rubro ornatis. Superficie fere glabra, solum thorace ac capite pilis aliquot brevius ac erectis, sparsis, albidis ornata. Capite parum convexo, spatio interoculari frontis latitudine haud longiore; fronte sculptura celliformi satis minuta tecto. Thorace paullo declivi ad anticem, elytra paullo latitudine superante, summum latitudinis in quarta parte basali attingente, dein ad apicem fortiter ac rotundatim, ad basim oblique, subsinuatim attenuato. Superficie sculptura densa celliformi inaequali, subrugosula nitida ornato. Elytris ad apicem versus fortiter declivibus, forma illis speciei *grata* Wahlb. haud diffinibus; incisione laterohumerali distincta ac satis forti, humeris paullo prominulis; elytris usque ad tertiam partem apicalem subparallelis, lateribus subcrenulatis, dein ad apicem satis longe rotundatim attenuatis ac denticulatis; elytris regulariter, fortiter punctato-striatis, interstitiis in parte apicali subcarinatis ac tenuibus, striis ibidem profundioribus; interstitiis uniseriatim punctatis, antice, ad humeros transverse subrugosis, sculptura ibi fortiori. Margine laterali usque ad medium longitudinis haud late rubromarginato; in medio vitta arcuata subtransversa, lateraliter cum illo margine iuncta ac in parte anteriori cum sutura parallela ornatis; fasciaque dein in quarta parte apicali lata transversa, antice flexuosa ac fascia simili transversa praeapicali brevi rubris.

**13. *Acmaeodera glabella* m. n. sp.**

Hab.: Transvasal. Long.: 5 mm. Lat.: 1.4 mm.

Nitida, glabra, nigra. Corpore elongatulo, tenui, supra haud fortiter convexo. Capite satis lato, medio late depressiusculo, spatio interoculari parallelo, longitudine parum latiori, cellis rotundis haud magnis aequaliter tecto. Thorace latitudine illam elytrorum parum superante, longitudine  $1\frac{1}{2}$  latiori, summam latitudinis in parte basali tertia attingente, lateribus (ad anticem fortius) rotundatis, superficie sculptura cellarum pentagonalium satis elevata, haud densa ac aequali tecta. Elytris parallelis, postice parum declivibus, a tertia parte apicali ad anticem attenuatis ac denticulatis, fortiter striatopunctatis, interstitiis etiam postice convexis, tenuibus,



impunctatis, sed crenulatum granulosis, quae sculptura ad latera ac in parte humerali fortior ac subrugulosa fit. Incisione humerali haud forti. Corpore subtus nigro, nitido.

**14. *Acmaeodera Braunsi* m. n. sp.**

Hab.: Capland: Willowmore. MUDr. H. Brauns. Long.: 7·2 mm. Lat.: 2 mm.

Nigra nitida; corpore toto pilis sparsis aequalibus, erectis ac curvatis, nigrescentibus aequaliter tecta. Capite convexo, dense piloso, spatio interoculari latitudine paullo longiori, lateribus ad anticem levissime convergentibus. Thorace longitudine  $1\frac{3}{4}$  latiore, summum latitudinis in medio attingente, lateribus rotundatis, disco haud fortiter convexo, in medio haud profunde simpliciter, satis late punctato, sculptura laterali longitudinali ac subrugosa. Elytris dorso subdeplanatis, subparallelis, a tertia parte apicali ad apicem satis fortiter ac breviter rotundatim attenuatis ac denticulatis, ad apicem haud fortiter declivibus. Incisione laterali fere nulla. Superficie regulariter ac haud profunde striata, interstitiis simplicibus, haud convexis; uniserialiter punctatis, punctis illis setigeris. Elytris pallide 10 maculatis, maculis illis parvis ac uti sequitur dispositis: 1. maculae quattuor in seriebus duis in interstitio 3 et 4; macula prima basali, secunda in quarta parte basali, tertia in medio longitudinis, quarta in tertia parte apicali positae. 2. duabus maculis minoribus lateralibus — prima post longitudinis dimidio, secunda in parte apicali tertia posita.

In honorem Dom. clari MUDr. H. Brauns denominata.

**15. *Acmaeodera longicrinis* m. n. sp.**

Hab.: Transvaal. Long.: 6 mm. Lat.: 1·5 mm.

Nigra, satis nitida, thorace paullo cyanescente, elytris leviter violascentibus. Superficie tota pube sparsa longa, molli, tenui, brunneonigra tecta; fronte solum ac corpore subtus albidopiloso. Elongata, subparallela, satis convexa. Capite fortiter punctato, subconvexo, spatio interoculari frontis parallelo ac quadrato. Thorace longitudine fere  $1\frac{1}{2}$  latiore, summum latitudinis in medio attingente, lateribus satis fortiter rotundatis. Superficie tota punctis grossis celliformibus tecta. Elytris subparallelis, a tertia parte apicali ad apicem satis breviter ac fortiter attenuatis, incisione laterali minuta; superficie tota seriebus punctorum maximorum ac profundorum dense tecta. Elytris fascia interrupta irregulari tenui subbasali, fascia obliqua tenui in longitudinis dimidio ac fascia tenui recta praeapicali pallidis ornatis.

**16. *Acmaeodera Holubi* m. n. sp.**

Hab.: Transvaal. Long.: 6·2 mm. Lat.: 1·6 mm.

Speciei praecedenti simillima ac uti sequitur, differens:

Superficie tota pube erecta multo brevior, sparsa albida tecta. Capite parum convexior. Thorace brevior, longitudine fere  $1\frac{2}{3}$  latiore, summum latitudinis in parte tertia anteriori attingente, superficie punctis grossis ac profundis, sed multo sparsioribus tecta. Elytris fortiter striatopunctatis, sed punctis striarum tamen minoribus ac minus densis quam apud *A. longicrinis* m. Interstitiis uniserialiter, sparse, minutissime punctatis. Elytris nigroviolaceis, macula minima humerali, fascia tenui in dimidio longitudinis, in sutura late interrupta ac ad anticem convergente pallidis. In memoriam clari Domini Dr. Emil Holub, viatoris fortis czechoslovensis ac Africae meridionalis exploratoris denominata.

**17. *Acmaeodera Nickerli m. n. sp.***

Hab.: Transvaal. Long.: 8.5 mm. Lat.: 2.3 mm.

Nigra, nitida, glabra, solum capite ac thorace sparse tenuiter albidopilosa. Thorace nigro, lateribus late rufotestaceis. Elytris luteis, nigropictis.

Speciei *Wahlbergi* Fhr. similima, ornamentis nigris elytrorum iisdem, ac solum uti sequitur differens: thorace dense ac satis minute, simpliciter punctato, antice medio magis producto, minus lato, longitudine fere  $1\frac{1}{2}$  latiore, summum latitudinis, in parte basali tertia attingente, lateribus rotundatis, ad anticem fortius ac fere recte, ad basim fortiter rotundatim attenuatis. Pube thoracis ac capitis minus distincta. Elytris magis elongatis, minus convexis, interstitiis magis convexis ac fortius punctatis, lateribus antice subrugosis.

In memoriam Domini Clari MUDr. Otakar Nickerl, fundatoris sectionis Entomologicae Musaei Nationalis Českoslovensis Pragae denominata.

**18. *Acmaeodera Dewetti m. n. sp.***

Hab.: Transvaal. Long.: 6 mm. Lat.: 2 mm.

Colore speciei *Wahlbergi* Fhr. similis, corpore subtus, capite thorace que obscure aeneo, nitido, elytris pallide ochraceis, nigropictis. Corpore satis convexo, elytris ad posticem satis declivibus, subparallelis, satis breviter attenuatis ac rotundatis. Superficie pube brevi sparsa, tenui, fere indistincta. Capite lato, haud impresso, spatio frontis interoculari parallelo, fere quadrato, sculptura plana celliformi. Thorace convexo, longitudine fere duplo latiore, summum latitudinis in tertia parte basali attingente, lateribus rotundatis, ad anticem fortius ac simpliciter, ad basim minus fortiter ac subsinuatim attenuatis; disco in medio sparse, satis fortiter punctato, sculptura dein ad latera versus substriata, longitudinali, angulis anticis punctis nonnullis latis umbilicatis; superficie nitida. Elytris incisione laterali levi, striatopunctatis, interstitiis uniseriatim punctatis, haud convexis, antice subplanis, punctis interstitialibus antice illis striarum fere adaequantibus. Elytris 1. macula humerali parva, 2. tenui margine basali, 3. vitta suturali communi irregulari tenui, postice interrupta, 4. vitta longitudinali utrimque posthumerali brevi, 5. macula transversa laterali in tertia parte posteriori, 6. fascia praeapicali transversa nigris.

**19. *Acmaeodera glabra m. n. sp.***

Nitida, gibbosa. Species haec omnesque sequentes ad affinitatem *A. posticalis* CG. ac *Grandis* Guér. pertinent. Nigroaenea, elytris tenuiter cupreomarginatis, corpore subtus cupreo. Supra glabra, solum capite ac thoracis lateribus parce albopilosis. Capite haud impresso, spatio interoculari frontis subparallelo ac quadrato. Thorace impressione media indistincta, longitudine fere  $2\frac{1}{4}$  latiore, summum latitudinis in tertia parte basali attingente, ad basim parum, ad anticem fortius attenuato, in disco minute ac sparsissime, ad latera gradatim fortius sed satis sparse punctato. Elytris declivibus, satis brevibus, forma uti apud *fossiceps* Qued. Interstitiis planis, postice haud elevatis, simplicibus, uniseriatim punctatis, illis tribus suturalibus fere impunctatis, sed aliter haud diversis, interstitiis lateralibus gradatim fortius punctatis ac transverse substrigosis.

**20. *Acmaeodera Ferrandii m. n. sp.***

Hab.: Bardera, 2908. V. Farrandi (Museo Civico di Genova). Long.: 11.4 mm. Lat.: 4.2 mm.

Speciei praedenti similis, sed maior, paulo minus gibbosa, robustior, supra aeneovirescens, obscura, elytris tenuiter cupreomarginatis, ante apicem macula triangulari caerulea. Capite ac thorace satis dense pube grisea haud erecta longa tectis. Capite simili, thorace paullo latiore ac maiore, ad anticem fortius attenuato, in medio levissime late depressiusculo, nitido sparse, in medio minute, ad latera gradatim fortius et umbilicate punctato. Elytrorum striis minus distinctis, interstitiis planis, ad latera fortius transverse strigosis, striarumque punctis lateraliter fortioribus, interstitiis omnibus aequalibus, haud elevatis, illis tribus praesuturalibus subtilius sculptis.

Typi duo: unum in Museo Civico di Genova, secundum in collectione Öbenberger Musaei Pragensis conservantur.

## 21. *Acmaeodera Keniae* m. n. sp.

Hab.: British East Africa: Mount Kenia. Long.: 10 mm. Lat.: 3.5 mm. Smaragdinea, subtus nigra, nitida, gibbosa. Species haec ad eam fossiceps Qued. ac posticalis CG. pertinet. Imprimis illae fossiceps affinis, thorace simili, sed multo fortius punctato, in tertia parte basali subparallelo, dein ad apicem fortiter attenuato, minus lato, angulis basilibus rectis. Elytris paullo magis attenuatis quam apud fossiceps Qued., sed multo latoribus quam apud posticalis CG., interstitiis tribus primis satis convexis ac glabris, nitidis, striis prima ac secunda grosse ac dense punctatis, illis lateralibus transverse dense substrigosis, sed grossius ac sparsius punctatis. Interstitiis postice uti apud posticalis CG. bicarinatis ac concavis. Spatio interoculari frontis quam apud posticalis CG. multo latiore.

## 22. *Acmaeodera prasina* m. n. sp.

Hab.: Transvaal. Long.: 8.8 mm. Lat.: 2.8 mm.

Aureo-viridis vel smaragdinea, speciei posticalis CG. simillima, sed minus gibbosa, corpore magis prolongato ac postice minus fortiter attenuato, thorace elytra latitudine haud superante, usque fere ad medium parallelo, dein ad apicem rotundatim attenuato, medio vage canaliculato, sed ubique densissime punctato, elytris usque ad tertiam partem apicalem parallelis, humeris parum prominentibus, striarum punctis multo subtilioribus, interstitiis latoribus, in parte exteriori laterali multo subtiliis ac densius transverse strigosis ac punctatis, illis apicalibus concavis ac impressis. Subtus dense longe albopilosa. Aspectu magis sericeo.

## 23. *Acmaeodera costulifera* m. n. sp.

Hab.: Congo belge. Long.: 15 mm. Lat. 5.5 mm.

Gibbosa, nitida, smaragdinea, elytris versus apicem gradatim coeruleis, subtus nigra, albopilosa.

Capite lato, fronte longitudine distincte latiori, albopilosa. Thorace latissimo, elytra latitudine haud superante, in tertia parte basali parallelo, dein ad apicem fortiter oblique attenuato, impressione media longitudinali lata et forti, fortiter punctata, dein, ad latera versus, primo minute ac sparsissime, dein gradatim grosse punctato. Elytris uti apud grandis Guér. formatis, sed brevioribus ac robustioribus, ad apicem haud longe et haud fortiter attenuatis. Interstitiis primo ac tertio antice elevatis latis, costiformibus, interstitio secundo ac quarto antice nullo, inter punctis striarum 1 et 2 atque 3 et 4 densis ac transversis strigosis indistincto. Inter-

stitio quinto tenui, solum antice distincto. Sculptura ad latera versus grossa, transverse rugosa, punctis transverse coalescentibus. Interstitiis postice planis, rugosulis, haud impressis.

O.b.s. Species haec ibi descriptae ad gregem *Acm. posticalis* CG. pertinent. Dispositionem illam systematicam a Dom. Kerremans in »Monographia« eius apud *A. posticalem* demonstratam vere falsam esse considero. In numero illo synonymorum subspecies multas ac verisimiliter species nonnullas distinctissimas, forma iam frontis, thoracis, elytrorumque sculptura maxime divergentes esse puto, eamque opinionem parum accuratam Kerremansi improbo. Kerremans ille parum aptus ad species illas dignoscendas simpliciter omnes in unam conglutinavit.

**24. *Polycesta aruensis* m. n. sp.**

Hab.: Ins. Aru. Long.: 30 mm. Lat.: 11 mm.

Nigra, nitida, supra subdeplanata. Capite satis parvo, fronte ad verticem convergente, irregulariter punctata. Thorace longitudine fere  $2\frac{1}{4}$  latiori, antice late emarginato, summum latitudinis in  $\frac{2}{5}$  basalibus attingente, lateribus fortiter rotundatis, ad anticem fortius quam ad basim attenuatis; disco parum convexo, sparse, grosse, lateraliter dense punctato. Elytris 11 striapunctatis, interstitio primo ante medio evanescente, interstitiis tenuibus, convexis, aequalibus, striarum punctis ad latera gradatim maioribus, grossis. Elytris dorso subdeplanatis, latitudine  $2\frac{1}{2}$  longioribus, usque ad  $\frac{3}{5}$  apicales subparallelis, dein ad apicem fortiter attenuatis ac denticulatis, apice acuminato.

**25. *Pseudocastalia borneensis* m. n. sp.**

Hab.: Borneo. Long.: 22 mm. Lat.: 7 mm.

Corpore subtus viridicyaneo. Capite thoraceque viridiaeneis, obscuris, elytris cyaneis. Pedibus vyaneis. Capite parvo, fronte elongata, tenui, ad verticem attenuata. Thorace longitudine  $2\frac{1}{2}$  latiore, antice leviter emarginato, basi bisinuata. Summum latitudinis in tertia parte basali attingente, ad basim sinuatim, subcordatim attenuato, ad anticem fortiter attenuato, in parte tertia basali rotundato. Thorace impressione media longitudinali haud profunda, superficie grosse ac haud dense, ad latera fortius punctata, disco haud convexo. Elytris latis, latitudine fere  $2\frac{1}{2}$  longioribus, in medio paullo dilatatis, ad apicem longe arcuatim attenuatis ac apice late rotundatis, 11 striatis, interstitiis alternis (2, 4, 6, 8) paullo elevatis, tenuibus. Prosterno lato, corpore subtus dense punctato.

**26. *Chrysophana placida* ab. *coerulans* m. n. ab.**

Hab.: California.

A forme typica colore superbo cyaneo, violascenti differt. Fasciis duabus longitudinalibus cupreoaeneis.

**27. *Catoxantha eburnea* var. *albiventris* m. n. var.**

Hab.: Andamanes.

A forma typica colore abdominis ac metasterni albo differt. Metasterno tenuiter nigro marginato; metasterni medio ac coxis posterioribus nigris.

**28. *Chrysochroa Klapálecki* m. n. sp.**

Hab.: S. O. Borneo: Tandjong. Long.: 50 mm. Lat.: 15 mm.

Smaragdinea, abdomine aureoviridi, elytris basi tenuiter pallidemarginata,

maculaeque utrinque postmediana ovali, in sutura interrupta, magna, pallida. Speciei *M n i z s e c h i* Deyr. simillima atque ab illa uti sequitur differens: Corpore magis angustato, prolongatulo. Ad apicem elytrorum magis attenuata. Vertice latiore, thorace minus lato, ad anticem minus fortiter attenuato. Margine basali luteo tenui atque lateraliter, sub humreis haud prolongato. Macula posteriori plus ad elytrorum dimidium posita, ovali, marginem lateralem haud attingente. Coxis posterioribus lateraliter plus attenuatis. Elytris multo angustioribus, forma corporis multo graciliori ac prolongata.

In memoriam Prof. Klapálek denominata.

**29. *Chrysochroa chinensis* var. *Nonfriedi* m. n. var.**

Hab.: Burmah (Nonfried).

A typo colore superficiei nigro coeruleo vel coeruleoviolaceo differt.

In honorem amici, dom. A. Nonfried denominata.

**30. *Iridotaenia Veselyi* m. n. sp.**

Hab.: Guinea Nova. Long.: 23 mm.

Capite violaceo, thorace aureo, elytris aureoviridibus, fasciis duabus longitudinalibus utrinque tenuibus aureocupreis ornatis. Corpore subtus aureo. Fronte satis lata, in medio profunde longitudinaliter incisa. Thorace longitudine fere  $1\frac{1}{2}$  latiori, summum latitudinis in basi attingente, dein fere recte, haud fortiter ad anticem attenuato, in medio sparse ac minute, lateraliter dense ac irregulariter, rugose punctato, in angulis anterioribus plaga parva satis indistincta laevi. Disco in medio acute longitudinaliter impresso, utrimque ad angulos basales impressone rugulosa longitudinali. Elytris satis brevibus, latitudine fere  $2\frac{1}{8}$  longioribus, quam prothorax distincte latioribus, usque ad medium subparallelis, dein ad apicem longe attenuatis ac apice subacuminatis, fasciis longitudinalibus duabus: prima a cavitate humerali fere recte ad apicem proveniente, secunda minus distincta laterali ac cum elytrorum margine subparallela. Pedibus auratis, curtis.

**31. *Psiloptera* (sbg. *Lampetis*) *Adonis* m. n. sp.**

Hab.: Brasilia: Mte Christo, VIII. Tapajos. Long.: 26 mm. Lat.: 9 mm. Corporis forma, elytrorumque sculptura ac coloratione bicarinatae Thoms. simillima. Subtus viridis, supra aureoviridis, thorace in medio plaga latisima sicut apud bicarinatam Thoms. formata, violacea ornato. Thoracis forma fere uti apud cupreosparsam Luc. Elytris satis latis, usque ad medium parallelis, dein ad apicem sinuatis, fortiter attenuatis, apicibus bidentulis. Interstitiis alternis elevatis ac violaceomaculatis. Corpore subtus nitido, processu prosternali satis lato, antice depresso, haud prominente. Tarsis cyaneis.

Species haec egregia particularitates plurium specierum combinat.

**32. *Psiloptera* (Sbg. *Lampetis*) *Srdinkoana* m. n. sp.**

Hab.: Costa-Rica-Turrialba. Long.: 19 mm. Lat.: 6.5 mm.

Nitida, elongata, cuneiformis; aeneoviridis, elevationibus superficiei violascentibus. Capite rugosulo, fronte trapezoidali, longitudine paullo latiori. Thorace longitudine  $1\frac{1}{2}$  latiori, summum latitudinis in basi attingente, in parte basali tertia subparallelo, dein ac apicem haud fortiter attenuato; sculptura punctorum grossorum ac sparsorum, inaequalium. Elytris thorace paullo latioribus, latitudine  $2\frac{1}{4}$  longioribus in



parte basali media subparallelis, ad anticem longe rotundatim attenuatis, apicibus breviter ac tenuiter bidentatis; lateribus fortiter leviterque marginatis, sulco praemarginali impresso tenui minute sculpto; margine laterohumerali haud crenulato; elytris seriatim dense ac grosse punctatis, interstitiis tenuibus et haud elevatis, simplicibus. Punctis magnis, gradatim versus latera grossioribus. Prosterno antice simpliciter truncato, medio haud elevato. Tarsis griseovirescentibus.

Verisimiliter ad *Lesnei* Kerr. pertinet.

Domino claro Dom. Jos. Srdínko Pragensi, Lepidopterologo expertissimo in honorem denominata.

### 33. *Psiloptera* (Sbg. *Lampetis*) *Kheili* m. n. sp.

Hab.: Brasilia: Matto Grosso. Long.: 22 mm. Lat.: 8 mm.

Satis obscure brunneoaenea, subtus in medio cuprea. Corpore satis robusto, haud fortiter acuminato. Capite rugosulo, satis lato. Thorace nitido, longitudine fere  $1\frac{2}{3}$  latiori, summum latitudinis paullo post medium attingente, postice perparum ad basim angustato, ad anticem fortiter, fere recte attenuato. Depressione lata antescutellari; punctura forti, inaequali, sed sparsa ac irregulari in medio, lateraliter inaequaliter condensata. Prosterno medio longitudinaliter elevato; lateribus declivibus, margine antico truncato. Elytris latitudine fere  $2\frac{1}{2}$  longioribus, paullo latitudine thoracem superantibus, margine humerali crenulato; elytris usque ad medium subparallelis, dein apicem versus longe ac rotundantim attenuatis, sulco laterali nullo, apicibus tenuibus ac leviter bidentulis. Elytris longitudinaliter 10-striatopunctatis, striarum punctis latera versus gradatim maioribus, interstitiis aequalibus, tenuibus, illis alternis sparse maculis pilosis aliquot parum distinctis ornatis. Tarsis brunneo-aeneis. Speciem hanc in honorem Domini Napoleon M. Kheil, lepidopterologi Pragensis ac collectionis entomologicae Musaei Nationalis Maecenatis illustrissimi animo grato denominavi.

### 34. *Psiloptera* (Sbg. *Lampetis*) *Hanši* m. n. sp.

Hab.: Brasilia: Matto Grosso. Long.: 25 mm. Lat.: 10 mm.

Species robusta, abbreviata. Olivaceoviridis, parum cupreomicans, corpore subtus olivaceo. Capite lato, curto, oculis haud prominulis. Spatio interoculari longitudine multo latiore. Thorace longitudine fere  $1\frac{3}{4}$  latiore, summum latitudinis in basi attingente, usque ante tertiam partem basalem parallelo, dein ad anticem arcuatim, haud fortiter attenuato; impressione antescutellari parum distincta, disco convexo, satis minute, sed sparse ac valde irregulariter, ad latera densius ac grossius punctato. Prosterno lato, plano, haud elevato, antice truncato. Elytris latitudine  $2\frac{1}{4}$  longioribus, sulco laterali nullo; lateribus in parte humerali crenulatis, usque ad medium parallelis, dein ad apicem paullulo sinuatim attenuatis, apicibus satis latis, breviter bidentulis; superficie regulariter, satis fortiter striatopunctata, ad latera magis rugosula, interstitiis latis ac subplanis, illis alternis catenulatim impressionibus piliferis satis sparsis interruptis. Subtus satis dense punctata, abdominis lateribus dense piloso marginatis. Tarsis viridicyaneis.

Amico fideli ac pictori Dom. Hanš Pragae in honorem nominata. Dom. Hanš magnam vitae partem in Brasilia peregit atque multa insecta ibi invenit.

### 35. *Psiloptera* (Sbg. *Lampetis*) *Kracíki* m. n. sp.

Hab.: Brasilia: Manaos. Long.: 22 mm. Lat.: 8.5 mm.

Supra aeneoviridis, nitida, subtus viridis. Capite satis parvo, spatio interoculari latitudine distincte longiori; marginibus frontis ad verticem convergentibus. Thorace longitudine fere  $1\frac{1}{2}$  latiori, summum latitudinis in basi attingente, ad apicem fere recte, haud fortiter attenuato, impressione praescutellari satis parva, disco aequali, fortiter ac sparse, inaequaliter, ad latera grosse ac dense, rugoso punctato. in angulis anticis plagula obliqua parum distincta impunctata. Prosterno applanato, antice truncato. Elytris latitudine fere  $2\frac{1}{3}$  longioribus, usque ad medium parallelis, margine laterali humerali integro, haud crenulato, sulco laterali nullo, ad apicem longe, leviter subsinuatum attenuato, apice tenui, separatim truncato ac bidentulo. Elytris satis grosse striatopunctatis, interstitiis tenuibus, planis, illis alternis subcatenulatum impressionibus pilosis interruptis. Abdomine inaequaliter grosse punctato, albo sparse piloso, fascia laterali pilosa nulla. Tarsis cyaneis.

In memoriam amici mei Prof. Kracík cuius collectio in Musaeo Nationali Pragae conservatur denominata.

**36. Psiloptera (sbg. Lampetis) paraguayensis m. n. sp.**

Hab.: Paraguay. Long.: 20 mm. Lat.: 7 mm.

Speciei Cupriventris Kerr. simillima ac ab ea solum uti sequitur differens: Frontis marginibus ad verticem minus fortiter attenuatis, thorace minus lato, ad anticem minus fortiter ac subarcuatim attenuato. Elytrorum striis subtilioribus, interstitiis magis convexis. Corpore magis attenuato, supra aeneo, violaceo micante, subtus violaceo. Canali segmenti aldominalis primi multo angustiore, latitudine processu prostemali latitudinem haud attingente (latitudinibus illis apud cupriventrem fere aequalibus). Tarsis smaragdineis. Abdomine fascia pilosa laterali nulla.

**37. Psiloptera (sbg. Lampetis) grandiosa m. n. sp.**

Hab.: Brasilia: Espirito Santo. Long.: 28—35 mm. Lat.: 8.5—12 mm. Speciei callimicra Kerr. similis ac solum uti sequitur divergens:

Colore supra ac infra cupreo, nitido, punctis lateralibus virescentibus. Capite maiore, marginibus frontis ad verticem distinctius convergentibus. Thorace latiori ac robustiori, sculptura simili, in parte media anteriori utrimque plaga impunctata parva, parum distincta. Elytris robustis, sed ad apicem fortius attenuatis, margine laterali humerali crenulato, sulco marginali nullo, interstitiis alternis distinctius catenulatum interruptis. Tarsis smaragdineis. Corpore subtus dense punctato, fascia laterali abdominali pilosa nulla.

**38. Psiloptera (sbg. Lampetis) Burmeisteri m. n. sp.**

Hab.: Argentina: El Banado, V. 1921. Long.: 15—24 mm. Lat.: 4.5—8 mm.

Forma speciei plagiata C G. vicina atque ei maxime affinis.

Tota nigra, satis nitida, punctis violascentibus. Capite satis robusto, saepe purpurascenti, grosse rugoso punctato, fronte ad verticem convergenti. Antennis aeneis. Thorace in medio latitudinem maximam attingente, longitudine fere  $1\frac{3}{4}$  latiori, marginibus ad basin satis leviter, ad anticem fortiter attenuatis, superficie tota dense fortiter ac irregulariter punctata, depressione antescutellari lata. Prosterni processu haud ele-

vato, subplano, dense punctato, haud marginato; margine anteriori truncato. Elytris forma eadem quam apud *plagiata*m, margine laterali humerali crenulato, sene parum profunde striato punctato, interstitiis humerali crenulato, dense parum profunde striato punctato, interstitiis laterali pilosa grisea ornato. Pedibus cyaneis.

**39. *Psiloptera* (sbg. *Lampetis*) *aequistriata* m. n. sp.**

Hab.: India or.: Mysore. Long.: 21 mm. Lat.: 7 mm.

Aureoviridis, elongata, elytris in dorso cuprascentibus. Capite parvo, satis longo, latitudine multo longiore, minute sculpto. Antennis viridibus. Pronoto longitudine fere  $1\frac{1}{3}$  latiori, in basi summum latitudinis attingente, ad anticem primo subtiliter, dein fortius ac rotundatim attenuato, depressione anles cutellari nulla; superficie punctis satis fortibus, ad latera densioribus ac grossioribus tecta. Prosterno lato, impunctato, marginato, deplanato, antice truncato. Scutello nullo. Elytris latitudine fere depressione antescutellari nulla; superficie punctis satis fortibus, ad apicem longe rotundatim attenuatis, apice breviter ac obtuse tridentatis, dente externo distinctiore. Superficie regulariter ac aequaliter minute striato punctata, interstitiis aequalibus, tenuibus, subconvexis, impunctatis, nitidis. Sulco segmenti primi abdominis tenui, latitudine illo processu prosternali fere triplo angustiore. Abdomine glabro, segmento anali apice late truncato ac subsinuato. Tarsis smaragdineis.

A speciebus omnibus regionis orientalis forma sulci abdominalis tenuissimi nec non elytrorum differt.

**40. *Ectinogonia aequatoris* m. n. sp.**

Hab.: Ecuador. Long.: 18 mm. Lat.: 6 mm.

Elongata, attenuata, corporis forma speciei *Camposi* Théry approximata. Capite satis lato, fronte ad verticem paullo attenuata, nigra, punctis virescentibus. Thorace ac elytris nigris, satis nitidis. Thorace margine antico dense albopiloso, longitudine fere bis latiori, sparse, satis fortiter punctato, summum latitudinis in basi attingente, ad anticem primo leviter dein paullo fortiter rotundatim attenuato. Utrisque basi, ad angulos basales impressione lata, satis parva. Elytris latitudine  $2\frac{1}{2}$  longioribus, margine laterohumerali crenulato, usque ad medium parallelis, dein ad apicem leviter sinuatim, satis fortiter attenuatis, apice oblique truncato ac subbidentat, angulo suturali paullo protracto. Elytris nigris, aequaliter, haud dense punctostriatis, impressione basali humerali semicirculari ac vitta subobliqua elytrali tenui, a sinu laterali posthumerali elytrorum usque ad apicem distincta, profunde impressa, subtus virescenti ornatis. Impressionibus illis dense luteo sericeo pilosis. Corpore subtus obscuro, sterni lateribus at punctis virescentibus. Segmentis abdominalibus lateribus macula pilosa (subtus aurea) semicirculari, laterali ornatis, maculis illis vittam lateralem longitudinalem abdominis efficientibus. Pedibus nigris, tarsis cyaneis.

**41. *Philanthaxia javanica* m. n. sp.**

Hab.: Java. Long.: 9 mm. Lat.: 3.5 mm.

Cyanea, pronoti disco ac elytris postice ac dorso late violaceo tinctis. Capite lato, oculis lateraliter paulo prominentibus, fronte subplana, cellis minutis rotundatis dense tecta, impressione nulla, spatio interoculari longitudine fere  $1\frac{1}{2}$  latiore. Thorace trapezoidali, punctura minuta ac strigis tenuibus concentricis tecta, parte anteriori magis convexa, ante basim late subde-

presso. angulis posticis acutis, longitudine fere  $1\frac{2}{3}$  latiori, latitudinem maximam in basi attingente, dein subrecte ad anticem attenuato. Prosterno dense, regulariter, satis fortiter punctato, punctura illa puncturae metasternali haud fortiori. Elytris latis, latitudine fere duplo longioribus, usque ad tertiam partem apicalem parallelis, dein ad apicem satis breviter ac fortiter attenuatis, margine apicali denticulato, apicibus separatim rotundatis. Elytris longitudinaliter, haud profunde sed acute striatis, interstitis omnibus aequalibus transverse strigose rugosulis. Scutello lato, viridi. Corpore subtus smaragdineo.

**42. *Melanophila Klapálecki* m. n. sp.**

Hab.: Costa-Rica. Long.: 10.5 mm. Lat.: 3.75 mm.

Speciei *Guyanensis* Chev. simillima, eodem colore olivaceoviridi, ab ea, uti sequitur differens:

Capite minore, sed convexiore, oculis maioribus, lateraliter magis prominentibus. Fronte distincte latiore, longitudine latitudine paulo latiori, lateribus frontis magis convexus ac minus fortiter, sed magis rotundatim ad verticem attenuatis. Thorace minori, brevior, summum latitudinis in parte basali tertia attingente, lateribus haud fortiter rotundatis, ad basim leviter, ad anticem magis rotundatim attenuatis; sculptura minus densa, paulo fortiori ac in medio disci simplici. Elytris minus latis, impressionibus duabus punctiformibus (4) distinctius impressis, sculptura densiore. Pedibus brevioribus, tibiis minus longis.

In memoriam Prof. Klapálek denominata.

**43. *Melanophila Gebhardti* m. n. sp.**

Hab.: Argentina: Buenos Ayres. (D. Gebhardt misit). Long.: 8 mm. Lat.: 2.7 mm.

Corpore supra olivaceo viridi, minute, granuloso ac paulo sericeomicante, subtus cuprescente. Capite lato, haud convexo, oculis satis fortiter prominentibus. Fronte satis lato, ad verticem arcuatim attenuato, medio plagis parvis duabus transversis nitidis. Thorace longitudine fere duplo latiore, satis parvo, lateribus satis fortiter rotundatis, summum latitudinis in tertia parte anteriori attingente, impressionibus nullis, superficie dense subcellatim granulosa. Elytris thorace latioribus, latitudine fere  $2\frac{1}{2}$  longioribus, usque ad tertiam partem apicalem parallelis, dein ad apicem attenuatis ac acuminatis, sutura postice paulo elevata, margine laterali usque a tertia parte basali denticulato, superficie haud distincte impressa, leviter convexa, dense ac subtiliter, regulariter granulosa, parum nitente. Pedibus cupreis.

In honorem amici Dr. Gebhardt denominata. Speciem hanc sub nomine erroneo »*bahiana*« Kerr. recepi; a specie illa valde divergens.

**44. *Melanophila Corporaali* m. n. sp.**

Hab.: Sumatra O. K. — Tandjong — Merah. 4. VIII. 1922 (J. B. Corporaal). Long.: 9.5 mm. Lat.: 3 mm.

Speciei *acuminata* Deg. simillima, nigra, satis nitida; a specie illa uti sequitur divergens: Corpore magis attenuato, magis nitente. Fronte plus parallelo, plagis tribus minutis parvis ornato. Thorace brevior, angulis anticias multo minus prominentibus, lateribus aequaliter rotundatis, ad apicem ac ad basim aequaliter attenuatis, sculptura distinctiore, margine anteriori subtilius emarginato; elytris minus latis, apice multo fortius, acute acuminato. Tarsis brevioribus.

A specie simili, *Helferi* m. (Birmania) statura robustiore, maiore, fronte plus attenuata, thoracis forma, spina apicali elytrorum multo fortiori, pedibusque multo longioribus differt.

Amico J. B. Corporaal in honorem denominata.

45. *Anthaxia dauensis* m. n. sp.

Hab.: Abessynia: Dire Dawa. Long.: 6.7 mm. Lat.: 2.4 mm.

Satis lata ac convexa, obscure brunneoaenea, parum nitida. Speciei *melancholica* G. similis ac valde affinis, sed multo brevior ac latior, fronte antice ac thoracis lateribus paullo cuprescentibus; fronte lata, sparse albido pilosa, subtrapezoidali, ad verticem subsinuatum attenuata; thorace fere longitudine fere  $2\frac{1}{4}$  latiori, summum latitudinis in medio attingente, ad basim perparum, recte, ad anticem fortius subrotundatim attenuato, margine anteriori fortiter bisinuato, impressionibus nullis. Superficie thoracis tota subtilissime granuloso alutacea, sculptura celliformi ac umbilicata minuta oblitterata ac solum lateraliter distinctiori. Elytris latitudine fere  $2\frac{1}{2}$  longioribus, usque ante tertiam partem apicalem subparallelis, dein fortiter attenuatis ac acuminatis, apicibus anguste separatim rotundatis ac denticulatis, margine laterali apicali satis lato. Corpore subtus ac pedibus cuprescentibus, sparse albopilosis.

46. *Anthaxia javanica* m. n. sp.

Hab.: Java. Long.: 4 mm. Lat.: 1.3 mm.

Obscure aeneocuprea, fronte, thoracis angulis anterioribus, pedibus ac plaga basali subtriangulari ac postcutellari elytrorum smaragdineis. Scutello aeneocupreo, vertice nigrescenti.

Aspectu *A. Milefolii* Oliv. haud difinis, sed thorace longitudine fere duplo latiori, margine anteriori simpliciter, rotundatim emarginato, lateribus fortiter, ad basim minus, ad anticem fortius rotundatis, summum latitudinis in tertia parte basali attingente, depressione haud profunda, lata in angulis posticis, sculptura aequali umbilicata, lateribus paullo rugosula. Elytris latitudinem thoracis haud attingentibus, ab humeris iam gradatim ad apicem attenuatis ibique separatim rotundatis ac haud distincte denticulatis, abdomen totaliter tegentibus, minute sculptis, subconvexis.

47. *Anthaxia borneicola* m. n. sp.

Hab.: Borneo borealis. Long.: 3.5 mm. Lat.: 1.2 mm.

Parva, subconvexa, satis nitida; elytris abdomen totaliter tegentibus, impressionibus nullis. Capite satis lato, oculis leviter prominentibus, fronte viridi, latitudine  $1\frac{1}{4}$  longiori, parallelo, glabro. Vertice nigro. Thorace curto, longitudine fere  $2\frac{1}{4}$  latiori, margine anteriori fortiter bisinuato, lateribus medio subparallelis, ad apicem ac basim leviter rotundatim attenuatis, obscure aeneo, nigriscenti, angulis anticis ac basalibus aureoviridibus, illis paullo depressis, sculptura aequali, satis forti, umbilicata. Elytris leviter convexas, latitudine fere  $1\frac{1}{2}$  longioribus, lateribus usque ad medium parallelis, dein ad apicem longe rotundatim attenuatis, apicibus conjunctim rotundatis; superficie satis nitida, leviter sculpta olivacea, obscura, in parte postscutellari viridi, pube haud distincta, adhaerenti, sparsa, pusillima tecta. Pedibus cyanescentibus, abdomine aeneo, lateribus auratis.



**48. Agrilaxia borealis m. n. sp.**

Hab.: Jeannette (Pennsylvania; U. S. A.; »June«). Long.: 4.2 mm.

Lat.: 1.1 mm.

Speciei *A. flavimana* C. G. simillima ac ab illa, uti sequitur divergens: Tota alutacea, nigra, perparum coerulescens, fronte smaragdinea, thoracis lateribus paullo virescentibus. Tarsis pallidis. Spatio interoculari frontis latitudine distinctissime longiori, lateribus subparallelis, levissime sed distincte subsinuatis (apud *flavimanam* lateribus simpliciter parallelis, spatio interoculari distinctissime longitudine latiori). Thorace latiore, ad basim multo minus attenuato, sculptura magis alutacea. Elytris magis aequalibus, magis parallelis, abdomen fere totaliter tegentibus, costis vel impressionibus longitudinalibus nullis.

**49. Colobogaster peruvianus m. n. sp.**

Hab.: Peru: Cuzco. Long.: 12.5 mm. Lat.: 6.5 mm.

Subtus depressus, supra leviter convexus. Corpore subtus, capite, thorace, antennis pedibusque smaragdineis, thorace medio transverse, late cupreo. biplagiato, elytris nigris, nitidis, macula rotunda in impressione humerali basali ac macula perparva in tertia parte basali smaragdineis. Thorace in quarta parte basali latitudinem maximam attingente, ad basim leviter, ad anticem primo minus fortiter, dein fortius attentato, basi fortissime bisinuata, lobo medio forti ac producto, apice late rotundato. Scutello perparvo, viridi. Sculptura thoracis ac elytrorum minutissima ac sparsa. Elytris planis, haud costatis, solum ante apicem costa subsuturali ac duabus aliis leviter indicata. Apice breviter sed acute unidentato. Abdomine late truncato, inter quatuor dentes parvos bisinuato, denticulis duabus mediis approximatis.

**50. Chrysobothris Stricklandi m. n. sp.**

Hab.: Cameroon. Long.: 6.3 mm. Lat.: 1.2 mm.

Nitida, subconvexa, coerulea, costis elytralibus nullis. Capite lato, medio subconvexo, fronte antice impressa, impressione hac in medio frontis longitudinis desuper elevatione transversa marginata. Thorace longitudine duplo latiori, margine anteriori subtruncato, fere recto, margine basali fortiter bisinuato, lobo medio late rotundato. Sculptura haud densa, nitida, transverse subrugosa. Thorace summum latitudinis fere in angulis anticis attingente, lateribus ad basim recte, satis fortiter attenuatis. Elytris uti apud *dorsatam* Klug formatis, satis fortiter, haud dense ac vere regulariter punctatis. Abdomine nigro, coeruleomarginato. Prosterno viridi. Segmento anali in medio carinato, apice rotundatim emarginato.

Domino W. W. Strickland, nationis Čechoslovacae amicissimo ac poetarum nostrum apto translatore in honorem denominata.

Dom. W. W. Strickland collectionem Conchyliarum perpulchram in plurimis itineribus suis in Asia collectam Museo Nationali Čechoslovacensi Pragae donavit.

**51. Strigulia nana m. n. sp.**

Hab.: Cameroon. Long.: 3.3 mm. Lat.: 0.9 mm.

Species huius generis minima. Nigroviolacea, fere glabra, supra paullo depressiuscula. Fronte trapezoidali, ad anticem leviter convergente, transverse rugosa. Thorace longitudine fere  $1\frac{1}{2}$  latiori, in medio summum longitudinis attingente, angulatim, haud dense, regulariter striato, late-

ribus in medio rotundatim subangulatis, ad anticem ac ad basim fere aequaliter, satis fortiter attenuatis. Elytris subconvexis, latitudine fere  $3\frac{1}{2}$  longioribus, satis elongatis, late, haud dense transverse rugosis. Pedibus nigris, satis fortibus. Tibiis fortiter curvatis.

**52. *Gassneria infernalis* m. n. sp.**

Hab.: Togo. Long.: 6.5 mm. Lat.: 1.5 mm.

Nigra, nitida, satis inaequaliter albo, sparse pilosa, fascia praeapicali, transversa elytrorum subdenudata. Thorace minus quam apud species ilias huius generis gibboso, medio paullo elevato, summum latitudinis in basi attingente, in parte basali media fere parallelo, dein ad anticem satis fortiter rotundatim attenuato, sculptura rugosula inaequali, pube irregulari albida, sparsa tecto. Elytris granuloso asperis, robustis, convexis, latitudine fere  $3\times$  longioribus, apice satis late separatim rotundato, pilositate in parte media apicali plus condensata, fascias duas parum distinctas transversales formante.

**53. *Gassneria diffracta* m. n. sp.**

Hab.: Mosambique. Long.: 7.2 mm. Lat.: 2 mm.

Forma speciei praecedenti similis. Violaceo aenea, dense sculpta, nitens. Capite medio sulcato. Thorace medio gibboso, elevationibus duabus minoribus lateralibus, dense circulatim rugoso, sparse luteo piloso, in tertia parte basali subparallelo, dein ad anticem haud fortiter rotundatim attenuato. Elytris illis speciei praecedentis similibus, sed apice paullo magis attenuatis, glabratis, dense aspere, satis fortiter granulosis, fascia postmedianam subobliqua ac flexuosa, haud densa albosericea, pilosa, fascia obliqua praeapicali albida, apice ipso luteopiloso. Abdomine sparse albopiloso, segmentis abdominis in angulis anticis lateralibus plaga parva impunctata, nitida, glabra ornatis.

**54. *Gassneria indigacea* m. n. sp.**

Hab.: Congo belge: Capiri. Long.: 5.3 mm. Lat.: 1.2 mm.

Indigaceo nigra, parum nitida. Speciei infernalis m. similis, sed minor, minus robusta. Dense sculpta, sparse albopilosa. Fronte satis lata; thorace satis inaequali, usque ad tertiam partem anteriorem subparallelo, dein satis leviter attenuato, in medio elevatione forti gibbosa posteriori. Sculptura circulari ac irregulari rugosa. Elytris fascia postmedianam ac praeapicali albidis, parum densis, ad apicem satis fortiter attenuatis, separatim rotundatis, inaequaliter, sparse albopilosis, fascia praeapicali (inter illas duas albidas) transversa denudata. Antennis cupreis, pedibus abdomineque nigris, albopilosis. Segmentis 2 et 3 abdominis in angulis anticis lateralibus plaga impunctata triangulari glabra, parva.

**55. *Gassneria Arrowi* m. n. sp.**

Hab.: Rhodesia (Marshall lgt. — British Museum of Nat. History). Long.: 7 mm. Lat.: 2 mm. Nigroaenea, subviolacea, elytris nigris, haud nitidis. Robusta, convexa. Capite satis lato, in medio sulcato, grosse, inaequaliter rugoso ac sparse aureospiloso. Thorace lato, in tertia parte basali summum latitudinis attingente, lateribus rotundatis, ad basim minus fortiter, ad anticem fortiter rotundatim attenuatis; disco inaequali, haud gibboso, impressione laterobasali haud forti, fortiter irregulariter rugoso. Elytris robustis, dense granulose, subtransverse rugosis, fere glabris, solum pilis aliquid aureis ante basim ac in medio fascias haud distinctas efficientibus,

tertia parte apicali dense ac irregulariter, longe, luteopilosa. Abdomine nitidior, longe, sparse luteo piloso, plagis nullis.

In honorem Dom. Gilbert S. Arrow, Directoris Ent. British Museum (London) denominata.

In genus hoc meum species nonnullae generis *Kamosia* locandae sunt (*Schultzei* Kerr., *Duvivieri* Kerr. etc.). Genus hoc ab illis *Kamosiis* veris, afinitatis meridionalis Kerr. et imprimis *thoracica* Kerr. praecipue sulco antennali distincto ac thoracis forma differt.

#### 56. *Meliboeus Achardi* m. n. sp.

Hab.: Cameroon. Long.: 5.5 mm. Lat.: 1.9 mm.

Capite, thorace, corporeque subtus cupreo aureo, elytris cyaneis, paullo virescentibus. Corpore satis robusto, cylindrico, haud prolongato, sculptura satis aspera ac densa. Capite lato, satis longo, oculis paullo prominentibus. Vertice medio late impresso, lateribus ad anticem paullo convergentibus, latitudine paullo longiore, rugoso. Thorace lateribus usque ad tertiam partem anteriorem subparallelis, angulis posticis subrectis, paulo obtusatis. Thorace lateribus dense albomarginatis, pilosis; parte media posteriori satis elevata, disco paullo inaequali, fortiter, haud dense, curvatim strigoso rugulosis. Thorace lateraliter observato margine laterali ante angulis posticis paullo sinuato. Elytris abdomen totum tegentibus, aspere satis dense strigoso granulosis. Coxis posterioribus ac partibus lateribus sterni maculae laterali in segmento secundo abdominali albopilosis. Species parum nitida, satis crassa ac robusta.

Amico Dom. Julien Achard in honorem denominatus.

#### 57. *Meliboeus Raphelisi* m. n. sp.

Hab.: Rhodesia. Long.: 5.8 mm. Lat.: 1.15 mm.

Satis obscure viridicyaneus, parum nitens, subconvexus, subparallelus. Capite sparse albopiloso, medio impresso, oculis haud prominentibus, fronte ad anticem convergente, lateribus rectis, spatio interoculari longitudine haud latiore. Thorace longitudine fere  $1\frac{1}{2}$  latiore, lobo basali medio producto ac truncato, lateribus usque ad tertiam partem anteriorem parallelis, satis late albide, pilosomarginatis. Thorace elytris latiore, angulis basalibus rectis, margine laterali (lateraliter observato) ante basim sinuato, margine ipso subtus, ante basim, curvatim emarginato. Sculptura subcirculari, parum densa, parte media disci late, haud fortiter elevata. Elytris dorso subdepressis, convexis, subparallelis, satis robustis, sculptura densa aspera granulata. Superficie glabra. Corpore subtus nigro, sterni ac coarum posteriorum partibus lateralibus dense albosericeis. Antennis brevibus, nigris.

Domino A. Raphelis in honorem denominatus.

#### 58. *Meliboeus sumatranus* m. n. sp.

Hab.: Sumatra's O. K. — Bandar, Baroe, 12. II. 1921. J. B. Corporaal lgt. Long.: 4.7 mm. Lat.: 1.5 mm. Corpore subtus, thorace capiteque aureis, elytris cyaneis. Superficie glabra, nitida. Corpore satis convexo, sed desuper paullo depressiusculo. Capite parvo, convexo, haud impresso, fronte aeneoviridi, attenuata, parallela; oculis parvis, spatio interoculari frontis longitudine ac latitudine fere aequalibus. Antennis virescentibus. Thorace summum latitudinis in medio attingente, ad basim leviter, ad anticem fortiter rotundatim attenuato, lateribus desuper oblique late subdepressis,

transverse dense rugoso. Thorace subtus lateraliter sulco laterali antennali distincto. Prosterno antice profunde emarginato. Elytris nitidis, strigoso transverse aspere rugosis, latitudine fere  $2\frac{1}{2}$  longioribus, usque ad medium parallelis, dein ad apicem fere recte attenuatis, apicibus separatim rotundatis ac denticulatis. Corpore subtus glabro. Angulo latero-posteriori coxarum posteriorum acute producto, subspinoso; spina illa utrimque desuper bene visibili. Abdomine apice truncato. Species haec atque illa sequens ab aliis mihi notis in multis punctis valde differe mihi videtur. *Nalanda* sensu Théry?

59. **Meliboeus bandarensis m. n. sp.**

Hab.: Sumatra's O. K. — Bandar, Baroë. 10. II. 1921. J. B. Corporaal lgt. Long.: 4.4 mm. Lat.: 1.5 mm. Speciei praecedenti simillima. Colore supra indigaceo, nigrocyaneo, fronte virescenti, abdomine cupreo aureo. Fronte multo longiore, parallela, spatio interoculari multo magis attenuato. Thorace lateribus minus depressis, scutello multo minore. Thoracis sculptura magis inaequali. Sulco antennali simili quam apud *sumatranum*. Elytris convexioribus, robustioribus, coxis posterioribus angulo lateroapicali similiter producto, desuper in forma spinulae curtae visibili. Coxis posterioribus posticis lateribus albomaculatis.

60. **Cylindromorphus montanus m. n. sp.**

Hab.: Assam. Long.: 4.5 mm. Lat.: 1 mm.

Robustus, cylindricus, nigroolivaceus, nitens, glaber. Capite convexo, lato, temporibus summa latitudine oculi paullo latioribus, oculis haud prominentibus, vertice latiter impresso. Thorace summum latitudinis in medio attingente, lateribus perparum rotundatis, fere parallelis ac rectis, depressione lata ante basim transversa, carina forti laterali recta, margini haud aproximata ac basi valde disjuncta; thorace capite  $1\frac{2}{5}$  longiori, sparse punctato, punctis rotundatis haud impressis, superficialibus. Elytris robustis, post medio dilatatis, ad apicem haud fortiter attenuatis, separatim rotundatis. Carina laterohumerali nulla. Sculptura grossa, transversa, rugosa, pliciformi.

61. **Cylindromorphus simlaicus m. n. sp.**

Hab.: Simla (Himalaya). Long.: 2.5 mm. Lat.: 0.7 mm.

Speciei *Bodongi* Kerr. simillimus, sed minor, minus attenuatus, capite lato, sed oculis lateraliter haud prominentibus. Fronte paullo minus lata; thorace minus lato, carina laterali basi vere distincte a margine laterali disjuncta (apud *Bodongi* cum illo fere conjuncta), elytris in parte tertia apicali (apud *Bodongi* in  $\frac{3}{5}$  apicalibus) latitudinem maximam attingentibus, ad apicem multo brevius attenuatis ac apicibus fortius obtuse rotundatis. Sculptura elytrorum fortiore.

62. **Cylindromorphus africanus m. n. sp.**

Hab.: Transvaal. Long.: 4 mm. Lat.: 1 mm.

Speciei *togoënsis* m. simillinus, sed major, fronte paullo latiore, thorace ac capite fere impunctatis, thorace alutaceo, basi impressione illa vage figuram V formantibus. Carina praehumerali cum margine thoracia basi valde convergente. Elytris haud profunde, undulatim transverse rugosis, in parte tertia apicali subito dilatatis, dein ad apicem satis breviter attenuatis ac subrotundatis, glabris. Segmento anali apice minute, breviter emarginato.

**63. *Cylindromorphus togoënsis* (Kerr. i. litt.) m. n. sp.**

Hab.: Africa c.: Togo. Long.: 4 mm. Lat.: 0.9 mm.

Nigroolivaceus, parum nitidus, convexus, satis robustus. Capite lato, lateribus haud prominentibus, convexo, fronte ad anticem valde attenuata, haud distincte sparse pilosa. Thorace longitudine  $1\frac{1}{2}$  latiore, lateribus subrectis, fere parallelis, ad basim perparum attenuatis; basi late transverse, haud profunde subdepressa. Carina praehumerali leviter curvata, margine laterali leviter subsinuato, carinis illis basi distincte disjunctis. Sculptura sparsa, punctis superficialibus ac parum distinctis. Elytris thorace fere  $3\frac{1}{2}$  longioribus, transverse plicatim, haud profunde rugosis, in  $\frac{2}{5}$  apicalibus satis fortiter dilatatis, dein ad apicem datis fortiter attenuatis, apicibus suboblique truncatim rotundatis. Abdominis segmento ultimo apice integro.

**64. *Cylindromorphus congolanus* m. n. sp.**

Hab.: Cap Plate (Congo oelge). Long.: 3.3 mm. Lat.: 0.7 mm.

Colore speciei praecedentis, magis elongatus, minor, capite magis convexo, temporibus lateraliter paullo prominentibus, thorace magis angustato, lateribus rectis, ad basim distincte attenuato. Carina praehumerali ab illa marginali (= margo lateralis thoracis) basi valde, multo magis distante, cum margine laterali parallela, minus elevata, elytris longioribus, in tertia parte apicali solum parum dilatatis, sculptura transversa multo subtiliori ac densiori, apicibus satis anguste separatim rotundatis.

Speciei *Jeanneli* Kerr. simillimus, sed angustior, sculptura multo subtiliori, fronte magis tenui, carina thoracis multo minus distincta.

**65. *Cylindromorphus rhodesicus* m. n. sp.**

Hab.: Rhodesia: Salisbury. Long.: 3.2 mm. Lat.: 0.8 mm.

Speciei *togoënsis* m. simillimus, eodem colore, eadem corporis forma atque uti sequitur, diffinis: Fronte antice pilis albidis brevibus marginata, paullo latiore. Thorace sculptura minus distincta, minus lato, carina praehumerali multo minus distincta. Elytris minus robustis, postice minus dilatatis, apice curvatim rotundatis, sculptura paullo densiore.

**66. *Cylindromorphus Nickerli* m. n. sp.**

Hab.: Congo belge; Cap Plate. Long.: 3 mm. Lat.: 0.7 mm.

Niger, glaber, nitidus, speciebus praecedentibus similis, imprimis *togoënsi* m. affinis, sed multo minor ac minute sculptus.

Capite satis magno, lateribus haud prominentibus, fronte antice albo-pilosa; thorace subparallelo, longitudine fere  $1\frac{1}{2}$  latiore, carina praehumerali fere recta, carina laterali (= margo lateralis) recta, duabus carinis basi valde convergentibus. Sculptura thoracis oblitterata. Elytris ante apicem parum dilatatis, convexis, apice satis breviter ac tenuiter rotundatis.

In memoriam Dom. M U D r. O t a k a r N i c k e r l denominatus.

**67. *Cylindromorphus rivularis* m. n. sp.**

Hab.: Hima River (Congo belge). Long.: 3.6 mm. Lat.: 0.9 mm.

Speciei *togoënsis* m. simillimus, sed thorace ac capite brevioribus, thorace ad basim distinctius, subtrotundatim attenuato, fronte minus lata, thorace ac elytris paullo latioribus, minus convexis, carina praehumerali magis curvata ac basi cum illa laterali fortius approximata, elytris summum latitudinis in  $\frac{3}{5}$  apicalibus attingentibus ac versus apicem longius rotundatim attenuatis, segmento anali apice distincte, breviter emarginato.



Speciei *Allaudi* Kerr. similis, sed sine pilis albidis in frontis margine anteriori, forma minus lata, multo longior.

68. *Callimicra Štichai* m. n. sp.

Hab.: Matto Grosso; Corumba (Brasilia). Long.: 3.7 mm. Lat.: 1.2 mm. Elongata, subparallela, convexa, dorso paullo depressiuscula, viridicyanea, micans, thorace medio verticeque aeneo. Capite levi, haud alutaceo, satis lato, oculis haud prominulis, fronte medio levissime, late subdepresso, parallelo, spatio frontis interoculari latitudine  $2\frac{1}{4}$  latiore, basi transverse lateribusque longitudinaliter paullo depressis, carina praehumerali paullo distincta, leviter curvata. Thorace summum latitudinis in basi attingente, ad anticem regulariter, satis fortiter curvaetim attenuato, parte basali tertia recta. Elytris latitudine fere  $2\frac{1}{2}$  longioribus, lateribus usque ad  $\frac{2}{5}$  apicales subparallelis, dein ad apicem longe curvatim attenuatis, apice ipso satis late conjunctim rotundato; superficie punctura subtilissima, minuta, subseriata, sparsa. Amico modesto Dom. Šticha, lepidopterologo Pragensi in honorem denominata.

69. *Leiopleura leprosa* m. n. sp.

Hab.: Brasilia: Amazonas. Long.: 3.8 mm. Lat.: 1.8 mm. Nigroviolacea, nitida, glabra, elytris valde inaequalibus. Capite satis convexo, parvo, oculis haud prominentibus, fronte haud impressa, latitudine fere  $1\frac{1}{4}$  longiori, poris antice tribus, transverse dispositis, poro medio solo. Thorace longitudine fere  $2\frac{1}{2}$  latiori, summum latitudinis in basi attingente, ad apicem iam a basi satis fortiter curvatim attenuato, carina laterali nulla, ante basim late, transverse impresso, disco leviter convexo, aequali. Elytris latitudine fere  $1\frac{3}{4}$  longioribus, usque post medium parallelis, dein ad apicem satis fortiter arcuatim attenuatis, apicibus tenuiter, conjunctim rotundatis, superficie valde inaequali, impressionibus aliquot latis ac elevationibus nonnullis, imprimis duabus (4) praeapicalibus ellipticis gibbiformibus valde distinctis.

70. *Leiopleura Šrogl* m. n. sp.

Hab.: Brasilia: Amazonas. Long.: 2.6 mm. Lat.: 1.4 mm. Corpore subtus, thorace capiteque nigris, elytris cyaneis. Nitida, glabra. Capite parvo, medio paullo impresso, fronte parallela, quadrata. Poris antice quatuor parvis, duobus mediis approximatis. Thorace glabro, fere impunctato, nitido, satis convexo, basi transverse subdepresso, impressione lata haud profunda in angulis posticis, longitudine fere  $2\frac{3}{4}$  latiore, in basi summum latitudinis attingente, ad anticem satis fortiter curvatim attenuato, carina praehumerali nulla. Elytris ante medium parallelis, den ad apicem satis fortiter, subcurvatim attenuatis, apicibus tenuiter conjunctim rotundatis, punctis superficiei parvis, sparsis ac irregularibus. Dom. J. Šrogl, fautori Musaei Nationalis Pragensis in honorem denominata.

71. *Leiopleura Binderi* m. n. sp.

Hab.: Brasilia: Amazonas. Long.: 2.9 mm. Lat.: 1.3 mm. Satis elongata, nigra, nitida, glabra. Capite parvo, fronte medio paullo depressa, lateribus subparallelis, devissime subsinuatis, spatio interoculari quadrato, poris antice quatuor, duobus mediis approximatis ac minoribus. Thorace longitudine fere  $2\frac{1}{3}$  latiore, a basi ad anticem curvatim, satis fortiter, attenuato, ante basi late transverse subdepresso, carina praehumerali nulla. Elytris latitudine fere  $1\frac{3}{4}$  longioribus, usque ad

medium subparallelis, dein ad apicem longe subcurvatim attenuatis, apicibus conjunctim rotundatis, subtiliter, sparse, irregulariter punctatis. Amico Dipterologo D o m. E. B i n d e r Pragensi in honorem denominata.

72. *Leiopleura dilatata* m. n. sp.

Hab.: Amazonas (Brasilia). Long.: 4 mm. Lat.: 2·7 mm.

Corpore lato, subdepresso, abbreviato. Capite thoraceque viridibus, thorace medio ac vertice aeneis, scutello viridi. Elytris nigris, lateribus late cyaneo marginatis; etiam parte elytrorum scutellari cyanescente; corpore subtus pedibusque nigris. Capite satis parvo, medio haud impresso, fronte dense satis fortiter punctata, lateribus ad anticem paullo convergentibus, rectis. Spatio interoculari tenui, latitudine fere  $2\frac{3}{4}$  longiori, angulis posticis acutis, lateribus a basi ad anticem fortiter attenuatis. Scutello lato. Elytris latitudine fere  $1\frac{1}{2}$  longioribus, planis, usque ad medium parallelis, dein ad apicem oblique, subrotundatim attenuatis, irregulariter, satis minute punctatis, ad latera paullo transverse rugulosis. Humeris leviter prominentibus.

73. *Leiopleura Hanši* m. n. sp.

Hab.: Brasilia: Sao Paulo (Jaro Mráz lgt.) Long.: 3 mm. Lat.: 1·3 mm.

Nigra, nitida, dorso subdepressa. Speciei B i n d e r i m. valde similis, sed latior, minus convexa, fronte angustiore, spatio interoculari latitudine fere  $1\frac{1}{4}$  longiore, thorace latiore, ad anticem fortius attenuato, carina basali prae humerali brevi; elytris latioribus, minus convexis, magis rotundatis, magis irregulariter punctatis.

Amico coleopterologo ac pictori pragensi D o m. H a n š in honorem denominata.

74. *Leiopleura Klapálecki* m. n. sp.

Hab.: Brasilia: Amazonas. Long.: 3·2 mm. Lat.: 1·3 mm.

Nigra, nitida, fronte leviter euprascenti. Capite satis convexo, fronte haud impressa, lateribus subparallelis, spatio interoculari latitudine fere  $1\frac{1}{2}$  longiori, poris antice tribus. Thorace longitudine fere  $2\frac{1}{3}$  longiori, lateribus in tertia parte basali parallelis, dein ad anticem regulariter, fortiter rotundatis, basi late, haud profunde transverse subdepressa, carina laterali nulla. Elytris convexis, latitudine fere  $1\frac{3}{4}$  longioribus, usque ante medium parallelis, dein ad apicem longe curvatim attenuatis, apicibus ipsis late conjunctim rotundatis, punctis minutis sparsis irregularibus, in dimidio apicali evanescentibus. Corpore subtus nigro.

In memoriam Dom. P r o f. F. K l a p á l e k denominata.

75. *Lius conicus* var. *nobilis* m. n. sp.

Hab.: Brasilia: Amazonas.

A forma typica corpore angustiore, ad apicem magis attenuato, fronte que magis attenuata, subparallela differt. Spatio interoculari latitudine fere  $1\frac{1}{2}$  longiore (in typo solum  $1\frac{1}{3}$  longiore).

76. *Lius Hoschekei* m. n. sp.

Hab.: Costa-Rica. Long.: 4 mm. Lat.: 1·9 mm.

Obscure purpurascens, medio magis obscuratus, glaber, nitidus. Praecedenti simillimus, sed capite medio distincte impresso, biconvexo, spatio interoculari longitudine solum  $1\frac{1}{4}$  latiori. Thorace minus lato, ad anticem

fortius attenuato; elytris latitudine duplo longioribus, fortibus ac in seriis distinctioribus punctatis. Corpore subtus pedibusque nigropurpureis. A Dom. Baron Hoschek de Mühlheim (Sevnica, Jugoslavia) receptus.

**77. *Lius Binderi* m. n. sp.**

Hab.: Costa-Rica. Long.: 3 mm. Lat.: 1.5 mm.

Capite thoaceque rubroaureis, elytris laete coeruleis. Capite medio impresso, biconvexo. Spatio interoculari frontis longitudine perparum latiori, fronte virescente, lateribus ad anticem paullo, curvatim, concave attenuatis. Thorace lato, haud punctato, a basi ad anticem fortiter, curvatim attenuato. Elytris dorso subdepressis, in tertia parte basali parallelis, dein ad apicem satis fortiter subrecte attenuatis, inaequaliter, sparse, satis minute punctatis, lateribus indistincte subrugosis, humeris paullo elevatis; latitudine  $1\frac{3}{4}$  longioribus. Corpore subtus nigro.

Amico Dipterologo E. Binder Pragensi in honorem denominatus.

**78. *Lius Binderi* var. *nanulus* m. n. var.**

Hab.: Costa-Rica.

A typo corpore minore, magis elongato ac elytris distincte longioribus, latitudine duplo longioribus differt.

**79. *Lius simulator* m. n. sp.**

Hab.: Costa-Rica. Long.: 3.5 mm. Lat.: 1.8 mm.

Speciei coelestis m. simillimus, sed minor, minus robustus, ad apicem magis attenuatus, capite minus lato, spatio interoculari frontis longitudine solum  $1\frac{1}{5}$  latiore. Elytris humeris magis prominentibus, solum in tertia parte basali subparallelis, dein ad apicem fortius attenuatis ac apicibus angustius rotundatis, punctis indistincte subseriatim dispositis. Elytris latitudine fere  $1\frac{3}{4}$  longioribus.

**80. *Lius simulator* var. *persimilis* m. n. var.**

Hab.: Costa-Rica.

Praecedenti similis, sed fronte minus lata, spatio interoculari longitudine fere  $1\frac{1}{5}$  latiore, antice aeneo, superficie purpureoviolacea, nitida, corpore parum minore ac angustiore differens.

**81. *Lius Cordieri* m. n. sp.**

Hab.: Brasilia: Conceição de Araguaya. Long.: 3.5 mm. Lat.: 1.6 mm. Obscure purpureoviolaceus, nitidus, glaber. Capite medio satis profunde impresso, biconvexo; fronte fere parallela, spatio interoculari lato, longitudine fere  $1\frac{1}{4}$  latiori, sparse, haud distincte albo piloso. Thorace alutaceo, longitudine fere  $2\frac{1}{2}$  latiori, a basi fortiter, subrecte attenuato, angulis apicalibus acutis. Disco convexo, punctura minutissima, vere sparsa ac pilis aliquot indistinctis. Elytris fere glabris, latitudine fere  $1\frac{4}{5}$  longioribus, a basi iam ad apicem subcurvatim, satis fortiter attenuatis, superficie convexa, humeris parum prominentibus, seriatim minutissime punctata.

In honorem Dom. Cordier (Langny-Orne) denominatus. Typi duo, unum in coll. Obenberger, secundum in coll. Cordier.

**82. *Lius dichrous* m. n. sp.**

Hab.: Costa-Rica. Long.: 2·6 mm. Lat.: 1·3 mm.

Capite thoraceque aureis, elytris violaceo cyaneis, nitidus, glaber, satis convexus, parte elytrali basali parum elevata.

Capite parvo, ad anticem prominente, medio impresso, biconvexo. Fronte parallela, tenui; spatio interoculari latitudine fere duplo longiore. Thorace convexo, a basi ad anticem fortiter survatim attenuato, sparse, vere distincte punctato. Elytris latitudine fere  $1\frac{3}{5}$  longioribus, in parte basali tertia subparallelis, dein ad apicem satis breviter rotundatim attenuatis, apice satis tenuiter conjunctim rotundato, superficie minutissime, haud distincte seriatim punctata, sculptura hac postice evanescente. Subtus niger.

**83. *Lius Bergrothi* m. n. sp.**

Hab.: Brasilia — Sao-Paulo (Jaro Mráz lgt.). Long.: 2·3 mm. Lat.: 1 mm.

Corpore subtus, thorace capiteque nigris, elytris cyaneis. Speciei Pauli m. similis, sed capite medio magis impresso, leviter biconvexo, spatio interoculari longitudine paullo, fere  $1\frac{1}{4}$  latiore, thorace haud distincte piloso, elytris magis angustatis, ad apicem minus attenuatis, convexioribus. Domino illustrissimo, Entomologo expertissimo E. Bergroth (Ekenäs-Fennia) animo devoto in honorem denominatus.

**84. *Lius tantillus* m. n. sp.**

Hab.: Costa-Rica. Long.: 2·8 mm. Lat.: 1·3 mm.

Capite thoraceque aureo-aeneis, elytris virescentibus, apicem versus gradatim aenescentibus. Capite medio impresso, biconvexo, fronte ad anticem paullo attenuata, spatio interoculari lato, longitudine fere  $1\frac{1}{4}$  latiori. Thorace nitido, impunctato, convexo, a basi ad anticem fortiter curvatim attenuato. Elytris satis convexis, humeris paullo prominentibus, latitudine fere  $1\frac{3}{5}$  longioribus, in parte tertia basali subparallelis, dein ad apicem fortiter curvatim, longe attenuatis, apicibus ipsis satis anguste rotundatis. Superficie glabra, sparse, seriatim punctata, punctis antice fortibus, gradatim diminutis, in parte apicali obsoletis.