

37.

Josef Mařan:

PTEROSTICHUS FASCIATOPUNCTATUS CREUTZ. SSP. RADOHANUS MIHI, N. SSP.

(Tab. VI. č. 7. a 8.)

Na své exkursi do jižního Kraňska, podniknuté v roce 1924 za pomoci stipendia ze Zoufalova fondu, sbíral jsem *Pterostichus fasciatopunctatus*, jenž jeví značné rozdíly od formy typické. Poněvadž Gangelbauerem popsaná var. *seticollis* (Vh. z. b. G. W. 1899, p. 530) liší se od formy typické toliko větším počtem štětinek před středem na okraji štítu a Dalla-Torrem popsaná var. *azurescens* (Jahrb. Ver. Naturk. Linz VIII. 1877; Schilský Deut. Ent. Zeitschr. p. 201 — Jakobson Žuki Rossii p. 349.) jest jen bezvýznamnou aberací s oloveně modrým leskem, popisují tuto formu jako novou subspecii.

Nová tato lokální rassa nápadná jest tvarem štítu, který jest vpředu zřetelně širší než vzadu, nazad jen slabě vykrojený se zadními rohy poněkud zaokrouhlenými, kdežto u typické formy jest štít vzadu skoro stejně široký jako vpředu; nazad silně vykrojený s ostře pravoúhlými zadními rohy. Hlava větší než u typického. Mentum se dvěma zaokrouhlenými zuby, mezi nimiž je jen mělký zářez (č. 8.), kdežto u typické formy jsou tyto zuby zašpičatělé se zřetelně hlubším zářezem (č. 7.). — Penis před špičkou s malým hrbolkem (u formy typické bez hrbolku). Větší robustnější forma long. 15·5—18 mm. Jest to zřejmě silně odchylná rassa *Pt. fasciatopunctatus*. Sbíral jsem ji na podkladě z devonského vápence a dolomitu nejhojněji před jeskyní »Radoha« v Gorjancích v jižním Kraňsku.

R é s u m é.

Sous-espèce nouvelle est remarquable par la forme du corselet, plus large antérieurement que postérieurement, par les côtés du prothorax beaucoup moins sinueux que chez la forme typique; la tête de *ssp. Radohanus* est plus grande. L'incision médiane du menton est chez la forme typique en angle aigu, tandis que elle est arrondie au fond chez la sous-espèce nouvelle; les deux petites lobes, limitant latéralement cette incision du menton sont subaigus chez la forme typique et largement, distinctement arrondis chez la sous espèce nouvelle. Les angles postérieurs du prothorax sont légèrement subarrondis au sommet, tandis qu'ils sont très aigus et en angle aigu chez le type. L'oeaegus de la forme typique est dans la marge extérieure convexe sans aucune élévation, tandis qu'il est chez le *Radohanus* légèrement et distinctement bosselé avant l'extrémité sur la face convexe. Forme générale du corps robuste et plus trapue. Même coloration que chez le type. Montagnes de Gorjanci en Carniolie dans les environs de Radoha.

V y s v ě t l i v k y. E x p l i c a t i o n.

Tab. VI.

č. 7. = *Pterostichus fasciatopunctatus*, Mentum; č. 8. = *Pt. f. ssp. Radohanus*, Mentum.