

Doc. Dr. Jan Obenberger, Praha:

**ESPÈCES NOUVELLES DU GENRE TRACHYS F. DE L'INSULINDE.
(COL. BUPR.)**

**NOVÉ DRUHY RODU TRACHYS F. Z OSTROVNÍ TROPICKÉ ASIE.
(COL. BUPR.)**

Podávám zde řadu diagnos nových druhů rodu *Trachys*. Tento rod krasců je rozšířen asi v 60 druzích v oblasti palaearktické, z oblasti orientální znám přes 300 druhů, přes 200 druhů je mi známo z Afriky. V Americe žije jen velice málo druhů, z nichž in natura znám je mi jen jediný druh, ač jich je odtud asi 6 popsáno. Veškeré druhy jsou drobné, mezi 1—6 mm délky a jich larvy tvoří chodbičky, t. zv. miny v listech rozmanitých rostlin. Biologie je asi jen u šesti druhů popsána. Typy veškerých druhů zde popisovaných uloženy jsou v Obenbergerově sbírce v Nár. Museu.

1. *Trachys* (Sbg. *Habroloma*) *Androgaea* m. n. sp.

Hab.: Bornéo bor. Long.: 2.5, lat.: 1.5 mm.

D'un bronzé brun obscur et très luisant, couvert de vestiture jaune et fine, asser régulière sur la tête et le prothorax, moins régulière sur les élytres, on elle est condensée, dans la moitié postérieure en une bande large flexueuse postmédiane et une bande droite préapicale, les deux assez mal délimitées et larges. Partie antérieure et latérale élytrale couverte de pubescence moins serrée et subégale, dessous, pattes, antennes, palpes noirs. Tête très large et assez fortement avancée, très légèrement échancrée sur le front en angle peu sensible, marge oculofrontale légèrement subcaréniforme. Epistome très large, très largement échancré antérieurement, très distinctement séparé du front par une carène transversale. Antennes normales, cavités antennaires fortement distantes. Prothorax trois fois plus large que long, largement et peu profondément échancré antérieurement en arc simple, atténué assez fortement depuis la base en ligne arquée, aux angles antérieurs courts et aux angles postérieurs peu prolongés. Surface convexe et luisante, couverte d'une sculpture de mailles très fines et peu distinctes, très légèrement subdéprimée latéralement le long de la base. Ecusson assez petit et en triangle. Élytres $1\frac{3}{5}$ fois plus longs que larges, cunéiformes, avec carène humérale entière et très fine, atténués depuis la base vers le sommet en ligne presque régulièrement arquée, assez étroitement arrondis au sommet, à sculpture formée d'une ponctuation assez rude et assez dense, luisants. Les deux fascies postmédianes d'un jaune un peu plus clair que l'autre pilosité de la surface. Mentonnière distincte. Saillie prosternale en trapèze, $1\frac{1}{2}$ fois plus large que long. Angle latéropostérieure des hanches postérieures aigu.

2. *Trachys* (Sbg. *Habroloma*) *Ephyra* m. n. sp.

Hab.: Bornéo bor. Long.: 2.5, lat.: 1.7 mm.

D'un noir luisant en dessus et en dessous, couvert de pubescence fine argentée, qui est assez régulière sur la tête, couvrant presque entièrement les parties latérales du prothorax et laissant la partie médiane discale presque

glabre. Pubescence élytrale est disposée à peu près comme chez *Tr. conscripta* Obenb. Espèce présente s'éloigne de *conscripta* par les caractères suivants: tête plus petite, un peu plus avancée, aux marges oculofrontales largement arrondies, légèrement et pas trop largement excavée au milieu; épistome étroit, les deux cavités antennaires très rapprochées; les côtés du prothorax encore plus fortement arrondis, aux angles postérieurs plus prolongés postérieurement. Pattes, surtout les tibias, fortes. Lamelles des tarses et les palpes d'un brun ocré très obscur. Angle latéropostérieur des hanches postérieures subarrondi. Saillie prosternale en trapèze très large, deux fois aussi large que longue, à peine atténuée en avant.

3. *Trachys* (Sbg. *Habroloma*) *Callisto* m. n. sp.

Hab.: Borneo. Long.: 2.2, lat.: 1.3 mm.

D'un bronzé brun très obscur et luisant, couvert très régulièrement d'une pubescence fine, assez courte et brune; entre cette pilosité, on voit, sur les élytres, trois fascies blanches, presque droites, larges, assez vagues, de la même densité, que l'autre pubescence des élytres. Tête relativement très petite, légèrement et simplement excavée, aux bords oculofrontaux largement arrondis. Epistome étroit, coupé droit antérieurement, surmonté de deux fovéoles petites profondes rapprochées, les cavités antennaires sont faiblement éloignées l'une de l'autre. Prothorax environ trois fois plus large que long, assez profondément échancré antérieurement en arc simple, fortement atténué en avant en ligne arquée, légèrement subdéprimé vers les angles antérieurs. Écusson très petit, en triangle. Élytres $1\frac{1}{2}$ fois plus longs que larges, subcunéiformes, atténués depuis la base vers le sommet en ligne régulièrement arquée, assez étroitement arrondis au sommet, régulièrement convexes, aux épaules faiblement élevées, à carène humérale entière et fine, assez densément ponctués. Dessous luisant, palpes, antennes noirs, saillie prosternale en trapèze presque parallèle et très large, court, deux fois plus large que long, mentonnière distincte, angle latéropostérieur des hanches postérieures subarrondi.

4. *Trachys* (Sbg. *Habroloma*) *Edusa* m. n. sp.

Espèce cunéiforme, assez faiblement convexe, assez allongée; noir en dessus et en dessous, très luisant. Pubescence général jaune, couvrant presque régulièrement la tête et le prothorax; la majeure partie des élytres à l'apparence glabre, poils jaunes plus condensés latéralement et le long de la suture; une bande étroite preapicale droite et une bande condensée, plus large, arquée, transverse, située au tiers postérieur et remontant le long de la suture et dans une certaine distance de celle-ci jusque vers l'écusson; les deux bandes étant composées de poils fins et d'un blanc argenté. Parties élytrales à l'apparence glabre couvertes de pubescence éparsée régulière. Tête médiocre, légèrement subdéprimée au milieu, marges oculofrontales arrondies, antennes normales. Epistome assez étroit, aussi large que la moitié de la largeur antérieure du front, sans carène, coupé droit antérieurement. Prothorax faiblement échancré antérieurement en arc simple, atténué depuis la base en arc régulier, peu élargi latéralement, aux angles postérieurs aigus et légèrement avancés, aux angles antérieurs courts; convexe, luisant, à peine déprimé latéralement. Écusson petit. Élytres $1\frac{1}{2}$ fois plus longs que larges, régulièrement convexes, atténués depuis la base vers le sommet en ligne régulièrement arquée, sommet assez étroitement arrondi. Carène humérale entière.

Surface très luisante, à ponctuation assez râpeuse et assez grossière. Saillie prosternale large et très courte, en trapèze, deux fois plus large que longue. Mentonnière distincte, au milieu, avant la saillie prosternale, avec une fovéole arrondie (éput-être accidentelle?) Angle latéropostérieur des hanches postérieures subaigu.

5. Trachys (Sbg. Habroloma) Carna m. n. sp.

Hab.: Sumatra. Long.: 2 lat.: 1.3 mm.

Taille assez courte, subcunéiforme, assez convexe. D'un bronzé brun obscur et luisant. Surface couverte d'une pubescence régulière, peu dense, fine et assez courte, ocrée. Sur les élytres, on voit trois courts espaces transversaux couverts de pubescence plus courte et plus brunâtre; pubescence claire est condensée en vagues fascies transversales, dont l'apicale est droite et préapicale oblique. Tête très large, profondément enfoncée dans la marge antérieure du prothorax, dépassant faiblement la ligne transversale entre les deux angles antérieurs du corselet, légèrement et bisinueusement déprimée sur le front, aux marges oculofrontales subcaréniformes; épistome large, caréné, assez distinctement séparé du front. Prothorax très large, presque subparallèle dans la moitié basale, puis largement arrondi et atténué en avant, avec les angles antérieurs avancés, très largement et très profondément échancré antérieurement eu arc profond et simple; surface assez convexe, sensiblement déprimée le long de la marge basale, avec les côtés largement et faiblement subdéprimés. Écusson petit, en triangle, Elytres faisant avec les côtés du prothorax une courbe régulière, environ $1\frac{1}{2}$ fois plus longs que larges, atténués depuis la base jusque vers le sommet, qui est assez largement arrondi. Sculpture élytrale peu dense, mais assez forte et suboblitérée, peu visible sous la pubescence de dessus. Dessous plus noirâtre, palpes et tarses d'un brun ocré et obscur, saillie prosternale courte, en trapèze deux fois plus large que long, mentonnière bien développée. Angle latéropostérieur des hanches postérieures arrondi au sommet.

6. Trachys (Sbg. Habroloma) Jolas m. n. sp.

Hab.: »Malaisie« (sans l'indication de localité plus précise). Long.: 2.3, lat.: 1.4 mm.

Ressemble beaucoup à l'espèce précédente, mais il est plus allongé, plus acuminé postérieurement et plus atténué vers l'apex; tête moins large et un peu plus avancée, avec les marges oculofrontales arrondies, épistome semblable. Prothorax plus fortement atténué depuis la base, vers les angles antérieurs, élytres et toute la surface à pubescence d'un jaune ocré, assez longue, fine, peu dense et très régulière, sans traces de pubescence brune plus obscure des élytres, ou la pubescence jaune est légèrement condensée dans la région suturale au tiers apical. Dessous noir, saillie prosternale en trapèze $1\frac{1}{2}$ fois plus large que long, angle latéropostérieur des hanches postérieures subaigu au sommet.

Les deux espèces, Carna et Jolas m. appartiennent dans la voisinage de Tr. (H.) congener Kerr. et elles portent ce nom, très souvent, dans les collections.

7. Trachys (Sbg. Habroloma) Angilia m. n. sp.

Hab.: Pandjang. Long.: 2.5, lat.: 1.6 mm.

Taille et coloration de lepidoptera H. D., mais plus petite et à pubescence d'un jaune concolore et uniforme; pilosité courte et fine, assez régulière sur la tête et le prothorax, où elle est plus dense latéralement et faisant,

sur les élytres, trois vagues fascies transversales, dont la préapicale est droite, la postmédiane oblique et remontant obliquement vers la suture et fascie antérieure plus vague. Les fascies sont assez vagues et larges et la surface est, en outre, couverte latéralement et çà et là de pubescence jaune semblable. Tête large, mais pas trop grande, n'atteignant pas la moitié de la largeur basale de prothorax, très enfoncée dans le prothorax, très faiblement dépassant les angles antérieurs de lui-même, largement excavée aux marges oculofrontales caréniformes. Epistome large et caréné. Antennes noires et normales. Prothorax très large et assez convexe, légèrement subdéprimé le long de la ligne basale, largement et faiblement déprimé latéralement, subparallèle dans le tiers basal, puis fortement arrondi et atténué vers les angles antérieurs, qui sont aigus et avancés, au bord antérieur profondément échancré antérieurement en arc simple; écusson en triangle. Elytres avec la carène humérale fine et entière, à sculpture légèrement transversalement rugueuse dans la région posthumérale, un peu plus que $1\frac{1}{2}$ fois plus longs que larges, atténués depuis la base, d'abord faiblement, puis plus fortement vers l'apex, qui est assez étroitement arrondi. Dessous d'un noir légèrement bronzé et luisant. Angle latéropostérieur des hanches postérieures subarrondi au sommet. Saillie prosternale en trapèze court, deux fois aussi large que long. Mentonnière bien développée. Saillie prosternale couverte de pubescence fine et éparse, jaunâtre. Pattes et palpes noirâtres.

8. *Trachys* (Sbg. *Habroloma*) *Euchloris* m. n. sp.

Hab.: Pandjang. Long.: 2.7, lat.: 1.5 mm.

Ressemble assez fortement à l'espèce précédente, mais un peu plus étroit, couvert de pubescence jaune plus obscure et plus irrégulière, moins dense, plus longue, ne faisant pas fascies distinctes. Tête plus large, plus avancée, dépassant un peu la moitié de la largeur basale du prothorax. Front très légèrement et bisinueusement déprimée; marge oculofrontale subcaréniforme. Epistome large. Prothorax plus faiblement et très largement échancré antérieurement en arc simple, plus fortement atténué et arrondi depuis la base, plus profondément déprimé le long de la marge basale; forme et sculpture élytrale semblable, mais l'apex plus étroitement arrondi et marge latéropostérieure distinctement denticulée. Pubescence élytrale relativement très longue. Dessous d'un bronzé clair; pattes plus longues, saillie prosternale glabre, en trapèze aussi long que large, angle latéropostérieur des hanches postérieures subaigu.

9. *Trachys* (Sbg. *Habroloma*) *Eriphyla* m. n. sp.

Hab.: Bornéo bor. Long.: 2.1, lat.: 1.3 mm.

D'un noir légèrement brunâtre eu dessus, noir uniforme en dessous. Surface couverte d'une pubescence très éparse, mais régulière, très fine et courte; tête et prothorax couverts de pilosité jaunâtre, élytres couverts de pubescence semblable, noirâtre et très peu apparente, laissant voir trois fascies droites, larges et transversales, très vagues, composées de poils jaunâtres et clairs. Tête relativement très petite, presque imperceptiblement déprimée au milieu du front, marges oculofrontales arrondies. Front étroit, épistome assez indistinctement séparé du front, étroit, marqué en arrière par deux points enfoncés, coupé droit antérieurement, les deux cavités antennaires sont très rapprochées. Prothorax large, échancré antérieurement eu arc simple et peu profond, atténué depuis la base en ligne oblique vers le milieu, puis fortement arrondie vers

les angles antérieurs, qui sont courts. Angles postérieurs aigus et courts. Surface légèrement convexe, à peine déprimée le long de la ligne basale, déprimée plus fortement latéralement. Écusson en triangle. Élytres régulièrement convexes, environ $1\frac{1}{2}$ fois plus longs que larges, luisants, à carène humérale assez forte et entière, atténués en ligne régulièrement arquée jusque vers le sommet, qui est assez étroitement arrondi. Pubescence de la surface peu perceptible, régulière, mais généralement rare et laissant voir le fond luisant. Dessous noir, métasternum fortement ponctué, saillie prosternale deux fois plus large que longue, en trapèze. Angle latéropostérieur des hanches postérieures aigu.

10. *Trachys* (Sbg. *Habroloma*) *Canidia* m. n. sp.

Hab.: Brunei. Long.: 2.3, lat.: 1.5 mm.

D'un bronzé brun obscur et très luisant, noir en dessous. Taille ovulaire, élytres faisant une courbe régulière avec les côtés du prothorax. Surface couverte de pubescence fine et courte, d'un jaune roux, avec trois vagues fascies blanches et étroites sur les élytres, dont la préapicale est droite, postmédiane et antérieure légèrement flexueuses. Tête petite, un peu plus large que le tiers de la largeur basale de prothorax, faiblement dépassant la ligne transversale entre les deux angles antérieurs du prothorax, légèrement déprimée au milieu, avec les marges oculofrontales très légèrement subcaréniformes, presque arrondies. Epistome sans carène transversale, coupé droit antérieurement, assez indistinctement séparé du front, aussi large que la moitié de la largeur antérieure du front. Antennes normales. Prothorax presque trois fois aussi large que long, faiblement échancré antérieurement en arc simple, atténué depuis la base en ligne régulièrement arquée vers les angles antérieurs, qui sont courts. Angles postérieurs courts et aigus. Surface convexe, à peine déprimée le long de la ligne basale et vers les côtés, couverte, comme la tête, de pubescence jaune, fine, régulière et espacée. Écusson petit, en triangle. Élytres atténués depuis la base en ligne régulièrement arquée, $1\frac{1}{2}$ fois plus longs que larges, régulièrement et assez étroitement arrondis au sommet, aux marges latéropostérieures inermes, à carène humérale entière et fine. Les épaules sont assez faiblement élevées. Surface à ponctuation assez rude et assez grossière, mais suboblitérée. Saillie prosternale en trapèze $1\frac{3}{5}$ fois plus large que long, pattes et palpes noirâtres, angle latéropostérieur des hanches postérieures subaigu.

11. *Trachys* (Sbg. *Habroloma*) *Egeria* m. n. sp.

Hab.: Mont Gedeh (Java). Long.: 2.7, lat.: 1.9 mm.

Taille de *lepidoptera* H. Deyr. D'un noir légèrement bronzé et luisant en dessus, noir luisant en dessous. Tête et prothorax couverts de pubescence jaune assez longue, assez irrégulière, plus condensée dans les côtés des prothorax et faisant une bande étroite longitudinale au milieu de lui-même. Pubescence générale élytrale rousse à ornementation formée de poils jaunes, qui forment une bande préapicale et droite et une bande oblique postmédiane, prolongée en avant le long de la suture. Sculpture semblable à celle de *lepidoptera*. Tête très large, très courte, vue de dessus presque plane, front situé à la même hauteur que les angles antérieurs du prothorax; marges oculofrontales en carène et avancées. Prothorax distinctement réfléchi sur les côtés. Epistome aussi large que la moitié de la largeur antérieure du front, largement échancré en avant. Antennes normales. Prothorax trois fois plus large que long, parallèle dans le tiers basal, puis obliquement et fortement

atténué en angle obtus vers les angles antérieurs, qui sont assez avancés. Angles postérieurs aigus et prolongés. Écusson en triangle. Élytres $1\frac{1}{2}$ fois plus longs que larges, cunéiformes, au sommet assez étroitement arrondi. Dessous luisant, angle latéropostérieur des hanches postérieures subarrondis. Saillie prosternale en trapèze $1\frac{1}{2}$ fois plus large que long. Mentonnière distincte. Pattes et palpes noirs.

12. *Trachys* (Sbg. *Habroloma*) *Hyale* m. n. sp.

Hab.: Pandjang (Java). Long.: 2.4, lat.: 1.4 mm.

En ovale presque régulier, plus atténué en arrière qu'en avant, régulièrement convexe. Elytres faisant une courbe régulière avec le prothorax. Surface noire, luisante, couverte d'une pubescence uniforme, fine, éparsée, assez élevée, grise, très régulière sur les élytres, légèrement condensée sur les côtés du prothorax, sans traces de fascies élytrales. Tête assez grande, assez avancée, légèrement excavée, marges oculofrontales presque subarrondies, épistome distinctement séparé du front, aussi large que la moitié de la largeur antérieure du front. Prothorax très régulièrement convexe, sans dépressions, largement et très peu profondément échancré antérieurement en arc simple, atténué depuis la base en une courbe régulière jusqu'aux angles antérieurs, qui sont courts; angles postérieurs aigus et peu prolongés. Écusson en triangle. Elytres $1\frac{1}{2}$ fois plus longs que larges, ayant la plus grande largeur dans le tiers basal, très régulièrement arrondis depuis la base jusqu'au sommet, que est assez étroit, aux épaules très peu élevées, à carène humérale très fine et entière. Dessous noir luisant, saillie prosternale en trapèze $1\frac{1}{3}$ fois plus large que long, et pattes noirâtres, angle latéropostérieur des hanches postérieures aigu.

13. *Trachys* (Sbg. *Habroloma*) *sellatula* m. n. sp.

Hab.: Philippines: Luzon (Mont Makiling). Long.: 2.8, lat.: 1.6 mm.

Espèce très finement sculptée, cunéiforme, assez légèrement convexe, d'un bronzé obscur en dessus, partie médiane du prothorax et partie suturale des élytres plus noirâtre. Surface couverte de pubescence blanche et jaune, dense, adhérente, fine, qui est disposée comme suit: la tête est couverte entièrement de pubescence jaune; partie médiane du prothorax est presque glabre, les côtés sont couverts de pubescence jaune; pilosité blanche fait, sur le prothorax une bande étroite longitudinale médiane et une macule assez grande dans les angles antérieurs. La majeure partie des élytres est couverte de pubescence jaune — pilosité blanche (bordée par pubescence jaune riche) fait une fascie large et irrégulière oblique, faisant une espèce de »V«, dont le sommet est situé derrière le milieu et dont les rameaux sont prolongés vers les épaules. Une fascie flexueuse, interrompue et blanche, étroite est située avant l'apex, qui est plus bronzé. Tête assez courte, simplement et peu profondément excavée, marge oculo frontale arrondie. Epistome aussi large que la moitié de la largeur antérieure du front. Antennes normales. Prothorax très large, subparallèle dans la partie basale, puis fortement atténué vers les angles antérieurs, qui sont aigus. Marge antérieure profondément et largement échancrée en arc simple. Prothorax subdéprimé le long de la marge basale et défléchi latéralement. Écusson en triangle. Elytres cunéiformes, atténués en ligne presque droite et oblique depuis la base jusqu'au sommet, qui est subtronqué et largement arrondi. Carène humérale fine et entière. Fémurs postérieurs dépassent fortement la marge supérieure des hanches postérieures. Saillie prosternale parallèle,

bronzée, aussi longue que large, assez grande. Mentonnière distincte. Angle latéropostérieur des hanches postérieures subarrondi. Partie latérale des hanches postérieures marquée d'une macule de poils blancs.

14. *Trachys* (Sbg. *Habroloma*) *Maera* m. n. sp.

Hab.: Key Islands. Long.: 2°, lat.: 1.5 mm.

Espèce subcunéiforme, courte, assez convexe. Noir luisant en dessus et en dessous, surface couverte de pubescence éparsée et fine, d'un brun noir, peu apparente; élytres avec trois cagues fascies larges et droites, peu distinctes blanches. Tête assez large, peu avancée, légèrement déprimée au milieu, marges oculofrontales arrondies, épistome assez indistinctement séparé du front, largement échancré en avant, aussi large que la moitié de la largeur antérieure du front; antennes noires, normales. Prothorax large et convexe, assez profondément et assez largement échancré en avant, en arc simple, assez fortement atténué depuis la base vers les angles antérieurs, qui sont courts; prothorax légèrement déprimé le long de la ligne basale, marges latérales étroitement déprimées et relevées. Écusson petit, en triangle. Élytres $1\frac{2}{5}$ fois plus longs que larges, atténués fortement depuis la base jusqu'au milieu en ligne droite, puis légèrement arrondis vers le sommet, qui est assez étroit. Épaules peu élevées. Carène humérale fine et entière. Saillie prosternale en trapèze, $1\frac{1}{2}$ fois plus large que long. Angle latéropostérieur des hanches postérieures aigu. Pattes et palpes noirs.

15. *Trachys* (Sbg. *Habroloma*) *Erigone* m. n. sp.

Hab.: Bornéo. Long.: 2.7, lat.: 1.4 mm.

Espèce allongée, subcunéiforme, mais assez convexe. Surface d'un bronzé obscur et assez luisant, un peu violacé, couverte de pubescence assez longue, jaune, assez irrégulière, sur les élytres avec trois très vagues bandes, un peu flexueuses, grises. Tête très large, grande, assez avancée, aux marges oculo-frontales arrondies, à peine déprimée sur le front (vue de dessus), épistome très court, séparé par une carène fine du front, largement échancré antérieurement, aussi large que la moitié de la largeur antérieure du front. Antennes normales. Prothorax très large, convexe, assez faiblement atténué en avant en ligne arquée, très largement et très profondément échancré antérieurement en ligne régulièrement arquée, très légèrement subdéprimé le long de la ligne basale, et le long des côtés, partie médiane presque glabre, parties latérales pubescentes. Écusson petit, en triangle. Élytres $1\frac{3}{5}$ fois plus longs que larges, atténués depuis la base en ligne régulière jusque vers le sommet, qui est assez largement arrondi; élytres forment avec le prothorax une courbe régulière. Sculpture élytrale assez rude, mais superficielle. Saillie prosternale en trapèze, arrondi au sommet, $1\frac{1}{3}$ fois plus large que long. Angle latéropostérieur des hanches postérieures aigu. Pattes et palpes noirs.

16. *Trachys* (Sbg. *Habroloma*) *Clythia* m. n. sp.

Hab.: Australie bor.: Somerset Island. Long.: 2.5, lat.: 1.4 mm.

D'un bronzé violacé et clair, luisant, éparsément couvert de pubescence rousse et fine; sur les élytres avec deux très vagues fascies, étroites et plus claires, jaunes. Espèce cunéiforme, fortement atténuée en arrière. Tête grande,

large, fortement avancée, fortement excavée au milieu en arc simple, marges oculofrontales subcaréniformes, avancées, yeux convexes. Épistome large et échancré en avant en arc large, antennes noires. Prothorax très large, très largement et profondément échancré antérieurement en arc simple; fortement atténué depuis la base en arc régulier, angles antérieurs aigus et avancés, angles postérieurs aigus et courts; prothorax assez fortement déprimé le long de la ligne basale et latéralement. Écusson en triangle. Élytres finement et irrégulièrement sculptés, $1\frac{1}{2}$ fois plus longs que larges, atténués très fortement depuis la base en ligne presque droite vers le sommet, qui est étroitement arrondi. Épaules assez élevées; carènes humérales entières. Fémurs postérieurs dépassent fortement la ligne supérieure des hanches postérieures. Dessus noir, angle latéropostérieur des hanches postérieures aigu. Saillie prosternale en trapèze, $1\frac{1}{2}$ fois plus large que longue.

17. *Trachys* (Sbg. *Habroloma*) *Caia* m. n. sp.

Hab.: Bornéo. Long.: 2.9, lat.: 1.8 mm.

D'un bronzé cuivreux obscur et luisant, noir en dessous. Surface couverte densément de pubescence fine, courte, très régulière, rousse; sur le prothorax trois petites macules, sur les élytres trois fascies flexueuses et interrompues, étroites blanches. Tête courte, large, dépassant assez fortement la ligne entre les deux angles antérieurs du prothorax, à peine déprimée, marges oculofrontales arrondies. Epistome nettement séparé du front et large; cavités antennaires éloignées l'une de l'autre. Antennes noires et normales. Prothorax trois fois aussi large que long, assez largement et peu profondément échancré antérieurement en arc simple; latéralement subparallèle dans le tiers basal, puis fortement atténué en ligne oblique vers les angles antérieurs, qui sont courts. Angles postérieurs aigus et assez prolongés en arrière. Surface convexe, légèrement déprimée le long de la ligne basale et vers les côtés. Écusson petit, en triangle. Élytres $1\frac{3}{5}$ fois plus longs que larges, convexes, d'abord faiblement, depuis le milieu plus fortement atténués en une courbe régulière vers le sommet, qui est assez étroitement arrondi. Épaules assez élevées. Carène humérale fine et entière. Sculpture fine et assez dense. Dessous luisant, saillie prosternale en trapèze, $1\frac{3}{4}$ fois plus large que long. Pattes et palpes noirâtres. Mentonnière distincte, angle latéropostérieur des hanches postérieures subarrondi.

18. *Trachys* (Sbg. *Habroloma*) *Crataeis* m. n. sp.

Hab.: Australie bor.: Somerset Island. Long.: 2, lat.: 1.2 mm.

D'un bronzé noirâtre et assez luisant, le fond sous la pilosité rousse étant d'un cuivreux clair. Dessous d'un bronzé noirâtre et glabre. Pilosité de dessus très éparsse, d'un jaune roux, fine, couvrant la tête et les parties latérales du prothorax et formant trois fascies étroites et droites, très vagues sur les élytres. Tête petite, épistome très étranglé entre les deux cavités antennaires, qui sont très rapprochées, front, du de dessus, légèrement excavé, yeux presque concaves et à peine visibles de dessus, marges oculofrontales subcaréniformes. Prothorax $2\frac{1}{2}$ fois plus large que long, atténué depuis la base vers les angles antérieurs en arc régulier et assez faible, aux angles antérieurs avancés et saillants, marge antérieure profondément échancrée en arc simple. Prothorax légèrement déprimé le long de la ligne basale, avec une impression arrondie dans les angles

postérieurs; les marges sont antérieurement, près des angles antérieurs, largement déprimés. Écusson triangulaire. Élytres $1\frac{1}{2}$ fois plus longs que larges, atténués depuis la base vers le sommet en une ligne régulièrement courbée, faisant avec les côtés du prothorax une ligne courbée régulière. Epauls assez faiblement saillantes. Sommet élytral assez étroitement arrondi. Dessous noir, angle latéropostérieur des hanches postérieures arrondi. Saillie prosternale $1\frac{1}{2}$ fois plus large que longue, en trapèze.

19. *Trachys* (Sbg. *Habroloma*) *Elyssia* m. n. sp.

Hab.: Ile Batoe. Long.: 2.3, lat.: 1.3 mm.

D'un bronzé verdâtre et luisant; taille allongée, ovulaire, assez peu convexe, les côtés du prothorax forment avec les élytres une courbe régulière. Toute la surface couverte de pubescence régulière, assez dense, assez longue, blanche, sans traces de fascies sur les élytres. Tête assez petite, n'atteignant pas la largeur de la moitié de la base du prothorax, assez faiblement excavée antérieurement, avec les marges oculofrontales arrondies. Epistome étroit, les deux cavités antennaires rapprochées, la marge antérieure de l'épistome coupée en ligne droite. Prothorax trois fois plus large que long, marge antérieure du prothorax assez fortement échancrée en arc simple; surface assez convexe, légèrement déprimée de long de la marge postérieure du prothorax et déprimé assez largement sur les côtés. Écusson en triangle. Élytres $1\frac{1}{2}$ fois plus longs que larges, atténués depuis la base vers le sommet en une courbe régulière, sommet assez largement arrondi. Carène humérale entière, épaules assez élevées. Dessous noir, pattes assez courtes, palpes et tarses noirs, angle latéropostérieur des hanches postérieures arrondi. Saillie prosternale $1\frac{1}{2}$ fois plus large que longue, en trapèze. Montonnrière distincte.

20. *Trachys* (Sbg. *Habroloma*) *benguëtensis* m. n. sp.

Hab.: Philippines: Benguet, Baguio, Luzon (Boettcher lgt.) Long.: 2.4—2.7, lat.: 1.3—1.4 mm.

Espèce allongée, cunéiforme, assez étroite, d'un noir un peu brunâtre, très luisant; dessous, pattes, palpes noirs. Surface couverte de pilosité courte, très dense, rousse, sur les élytres avec trois fascies blanches et flexueuses; fascie préapicale droite; prothorax avec quelques petites macules blanches et vagues; tout le dessin élytral vague et peu distinct. Tête large et assez avancée, épistome large, les deux cavités antennaires fortement éloignées l'un de l'autre. Marge oculofrontale arrondie. Front (vu de dessus) à peine déprimé. Prothorax large, brièvement avant la base, puis fortement atténué vers les angles antérieurs, qui sont courts. Marge antérieure du prothorax très largement et profondément échancrée en arc simple; surface convexe, légèrement subdéprimé de long de la ligne basale, et latéralement. Écusson en triangle. Élytres $1\frac{2}{3}$ fois plus longs que larges, subparallèles jusqu'avant le milieu, puis assez faiblement atténués en ligne arquée vers le sommet, qui est assez large. Carène humérale fine et entière. Epauls assez élevées. Marge latéropostérieure inerme. Dessous luisant, angle latéropostérieur des hanches postérieurs arrondi. Saillie prosternale en trapèze, un peu plus long que large. Pattes assez longues.

21. *Trachys* (s. str.) *Libitina* m. n. sp.

Hab.: Sarawak. Long.: 2·3, lat.: 1·3 mm.

Espèce ovalaire, convexe, d'un noir luisant; surface couverte d'une pubescence très peu distincte, assez longue, adhérente, peu régulière, peu dense, composée de poils noirs et roussâtres, entremêlés. Tête grande et large, légèrement excavée, epistome assez large, échancré en avant, antennes normales, noires. Marges oculofrontales largement arrondies. Prothorax environ trois fois plus large que long, obliquement et fortement atténué depuis la base, largement et peu profondément échancré en arc simple. Surface régulièrement convexe, très légèrement déprimée dans les angles postérieurs. Surface de la tête et du prothorax à pubescence plus jaunâtre et éparse. Écusson très petit. Elytres $1\frac{1}{2}$ fois plus longs que larges, subparallèles jusqu'au milieu, puis atténués en courbe longue et régulière vers l'apex, qui est assez étroitement arrondi. Épaules légèrement saillantes. Sculpture élytrale formée de fovéoles larges et superficielles, d'ailleurs suboblitérées. Saillie prosternale environ deux fois plus longue que large, étroite et brusquement élargie au sommet. Angle latéropostérieur des hanches postérieures arrondi. Palpes et tarses d'un brun ocré assez clair. Dessous noir et luisant.

22. *Trachys* (s. str.) *Manilia* m. n. sp.

Hab.: Sarawak. Long.: 2·8, lat.: 1·7 mm.

Espèce ovalaire, assez faiblement convexe, à pubescence et à sculpture dense. Faiblement luisant, d'un noir intense en dessus et en dessous. Tête et prothorax, ainsi que l'ornementation élytrale couverts de pubescence dense, très régulière, fine, d'un jaune un peu roussâtre; surface élytrale couverte d'une pubescence semblable, mais noire et moins perceptible. Tête très large, largement et profondément excavée au milieu, aux yeux convexes et marges oculofrontales subarrondies et élevées. Epistome assez large, chagriné, échancré en arc antérieurement, très distinctement séparé du front par un bourrelet transversal et surmonté de deux points grands et enfoncés; antennes noires et normales. Prothorax trois fois plus large que long, régulièrement convexe, légèrement déprimé vers les angles antérieurs. Marge antérieure très largement échancrée en arc assez profond et large. Prothorax atténué latéralement jusqu'au milieu assez faiblement et en ligne droite, oblique, puis arrondi plus fortement vers les angles antérieurs, qui sont courts; angles postérieurs aigus, mais à peine prolongés. Écusson petit, en triangle. Pilosité de la tête et du prothorax très régulière. Elytres $1\frac{1}{2}$ fois plus longues que larges, un peu plus larges que la base du prothorax, aux épaules assez saillantes, atténués d'abord très faiblement, depuis le milieu plus fortement et en ligne régulièrement arquée vers le sommet, qui est assez étroit. Ornementation élytrale jaune est composée d'une bordure commune et étroite de l'apex et puis d'une figure large en espèce d'un »X«, c'est à dire: une bande ou macule commune aux deux élytres en forme d'un »V«, située derrière et dans une certaine distance de l'écusson et dont le sommet est situé sur la suture, exactement au milieu; elle est jointe, sur chaque élytre, au sommet interne et supérieur d'une large et courbée fascie transversale, qui est anguleuse sur son bord interne et postérieur, qui est situé dans le tiers postérieur et qui fait, de part et d'autre, les rameaux inférieurs et prolongés de ce »X«, qui est très nettement délimité et couvert de pubes-

cence jaune de la même forme et composition, comme celle du prothorax. Marge latéropostérieure inerme. Saillie prosternale deux fois plus longue que large, très légèrement dilatée postérieurement et subparallèle. Une très courte mentonnière est développée. Pattes et palpes d'un jaune roux très clair. Angle latéropostérieur des hanches postérieures arrondi.

23. *Trachys* (s. str.) *Cleopatra* m. n. sp.

Hab.: Sarawak. Long.: 4, lat.: 2.3 mm.

Espèce très robuste, très convexe, finement sculptée, fortement atténuée en arrière, ovalaire. Surface noire, peu luisante, à cause de ponctuation très dense et fine du prothorax et des élytres et à cause de pilosité fine, très dense, courte, qui fait la couverture régulière de dessus. Cette pubescence est d'un brun très obscur sur la tête et le prothorax, où on voit, en outre, quelques macules, formées de pubescence blanche; sur les élytres cette pubescence est marbrée et la pilosité blanche est prédominante, couvrant presque entièrement les élytres, avec quelques poils obscurs et rares entremêlés. Apex extrême élytral obscur. Tête très grande et très large, à partie antérieure luisante et peu pubescente, vue de dessus très légèrement impressionnée au milieu, aux bords oculofrontaux arrondis: sur le vertex avec deux macules petites de poils blancs. Epistome grand, profondément échancré antérieurement en arc, séparé par un léger bourrelet arqué du front et surmonté de deux grands points ronds et enfoncés. Antennes courtes et normales. Sous l'oeil, on observe, de part et d'autre, un sillon étroit, pour y loger les antennes. Prothorax régulièrement convexe et très large, écharicré en arc très large et très régulier, simple antérieurement, légèrement subdéprimé le long de la ligne basale, obliquement atténué en ligne droite en avant. Ecusson presque invisible. Elytres $1\frac{1}{2}$ fois plus longs que larges, parallèles jusqu' avant le milieu, puis arrondis vers le sommet en ligne très régulièrement arquée. Marge latéropostérieure inerme, apex assez étroit. Saillie prosternale subparallèle, environ $2\frac{1}{3}$ fois plus longue que large, pattes courtes et étroites, tarsi noirs, lamelles ocrées, palpes d'un roux très clair. Angle latéropostérieur des hanches postérieures subarrondi.

Appartient dans le voisinage de *Tr. albolineata* Kerr.

24. *Trachys* (s. str.) *Leucippe* m. n. sp.

Hab.: Borneo. Long.: 3.3, lat.: 2.2 mm.

D'un noir très légèrement bleuâtre en dessus, d'un noir bronzé et luisant en dessous. Palpes et tarsi d'un roux très clair. Taille avalaire, robuste, convexe, assez atténuée postérieurement; surface faiblement luisante à cause de couverture très dense, fine, très courte et régulière de poils noirs; sur les élytres on voit une seule bande préapicale grise, étroite, assez faiblement distincte, située dans le tiers postérieur, très flexueuse. Tête très large, grande, plus luisante antérieurement, largement échancrée en angle très obtus, au bord oculofrontal arrondi. Antennes noires, normales. Epistome grand, chagriné, large, profondément échancré en arc, nettement délimité postérieurement et muni, au dessus des coins externes, d'une fovéole arrondie et profonde. Au dessous de l'oeil, on observe un sillon étroit, pour y loger les antennes. Prothorax plus que trois fois plus large que long, très largement et profondément échancré antérieurement en arc simple et profond, atténué assez fortement

depuis la base en ligne légèrement arquée, convexe. Ecusson peu visible, très petit. Elytres plus larges que le prothorax, $1\frac{2}{5}$ fois plus longs que larges, atténués depuis les épaules jusque vers le sommet en ligne longue et très régulièrement arquée, sommet assez étroitement arrondi, marge latéropostérieure finement denticulée. Ponctuation élytrale fine et très dense. Saillie prosternale parallèle, deux fois aussi longue que large. Mentonnière nulle. Angle latéropostérieur des hanches postérieures arrondi.

25. *Trachys* (s. str.) *Furnia* m. n. sp.

Hab.: Sumatra: Soekaranda. Long.: 3, lat.: 2 mm.

Da voisinage de *T. verna* Kerr. et *Fisheri* Obenb.

Espèce noire, peu luisante, assez robuste, ovale, assez convexe, subparallèle; surface couverte de dessin marbré d'un blanc argenté; sur les élytres il est composé de lignes très onduleuses et denses, étroites, très flexueuses, les deux préapicales seules étant mieux délimitées, rapprochées et entières. Les espaces à l'apparence glabre entre cette pilosité claire couverts de pubescence noire, dense, peu apparente et fine. Tête très large, grande, avancée, légèrement excavée, épistome chagriné, large, largement et profondément échancré en arc, nettement séparé du front. Marges oculofrontales arrondies. Antennes normales, noires. Prothorax très large et convexe, presque $3\frac{1}{2}$ fois plus large que long, au bord antérieur très largement échancré en arc simple et profond, obliquement atténué depuis la base en ligne droite, à pubescence prédominante blanche, avec quatre macules discales, situées en une ligne transversale, obscures. Ecusson très petit. Elytres $1\frac{1}{2}$ fois plus longs que larges, subparallèles, jusqu'au milieu et légèrement sinueux derrière les épaules, qui sont assez élevées, atténués ensuite en une courbe régulière vers le sommet, qui est assez large. Marge latéropostérieure denticulée. Dessous d'un noir luisant, palpes et tarses d'un jaune clair, saillie prosternale large et courte, en trapèze $1\frac{1}{4}$ fois plus long que large, une courte mentonnière est développée. Angle latéropostérieur des hanches postérieures arrondi au sommet.

26. *Trachys* (s. str.) *Dido* m. n. sp.

Hab.: Sumatra or. bor. Long.: 2.2, lat.: 1.3 mm.

D'un noir luisant. Espèce ovale, assez courte, assez robuste, assez convexe. Dessous, palpes, tarses, antennes noirs. Pubescence de dessus très fine et assez dense, tricolore: rousse, blanche et (sur la majeure partie élytrale, qui est de l'apparence glabre) noirâtre. Tête large, assez excavée, avec, les bords oculofrontaux arrondis, épistome chagriné, nettement délimité postérieurement, échancré en arc. Surface de la tête couverte de pubescence rousse uniforme et très claire. Prothorax trois fois plus large que long, échancré en avant en arc simple et profond, fortement atténué latéralement en avant en arc faible, convexe, légèrement subdéprimé le long de la marge basale, couvert de pubescence fine et mélangée, rousse et blanche, avec quatre macules obscures discales. Ecusson très petit, en triangle. Elytres $1\frac{1}{2}$ fois plus longs que larges, plus larges que la base du prothorax, parallèles jusqu'au milieu, puis largement arrondis vers le sommet, qui est assez large, au bord latéropostérieur inerme. Surface assez luisante, pilosité jaune faisant une bordure étroite suturale depuis l'écusson jusqu'au tiers apical, pubescence blanche formant, dans la partie antérieure, quelques fragments de fascies étroites et flexueuses et, d'après le

tiers apical, deux bandes étroites et entières, très flexueuses, et distinctes, l'autre surface à pubescence noirâtre et peu visible. Pattes courtes. Saillie prosternale plus que deux fois aussi longue que large, étroite et brusquement subdilaté à l'apex. Angle latéropostérieur des hanches postérieures aigu.

27. *Trachys* (s. str.) *Cicuta* m. n. sp.

Hab.: Palawan bor.: Binaluan. Long.: 2.8, lat.: 1.3 mm.

Taille ovulaire, allongée, assez faiblement convexe. D'un noir légèrement bronzé en dessous, d'un noir intense et luisant en dessous. Pattes et palpes d'un jaune clair. Surface couverte de pubescence dense, fine, régulière, d'un jaune clair, qui fait couverture régulière de la tête et du prothorax; en outre le $\frac{1}{5}$ basal des élytres et la moitié postérieure élytrale sont couverts de la même pubescence — l'autre surface élytrale, ainsi que, de part et d'autre, une macule arrondie et préapicale sont couvertes de pubescence noire semblable, mais très peu distincte. Tête large et assez peu avancée, profondément et assez étroitement excavée, aux bords oculofrontaux arrondis. Epistome étroit, assez nettement séparé du front. Prothorax convexe, trois fois plus large que long, largement et peu profondément échancré en avant en arc simple, assez fortement atténué en avant en ligne légèrement arquée, légèrement subdéprimé latéralement; écusson très petit. Elytres de la même largeur que le prothorax, $1\frac{3}{5}$ fois plus longs que larges, atténués depuis la base, d'abord faiblement, depuis le milieu plus fortement vers le sommet, qui est assez étroitement arrondi. Sculpture du dessus fine, peu distincte sous la pilosité générale. Saillie prosternale subparallèle, légèrement sinueuse latéralement et faiblement subdilaté au sommet. Angle latéropostérieur des hanches, postérieures arrondi.

28. *Trachys* (s. str.) *Phoebe* m. n. sp.

Hab.: Sumatra bor. Long.: 3.6, lat.: 2.6 mm.

Espèce ovulaire, convexe, très robuste, couverte de pubescence rousse, blanche et noire; pilosité noire, couvrant les espaces à l'apparence glabre, est le moins distincte et très courte; pubescence de dessus est dense, très fine et courte. Tête grande et large, vue de dessus largement excavée en angle obtus. Marges oculofrontales arrondies. Epistome assez large et distinctement séparé du front; pilosité de la tête rousse, avec deux macules blanches et arrondies sur le vertex. Prothorax très large, environ $3\frac{1}{2}$ fois plus large que long, profondément et très largement échancré antérieurement, convexe, très légèrement déprimé dans les angles postérieurs, couvert de pubescence rousse; pubescence blanche disposée en trois bandes longitudinales, dont la médiane est assez large et porte, au milieu, quelques poils roux; en outre, il y a quatre grandes macules obscures sur le disque, situées transversalement. Prothorax assez fortement atténué en avant en ligne oblique. Écusson très petit. Elytres environ $1\frac{3}{5}$ fois plus longs que larges, robustes, convexes, avec les épaules assez élevées, parallèles depuis la base jusqu'au milieu et puis assez largement arrondis, finement denticulés depuis le sommet jusque presque vers les épaules. pilosité rousse forme bordure étroite de la base, puis une macule humérale et une macule commune scutellaire; pilosité blanche fait quelques fragments des bandes flexueuses et étroites dans la partie basilaire, puis dans le tiers apical, deux bandes flexueuses, étroites et parallèles; l'espace entre ces deux bandes étant rempli de pilosité rousse; toute l'autre surface élytrale à pubes-

cence noire. Palpes et tarses d'un roux clair, saillie prosternale parallèle et deux fois plus longue que large, angle latéropostérieur des hanches postérieures arrondi.

29. Trachys (s. str.) Orcas m. n. sp.

Hab.: Manila (Philippines, Boettcher lgt.) Long.: 3, lat.: 1.7 mm.

De vicinité de *Tr. Fisheri* Obenb. de Philippines.

Espèce noire, assez luisante, allongée, ovulaire; tête à pubescence fine et dense, uniforme, rousse, élytres et prothorax à fascies étroites blanches, qui sont, sur les élytres, très flexueuses et en nombre de quatre, les antérieures étant très irrégulières. Tête très large, largement et anguleusement excavée, marge oculofrontale arrondie. Epistome chagriné, nettement séparé du front. Prothorax très large, trois fois plus large que long, convexe, légèrement déprimé le long de la marge basale, assez faiblement atténué en avant en arc faible. Écusson très petit. Elytres $1\frac{1}{2}$ fois plus longs que larges, un peu plus larges que le prothorax, avec les épaules assez saillantes, subparallèles jusqu'au milieu, puis atténués en une courbe régulière jusque vers le sommet, qui est assez largement arrondi. Marge latéropostérieure denticulée. Sculpture fine et assez dense, peu distincte sous la pubescence générale. Dessous noir et luisant, palpes et tarses d'un brun ocré obscur, saillie prosternale trois fois plus longue que large, aux bords sinueux et rapprochés au milieu et au sommet subarrondi. Angle latéropostérieur des hanches postérieures arrondi.

30. Trachys (s. str.) Van Rooni m. n. sp.

Hab.: Philippines: Donsalan (Mindanao), Damalon (Luzon), Manila (Luzon) (Boettcher lgt.). Long.: 2.3—2.8, lat.: 1.2—1.8 mm.

Espèce ovulaire, assez convexe, couverte de pubescence d'un brun roussâtre, d'un blanc argenté et d'un noir brunâtre, la dernière étant le moins distincte. D'un noir légèrement cuivreux et luisant en dessus, d'un noir intense en dessous. Tête anguleusement excavée, assez large, marge oculofrontale arrondie, épistome assez grand et chagriné et assez distinctement séparé du front. Tête couverte de pubescence rousse avec deux macules petites et blanches sur le vertex. Prothorax convexe, à peine trois fois plus large que long, assez faiblement échancré antérieurement en arc simple et faible, assez fortement atténué latéralement en ligne légèrement arquée, avec sept macules blanches et petites entre la pubescence générale, qui est d'un brun roux. Écusson très petit. Elytres $1\frac{1}{2}$ fois plus longs que larges, un peu plus larges que la base du prothorax, avec les épaules assez saillantes, subparallèles jusqu'au milieu, puis atténués en une courbe longue et régulière vers le sommet, qui est assez large. Pubescence rousse fait la bordure étroite de la suture, puis elle est dispersée latéralement et vers la base; pubescence blanche fait trois fascies étroites, dont la préapicale est les deux autres flexueuses; les espaces à l'apparence glabre entre ces fascies étant couverts de pubescence noirâtre et peu distincte. Saillie prosternale étroite, environ deux fois plus longue que large, dilatée à l'apex et atténuée en avant en ligne droite. Angle latéropostérieur des hanches postérieures arrondi. Palpes et trases d'un brun ocré très obscur.

Nommé à l'honneur de M. Van Roon de Rotterdam.

31. Trachys (s. str.) Noarche m. n. sp.

Hab.: Philippines (Manila, Luzon). (Boettcher lgt.). Long.: 2.5—2.8, lat.: 1.3—1.6 mm.

Forme et taille de l'espèce précédente, un peu plus grêle; tête et prothorax d'un bronzé verdâtre assez clair et couverts de pubescence d'un jaune doré très clair, élytres noirs, avec trois bandes assez larges et assez vagues, flexueuses, blanches, dans la partie suturale avec quelques macules peu distinctes de poils jaunes et aux espaces à l'apparence glabre couverts de pubescence noirâtre, peu distincte. Pilosité de dessus est plus longue et moins dense que chez Van Rooni, plus irrégulière et la nuance jaune est beaucoup plus claire. Prothorax, parfois, avec trois macules blanches et petites. Tête assez petite, assez profondément et anguleusement excavée au milieu, aux marges oculofrontales sub-caréniformes. Epistome chagriné, peu distinctement séparé du front. Prothorax assez fortement échancré antérieurement en arc simple et profond, fortement atténué en avant en ligne arqueé, convexe, légèrement subdéprimé latéralement; écusson petit. Elytres $1\frac{1}{2}$ fois plus longs que larges, atténués depuis la base, plus fortement depuis le milieu, vers le sommet, qui est assez étroitement arrondi. Saillie prosternale et hanches postérieures comme chez Van Rooni. Palpes et tarsi d'un jaune roux très clair.