

68.

A. Hustache, Lagny S. et M. (France):

DEUX ZYGOPINI NOUVEAUX DE L'AMÉRIQUE MÉRIDIONALE DANS LES COLLECTIONS DU MUSÉUM DE PRAGUE.

1. *Copturus nigratarsis* n. sp.

Oblong, noir, en dessus dénudé, le prothorax avec seulement quelques squamules cendrées dans les angles et devant l'écusson, les élytres avec une fascie squamuleuse vers le tiers basal s'effaçant vers le 8. ou 9. interstrie, une tache basale en dedans du calus huméral, une macule vers le milieu de la suture (s'étendant sur le 2. interstrie), une linéole apicale sur la suture, prolongée sur le bord apical, tout ce dessin formé de squamules allongées, assez épaisses, jaunâtres, celles des stries blanchâtres, la fascie antérieure recouvrant une tache des téguments d'un rouge ferrugineux. Dessous et pattes très densément revêtus des squamules blanches, les fémurs postérieurs avec le tiers apical noir, les tibias en partie noirs.

Rostre arqué, à la base modérément élargi, rugueusement ponctué avec une étroite et courte ligne médiane lisse et les côtés squamulés. Yeux séparés par une ligne, inférieurement très étroite et squamulée, supérieurement élargie, creusée et glabre. Tête densément pointillée, avec une plaque sur le vertex, triangulaire et alutacée. Antennes d'un noir de poix, le scape et le 1. article en partie ferrugineux, les articles du funicule pourvus en dessus d'une pubescence squamuleuse cendrée, les deuxième peu allongé, un cinquième moins long que le 1., à peu près aussi long que les 3. et 4. réunis, les articles 3—7 courts et graduellement épaissis, aussi longs ou peu plus longs qu'épais, la massue oblongue, son 1. article seulement aussi long que large et moindre que la moitié de la longueur totale de la massue.

Prothorax un peu plus large que long, presque d'égale largeur à ses extrémités, en avant brièvement resserré, les côtés faiblement et assez régulièrement arqués; peu convexe, à ponctuation forte, profonde, serrée, confluyente en rugosités transversales, avec des traces d'une ligne médiane imponctuée. Écusson convexe, glabre, entouré d'un profond sillon.

Élytres à peine de moitié plus larges que le prothorax, plus longs que larges, subtriangulaires, au sommet échancrés en arc faible, le sommet du 3. interstrie en dent obtuse, le bord apical très finement crénelé; épaules très obliquement arquées, leur calus gros, élevé, lisse au sommet; disque déprimé, profondément sillonné caténulé; interstries étroits, pas plus larges que les sillons, élevés, pourvus d'une série de points assez forts et très serrés, longitudinalement confluentes: côtés du disque, vers le tiers postérieur, obliquement impressionnés.

Pattes robustes, fémurs linéaires, les antérieurs et intermédiaires inermes en dessous, les postérieurs atteignant l'apex des élytres, en dessous munis d'une assez forte dent, leur face externe carénée, les lobes de leur genoux arrondis. Tibias assez épais, normaux: tarces et ongles d'un noir de poix. Hanches antérieures prolongées en arrière par un tubercule obtus. Mésosternum non impressionné.

Long.: 3.7—3.9 mm.

Brésil: Sao Paulo, (Muséum de Prague), 8 spécimens.

Espèce à rattacher au groupe III d'Heller, malgré la brièveté un peu anormale des antennes.

2. *Eulechriops carnicollis* n. sp.

Brièvement ovale, noir, mat, les antennes et les tarsi d'un jaune testacé, en dessus revêtu d'une très fine et courte pubescence noire, la base des trois ou quatre premiers interstries avec quelques poils cendrés. Dessous avec les points du métasternum écartés et donnant naissance à de courts poils gris ou bruns, fins et espacés.

Rostre, en avant luisant et parfois brun, à la base sur les côtés comprimé et pointillé, sa carène médiane lisse, assez vive et prolongée en arrière entre la base des yeux. Ligne interoculaire très étroite, glabre, s'élargissant seulement au sommet des yeux. Tête entièrement mate, glabre, à pointillé très fin et épars. Antennes insérées vers le tiers basal du rostre, finement pubescentes, le 2. article du funicula aussi long que le 1. et que les 3. et 4. réunis, les trois derniers subglobuleux.

Prothorax à la base plus du double aussi large que long au milieu, en avant rétréci, derrière le bord antérieur resserré; très fortement convexe, graduellement relevé des côtés au milieu, la ligne médiane avec une forte carène lisse; ponctuation forte, serrée sur le disque, devenant très espacée sur les flancs, les intervalles des points densément pointillés rugueux. Écusson ovale, rugueux.

Elytres larges, en demi ovale, indistinctement plus longs que larges, en arrière peu rétrécis et largement arrondis, subtronqués au sommet, devant ce dernier transversalement déprimés; calus huméral très gros et rugueux; disque convexe mais brièvement déprimé le long de la base et profondément le long de la suture jusqu'à son tiers postérieur; profondément sillonnés ponctués; interstries élevés, les impairs un peu plus larges que les pairs, tous beaucoup plus larges que les sillons, criblés de points rugueux.

Pattes robustes, rugueuses, leur pubescence très courte et très fine, fonce, extrémée de quelques poils gris; fémurs inermes, canaliculés en dessous, non carénés extérieurement, les postérieurs atteignant le 3e segment ventral. Tibias robustes, droits, ferrugineux en totalité ou en partie.

Epimères mésothoraciques alutacés, avec quelques points seulement vers leur bord supérieur. Métasternum et abdomen à points espacés, séparés par des intervalles du double environ de la grandeur des points et alutacés. Bord postérieur du prosternum pourvu d'un petit tubercule derrière les hanches, mais ces dernières ainsi que les intermédiaires dépourvues de tubercule.

Long.: 3.5—3.8 mm.

Brésil, sans localité précise, ma collection (ex Staudinger); Sao Paulo, une série de spécimens (Mus. de Prague).

Cette espèce est intermédiaire entre les *Eulechriops* Faust et *Macrolechriops* Champ.; par sa taille et la forme elle se rapproche de ces derniers, par ses autres caractères des *Eulechriops*.