

Jan Roubal:

**POPSÁNÍ ČTYŘ NOVÝCH PALAEARKTICKÝCH COLEOPTER.
DESCRIPTIONES QUATTUOR COLEOPTERORUM REGIONIS
PALAEARCTICAE.**

1. Conspectus formarum *Cantharidis lateralis* L.

(K variabilitě *Cantharis lateralis* L.)

a) Pronotum unicolor testaceum:

forma nominata.

b) Pronotum testaceum, medio duabus maculis nigris separatis:

f. notaticollis Schil. Deut. Ent. Zeitschr. 1900, p. 178 («in der Mitte befinden sich zwei getrennte, schwarze Makeln» = *f. nigronotata* Reitt non. Pic.). Faune Germ. III, 1911, p. 257.

Cum *f. nom.*, passim.

c) Pronotum ante basim media macula nigra irregulari:

f. nigronotata Pic. (non. Reitt.). L'Échange, 1905, p. 186 («orné près de la base d'une macule noire à contours irréguliers»).

Kalávryta.

d) Pronotum in disco sex maculis nigris magnis, eius dimidiam fere partem tegentibus: duabus longis centralibus basi approximatis, quarum ad apices utrinque maculis singulis rotundatis. Maculae omnes sex separatae, in toto fere signum X. efficientes.

f. sexnotata n.

Slovakia meridionalis: Hetjň, 30. IV. 1934 (Roubal).

(Tento přehled opravuje a doplňuje dosavadní literární údaje o variabilitě zmíněné *Cantharis*, hlavně uvádí na správnou míru okolnost, že Reitter, l. c. zaměnil dvě formy, dav jedné jméno druhé. Tabulka dosavadních forem jest doplněna jednou formou novou ze Slovenska).

2. *Corymbites depressus* Germ. f. *claripes* n.

Antennis pedibusque flavotestaceis (in *f. nominata* obscurebrunneis).

Slovakia: Helemba (Roubal).

(Tato forma velmi nápadně se vyjímá mezi řadami kusů, u nichž barva okončin je vždy nápadně stálá, tmavá.)

3. *Aphanisticus pygmaeus* Luc. v. *sulcipennis* n.

Elytris in singulo uni- sive bisulcatis, sulcis longis, profundis, ita instructis, uti a. ex. in *Iulodi onopordi* F. ssp. *lineigera* Mar. videtur.

Bohemia: Příbram (Roubal), Jakule (Roubal).

(Nápadná odchylka, působící naprosto nezvyklým dojmem a zasluhující pozornosti pro strukturální tendenci k podélnému rýhování krovek — znaku to u *Buprestidů* namnoze vlastnímu; zajímavá, že nejde jen o individuální odchylku, když byla pozorována na dvou různých odlehlých místech.)

4. *Megamecus chlorophanus* Reitt. v. *albosquamosus* n.

Differt a *f. nominata* colore squammarum totius corporis albis, non metallicis (auctor nominat *Megamecum chlorophanum* »metallisch, grün beschuppt«), pronoto transverso.

As. c.: Čardžhui, 15. V. 1910 (coll. Roubal, auctor vidit, olim).

(Velká odlišnost od základní formy dobře zřejmě z diagnosy a na základě bohatšího materiálu by asi ukázalo, že *albosquamosus* n. je novým druhem.)