

Auctore *Johanne Roubal*:

**POPIS NOVÉHO ANTHEROPHAGA: A. ŠPAČEKI N. (COL.,
CRYPTOPHAGIDAE) A PŘEHLED PALAEARKTICKÝCH DRUHŮ
TOHOTO RODU:**

**DESCRIPTIO GENERIS ANTHEROPHAGI LATR. (COL.,
CRYPTOPHAGIDAE) SPECIEI NOVAE — ANTHEROPHAGUS ŠPAČEKI
N. ADJECTO CONSPECTU ANALYTICO SPECIERUM
PALAEARCTICARUM GENERIS ANTHEROPHAGUS LATR.**

Colore, pube, pronoti callorum anteriorum forma *A. nigricorni* similis, sed maxima parte insignium gravium ab hoc et ab omnibus speciebus palaearticticis (an etiam a ceteris?) optime distinctus.

Robustus, flavus, mandibularum apices antennaeque, articulo 1. flavo et brunescenti clava exceptis, nigro-brunnei, oculi nigri, pedes basalibus dimidiis partibus nigro-brunneis, *A. nigricorni* sensim nitidior, ut *A. nigricorni* pubescens, clipeus incisura media angusta, arcuata, non acute-angulata. Antennis crassis, articulo 1. robustiore, 2. fortiter transverso, longitudine duplo crassiore, 3. ita fere longo ut lato, 4.—6. longitudine paullo latioribus, 7. longo ut lato, 8. longo, longitudine sensim tantum latiore, in apice 7. aliquanto latiore, 9. magno, conico, longo ut lato, 10. praecedenti paullo brevior minusque conico, 11. praecedenti valde minore brevioraque, conico, acuto, 3.—7. saltem aliquanto, 8.—10. manifeste basin versus convergentibus. Oculis aliquanto transversaliter (non longitudinaliter) dilatatis, superficie subtiliter prominentibus capite plano, fortiter denseque punctato, temporibus oculis duplo longioribus. Pronoto ab omnibus speciebus manifeste divergenti: valde globoso transversoque, 2 et $\frac{3}{4}$ longitudine latiore, non quadrato; margine anteriore utrinque late emarginato, angulis anterioribus obtusis, interiore linea calli subtili, ante marginem anteriorem extincta, superficies pronoti juxta hanc lineam utrinque depressa; latera pronoti rotundata, apicem versus paulum angustata, utrinque in medio subsinuata, pronotum in prima tertia latissimum ibique lateraliter subangulatum, inde basin versus oblique subrotundate-truncatum, itaque angulis basalibus fere extinctis; parte basali supraangulari profundissime oblique depressa poneque fortissime reflexa, pronotum in medio ante marginem basalem gibbulo prominente munitum, baseos media parte fortiter retrorsum protracta, inter basales foveas utrinque positas transverse tenuiter canaliculata; puncta superficiei punctis capituli subtiliora et praecipue rariora. Elytra striis subtiliter profundis, usque ante apicem visibilibus, his punctis sparsis, magnis, haud profundis, difficulter perspicuis praeditis, interstitia subtiliter disperseque punctata, microsculptura subtilissima vagaque, idcirco nitore manifestiore quam in *A. nigricorni*.

Long. 6.5 mm.

De omnibus speciebus palaearticticis generis *Antherophagus* omnino distans, ab *A. himalaico*, breviter et mediocriter tantum descripto, oculorum forma, pronoti insigniis etc. differens.

Hab.: China, Tatsienlu—Kiulung (Reitteri collector anonymus), 1 specimen in coll. auctoris.

Domino Clementi Špaček, professori Trutnoviensi, animo devoto dedicatus.

Conspectus specierum palaearticarum generis *Antherophagus*.

- 1 (2) Clypeus maris in medio arcuatim anguste et profunde amarginatus, antennarum articulo 8. longo, pronoto transversissimo, non quadrato, globoso, inaequali, **Špačeki n.**
- 2 (1) Clypeus maris in medio acute-angulatum emarginatus; antennarum articulo 8. transverso, pronoto modice transverso, mediocriter regulariterque globoso.
- 3 (6) margo calli prothoracalis anguli anterioris interior imperfectus; superficie tota aequaliter nitescente, pube rara, minus visibili.
- 4 (5) oculis latis, globosis, elytrorum striis nullis:
 a) elytris flavis concoloribus, **nigricornis F.**
 b) »elytris macula infuscata apicem versus«, **f. maculipennis Villa.**
 c) »forma cum fascia lata nigra, centrali, elytrorum mediana, latera non attingente«, **f. fasciata Lokay, (Čas. Čes. Spol. Ent. XVI. 1919), p. 20, deest in Winkler, Cat. Col. etc., p. 726.**
- 5 (4) oculis angustis, depressis, elytris substriatis,
himalaicus Champ. The Ent. Month. Magaz. 1922 (non 1923, ut in Winkler, l. c.), p. 68.
- 6 (3) margo calli prothoracalis anguli anterioris interior fortis, marginem pronoti anteriorem attingens; capite pronotoque solum nitescens, elytris opacis.
- 8 (7) pube superficiei subtilissima, brevissima, aequali.
 mentosis), **canescens Grouv. (silaceus Er.).**
- 8 (7) pube superficiei subtilissima, brevissima, aequali.
- 9 (10) rufotestaceus seu bruneotestaceus, opacus, densissime reticulatus, elytra sine striarum vestigiis:
 a) elytris unicoloribus, **pallens F.**
 b) elytris fascia postmedia nigra,
f. fascifera Roub. Bull. Soc. Ent. France, 1925, p. 61; deest in Winkler, l. c.
- 10 (9) nigrobrunneus, antennarum basi clavaque, elytrorum apice suturaque testaceis, elytra substriata, **caucasicus Reitt.**