

140.

Doc. Dr. Jan Obenberger:

DE NOVIS AFRICAE GENERIS APHANISTICUS SPECIEBUS.
(COL. BUPR.).

NOVÉ DRUHY RODU APHANISTICUS Z AFRICKÉ PEVNINY.

Při revisi svých velmi bohatých materiálů tohoto nesnadného rodu nalezl jsem několik dosud nepopsaných druhů, jichž diagnosy zde podávám. Jsou to druhy vesměs nepatrné velikosti, jako ostatně všichni zástupci tohoto rodu a žijí většinou na suchých travnatých porostech blízce toků vod. V originálních sběrech často jsou přehlíženi, ježto jsou to broučci nepatrní a drobní, upomínající často na všelijaké organické úlomky nebo seménka rostlin.

Všechny typy uloženy jsou v Coll. Obenberger Národního Musea v Praze.

1. *Aphanisticus Conradi* n. sp.

Long.: 3, lat.: 0.9 mm. Hab.: Ukerewe.

Corporis forma elongata, gracili, angusta. Aspectu subsericeo, alutaceo. Colore corporis supra nigroaeneo, sericeomicante, parum nitido. Corpore subtus nigro, nitido. Pubescentia corporis supra nulla. Capite satis magno, convexo, semigloboso, antice fronte parum profunde sulcatim depressa. Fronte angusta, longitudinaliter excavata; parte interoculari frontis latitudine duplo longiori, lateribus rectis. Antennis nigris, serratis. Thorace longitudine circiter $1\frac{2}{3}$ latiori, summum latitudinis in $\frac{2}{5}$ anterioribus attingente, margine anteriori fere recto, disco duabus impressionibus transversis notato, lateribus leviter rotundatis, versus anticem atque versus basim attenuatis. Thoracis fundamentum alutaceo. Disco ante medium transverse, leviter vallatim elevato, ante scutellum elevationibus duabus obliquis transversis notato, cavitatibus rotundis in angulis basalibus distinctis. Scutello parvo. Elytris latitudine baseos circiter $3\frac{1}{2}$ longioribus, thorace capiteque unitis circiter triplo longioribus, a medio (leviter subdilato) usque versus apicem longe recte attenuatis, summum latitudinis circiter in medio attingentibus, leviter nitidis, margine lateroapicali integro, sutura subelevata, sculptura elytrorum leviter subseriata, sed valde obsoleta, superficie subalutacea. Apice elytrorum late, separatim subtruncatim rotundato. Corpore subtus nigro. Pedibus satis longis, femoribus longis.

Observatio: Dom. *P. Conradi* in honorem amicissime denominatus. Species haec prope illum *A. nepos* m. locanda est.

2. *Aphanisticus Ukerewensis* n. sp.

Long.: 2.9, lat.: 1.9 mm. Hab.: Ukerewe.

Corporis forma longa, supra satis depressa. Aspectu leviter sericeo. Colore corporis supra nigro, leviter aenescente. Corpore subtus nigro, nitido. Pubescentia corporis nulla. Capite satis magno, semigloboso, sulco satis profundo frontali notato, angulis oculofrontalibus satis acutis. Fronte angusta, parallela, excavata; parte interoculari frontis latitudine duplo longiori, lateribus rectis, longitudinaliter concava. Antennis normalibus, nigris. Thorace longitudine circiter $1\frac{3}{4}$ latiori, summum latitudinis in medio attingente, margine anteriori

arcuatim emarginato, disco impressionibus duabus transversis notato, lateribus satis fortiter rotundatis et anticem multo fortius quam versus basim attenuatis. Disco duobus elevationibus transversis antescutellaribus, elevatione levi transversa in medio posita notato. Fovea in angulis lateroposterioribus thoracis valde distincta. Scutello parvo. Elytris latitudine baseos circiter $2\frac{3}{4}$ longioribus, thorace capiteque unitis circiter $2\frac{1}{2}$ longioribus, a medio versus apicem longe recte attenuatis, summum latitudinis circiter in medio attingentibus, satis nitidis, margine lateroapicali integro, sutura postice elevata, pone suturam late, haud profunde sulcatis, sculptura seriali, subfoveolata, minuta, antice satis parum distincta, postice evanescente. Carina longitudinali costiformi elytrorum nulla. Apice elytrorum transverse subtruncatim, separatim rotundato. Femoribus satis longis.

Observatio: Species haec prope *A. intaminatum* m. locanda est.

3. *Aphanisticus bilobiceps* var. *certulus* n. var.

Hab.: Ukerewe.

A typo colore obscuriore, nigro, forma minore, prothorace magis alutaceo, punctura thoracis subobliterata, elytris minus inaequalibus, distinctius et regularius seriatim punctatis, corpore toto angustiore, capite magis producto valde divergens.

4. *Aphanisticus inaequalicollis* n. sp.

Long.: 2.5, lat.: 0.9 mm. Hab.: Ukerewe.

Corporis forma satis robusta, elongata. Aspectu leviter sericeo. Colore corporis supra nigroaeneo. Corpore subtus nigro, nitido. Pubescentia corporis nulla. Capite semigloboso, longo, medio antice sulcato, angulis oculofrontalibus acutis, sed haud prolongatis. Fronte satis angusta, longitudinaliter sulcata; parte interoculari frontis latitudine $2\frac{1}{2}$ longiori, lateribus versus anticem leviter sinuatim attenuatis. Antennis nigris. Thorace longitudine circiter duplo latiori, summum latitudinis ante medium attingente, margine anteriori fere recto, elevationibus antescutellaribus nullis, disco antice et post medium transverse depresso, fovea basali laterali forti, lateribus usque ante medium leviter subdilatatis, rectis, dein versus anticem valde rotundatis. Thoracis sculptura e punctis distinctis sparsis composita. Scutello parvo. Elytris latitudine baseos circiter $2\frac{1}{2}$ longioribus, thorace capiteque unitis circiter $2\frac{2}{5}$ longioribus, a basi usque ad medium parallelis, a medio versus apicem longe subsinuatim attenuatis, summum latitudinis circiter in medio attingentibus, satis nitidis, margine lateroapicali integro, sutura postice elevata, pone suturam late longitudinaliter subsulcatis, longitudinaliter punctatim seriatim, punctis leviter foveiformibus, antice satis fortibus, postice evanescentibus. Carina longitudinali costiformi elytrorum vera nulla, solum interstitio prope sulcum suturalem postice leviter subelevato. Apice elytrorum separatim anguste rotundato.

5. *Aphanisticus missus* n. sp.

Long.: 2.3—2.6, lat.: 0.7—1 mm. Hab.: Ukerewe.

Corporis forma satis robusta, convexa, elongata. Aspectu leviter sericeo. Colore corporis supra nigro, haud nitente. Corpore subtus nigro, nitido. Pubescentia corporis nulla. Capite subgloboso, oculis antice oblique positus, antice solum leviter late impresso. Fronte angusta, antice leviter excavata; parte

interoculari frontis latitudine $2\frac{1}{2}$ longiori, lateribus rectis, angulis oculifrontalibus rotundatis, sulco frontali levi. Antennis nigris. Thorace longitudine circiter $1\frac{3}{5}$ latiori, summum latitudinis in medio attingente, margine anteriori fere recto, disco satis convexo, impressione media nulla, lateribus versus basim leviter, versus anticem fortiter rotundatim attenuatis, elevationibus antescutellaribus transversis levibus, sed distinctis, medio haud transverse elevato, depressionibus transversis solum ante apicem et ante basim distinctis, fovea lateroposteriori profunda. Scutello parvo. Elytris latitudine baseos circiter $2\frac{1}{2}$ longioribus, thorace capiteque unitis circiter $2\frac{2}{3}$ longioribus, a basi versus medium leviter sinuatis, dein a medio versus apicem curvatim attenuatis, summum latitudinis circiter in medio attingentibus, satis nitidis, margine lateroapicali summo minute denticulato, dorso seriatim, dense, satis fortiter punctulato, sculptura hac post medium evanescente, sutura postice subelevata, sulco subsuturali lato, haud profundo, immarginato. Carina elytrali nulla. Apice elytrorum separatim anguste rotundato.

Observatio: Species haec prope *A. zambesicum* m. locanda est.

6. *Aphanisticus pycnus* n. sp.

Long.: 2.8, lat.: 1 mm. Hab.: Transvaal: Pretoria.

Corporis forma convexa, robusta, satis brevi. Aspectu satis nitido. Colore corporis supra nigerrimo. Corpore subtus nigro, nitido. Pubescentia corporis nulla. Capite satis parvo, semigloboso, medio antice leviter foveolato, angulis oculofrontalibus rotundatis. Oculis parvis. Fronte angusta, versus anticem curvatim attenuata; parte interoculari frontis latitudine circiter duplo longiori, lateribus versus anticem in linea concava, curvata attenuatis, sulco frontali levi. Antennis nigris, serratis. Thorace longitudine circiter $1\frac{3}{5}$ latiori, summum latitudinis circiter in medio attingente, margine anteriori leviter rotundatim emarginato, fere recte truncato, disco convexo, sine ullis depressionibus transversis, foveolis posticis distinctis, lateribus usque ad medium rectis, dein versus anticem late rotundatis, superficie convexa. Thoracis sculptura e punctis areoliformibus levibus satis sparsis et satis fortibus composita. Scutello parvo. Elytris latitudine baseos circiter $2\frac{1}{4}$ longioribus, thorace capiteque unitis $2\frac{1}{3}$ longioribus, a basi usque ad medium leviter sinuatis, dein a medio versus apicem curvatim attenuatis, summum latitudinis circiter in medio attingentibus, satis nitidis, margine lateroapicali integro, sutura haud elevata, sulcis subsuturalibus nullis, sculptura e lineis densis punctorum, antice satis fortibus, postice evanescentibus composita. Carina longitudinali costiformi elytrorum vel plicis elytralibus nullis. Apice elytrorum separatim, satis anguste rotundato.

7. *Aphanisticus ituricola* n. sp.

Long.: 2, lat.: 0.8 mm. Hab.: Ituri (Congo belge).

Corporis forma elongata, satis convexa. Aspectu satis nitido. Colore corporis supra nigro, levissime aenescante. Corpore subtus nigro, nitido. Pubescentia corporis nulla. Capite semigloboso, fronte leviter excavata, angusta, angulis oculofrontalibus nullo modo carinatis. Fronte paullo sulcata; parte interoculari frontis latitudine duplo longiori, lateribus rectis, parallelis. Thorace longitudine circiter duplo latiori, summum latitudinis in medio attingente, margine anteriori recto, disco antice angulose, transverse, ante basim late, recte depresso lateribus valde rotundatis, versus basim breviter subcordatis, foveis

lateroposterioribus manifestis, lateribus leviter deplanatis, versus basim minus fortiter quam versus anticem attenuatis. Scutello parvo. Elytris latitudine baseos circiter duplo longioribus, thorace capiteque unitis circiter $2\frac{1}{2}$ longioribus, a basi fere versus ad medium subparallelis, dein a medio versus apicem longe, fere recte attenuatis, summum latitudinis circiter in medio attingentibus, satis nitidis, margine lateroapicali integro, sutura postice leviter elevata, sulcis subsuturalibus haud distinctis, disco satis plano, superficie dense, subtiliter seriatim punctata, sculptura hac postice evanescente. Carina longitudinali costiformi elytrorum vel plicis elytralibus nullis. Apice elytrorum separatim anguste rotundato.

O b s e r v a t i o: Species haec verisimiliter prope illum *A. pulex* Théry pertinet.
