

141.

Doc. Dr. Jan Obenberger:

DE NOVIS GENERIS ENDELUS H. DEYR. SPECIEBUS TRIBUS.
(COL. BUPR.).

TŘI NOVÉ DRUHY RODU ENDELUS H. DEYR. (COL. BUPR.)

V této malé práci podávám diagnosy tří nových, velmi zajímavých javanských druhů rodu *Endelus* H. Deyr. Tento rod, z příbuzenstva rodu *Aphanisticus*, je dosud omezen výhradně na tropy orientální oblasti, odkud je známo asi 80 druhů, vesměs velmi úhledných. Larvy těchto brouků tvoří chodbičky (míny) v listech různých rostlin a jeden druh dokonce žije na Filipínách v kapradinách, což by samo o sobě poukazovalo na velmi značné geologické stáří rodu tohoto. Z druhů zde popisovaných zvláště *Endelus imperator* m. je skvostným a naprosto nezvyklým typem, je to beze sporu nejnádhernější a nejnapadnější dosud známý druh. Všechny popisované zde druhy pocházejí z východní Jávy. Typy uloženy jsou v naší Coll. Obenberger.

1. *Endelus imperator* n. sp.

Long.: 4.8, lat.: 2.3 mm. Hab.: Java or.: Kediri.

Corporis forma robusta, lata, postice etantice attenuata. Aspectu glabro, nitido, elytris valde inaequalibus. Colore corporis supra nigro, cyaneo vel violaceo micante, fronte rubida, elytrorum margine laterali ab humeris usque ad medium anguste reflexo, deplanato et laete cyanes. Nullo modo alutaceus, valde nitidus. Corpore subtus nigro, valde nitido. Pubescentia corporis nulla. Capite magno, producto, fronte profunde longitudinaliter excavata, angulis oculo-frontalibus acutis, sed nullo modo carinatis productis. Fronte nitidissima, rubida; parte interoculari frontis latitudine circiter duplo longiori, lateribus parallelis rectis, acutis, oculis convexis, magnis, temporibus ferre parallelis, brevibus. Antennis ab articulo quinto serratis, apice subdilatatis, nigris. Antennarum articulo tertio et quarto longitudine aequalibus. Thorace longitudine circiter 2.5 latiori, summum latitudinis in tertia parte basali attingente, margine anteriori late, haud profunde, sinuatim emarginato, disco convexo, postice late transverse depresso, nitidissimo, lateribus in tertia parte basali subangulosis, versus anticem fortiter, oblique, verte attenuatis, versus basim oblique, fere recte, satis fortiter attenuatis, angulis basalibus utrimque foveola rotunda notatis. Scutello magno, nigro. Elytris latitudine baseos circiter $1\frac{1}{2}$ longioribus, thorace capiteque unitis circiter duplo longioribus, a basi versus medium parallelis, rectis, versus apicem situatim attenuatis, summum latitudinis circiter in parte humerali attingentibus, valde nitidis, margine lateroapicali summo denticulato, valde inaequalibus, variolatis, prope humeros versus latera et versus apicem depressionibus et elevationibus nitidis, ornatis, parte laterali recta depresso, subdeplanata, parte suturali minus inaequali. Elytris thorace valde latioribus. Carina humerali elytrali nulla, humeris elevatis. Apice elytrorum satis anguste, conjunctim rotundato.

Observatio: Species quam maxime insignis atque cum nulla specie mihi nota comparanda. Multo magis inaequalis quam *E. Belial* Obenb. atque multo latior, corpore multo robustiore.

2. *Endelus inaequalipennis* n. sp.

Long.: 4.1, lat.: 1.8 mm. Hab.: Java or.

Illo E. Belial Obenb. forma et superficie inaequali simillimus, sed elytris bicoloribus, partibus elytrorum elevatis (maiore parte elytrorum) nigroviolaceis, depressionum fundamento (prope scutellum, lateraliter et apice), uti superficies tota brunneo aeneis, elytris latioribus, subtilius punctatis, capite nigrescente, maiore, sed paullo minus lato, thorace simili, sed latiore et brevior, depressionibus et elevationibus elytrorum minus manifestis, pedibus laete violaceis valde divergens.

3. *Endelus Louwerensi* n. sp.

Long.: 4, lat.: 1.2 mm. Hab.: Java or. Res. Kediri, Tjoemanoeck (M. Louwerens lgt.).

Corporis forma elongata, Aphanisticiformi. Aspectu sericeo, alutaceo; paullo micans. Colore corporis supra nigerrimo. Corpore subtus nigro, nitido. Pubescentia corporis nulla. Capite lato et convexo, producto, longe semielliptico, medio valde profunde sulcato. Fronte satis angusta, concava; parte interocularem frontis latitudine circiter $1\frac{1}{2}$ longiori, lateribus fere rectis et versus anticem leviter attenuatis, oculis magnis, angulis oculofrontalibus cariniformibus, acutis, paullulo productis. Antennis ab articulo septimo serratis, decemarticulatis, articulo sexto longissimo. Antennarum articulo tertio et quarto iunctis longitudine illum sextum adaequantibus. Thorace longitudine circiter $1\frac{3}{5}$ latiori, summum latitudinis in medio longitudinis attingente, margine anteriori late et haud profunde, simpliciter excavato, disco antice, medio et postice transverse satis profunde depresso, lateribus in medio valde rotundatis, versus basim sinuatim, versus anticem arcuatim attenuatis, disco plicis elevatis duabus transversis superpositis ornatis, medio leviter longitudinaliter subcarinato, fovea angulorum basalium profunda. Scutello nigro. Elytris latitudine baseos circiter $2\frac{2}{3}$ longioribus, thorace capiteque unitis circiter $2\frac{1}{4}$ longioribus, a basi versus medium sinuatim subdilatatis, dein versus apicem longe attenuatis, summum latitudinis circiter in medio attingentibus, paullo nitidis, margine lateroapicali integro, disco satis deplanato, alutaceo, sutura postice elevata, sulco subsuturali haud distincto, sculptura elytrali seriali subobliterata, postice totaliter evanescente. Carina longitudinali costiformi elytrorum vel plicis discalibus nullis. Carina humerali elytrali nulla. Apice elytrorum satis late separatim truncatim rotundato. Pedibus nigris satis longis.

Observatio: Dom. Louwerens in honorem dentommatatus.