

142.

Jan Roubal:

POPISY DVOU NOVÝCH BROUČÍCH FOREM.

DESCRIPTIONS DE DEUX NOUVELLES FORMES
DES COLÉOPTÈRES.**Abax continuus Baudi v. hypocrita n.**

Podle Schaubergerovy »Revision des Genus *Abax* Bon.« v Col. Centralbl. II, 1927, p. 121—134 patří tato varieta k 36 (39) »Die Punkte der Umbilicarreihe auch in der Mitte gleichmässig dicht nebeneinander gestellt« ... *continuus* Baudi, jakož i k 39 (36) »Die Punkte der Umbilicarreihe in der Mitte viel weitläufiger« ... *parallelus* Duft.

Moje ex. *Abax continuus* z okolí Turina a můj typ. *ssp. Wüsthoffi* Schaub. z jižních Švýcar (leg. Wüsthoff) a řada ex. z okolí Milana, zapůjčených mi laskavě přítelem Binaghim — Milano, souhlasí podrobně se vším, co praví Schauberger sub. 36; mám však 1 ex. též milánské proveniencie (X. 29., coll. Jindř. Čejka) a jiný z oněch milánských od Binaghiho s umbilikátní řadou teček právě v té míře přerušenu, jako je tomu u *A. parallelus*; mimo to v materiálu Binaghově je i kus přechodní, pokud jde o udaný znak.

Ježto jde o znak diakritický a zásadní, a to jediný, kterým se liší skupina *A. continuus* a *parallelus*, je potřebné zvláštním pojmenováním na to upozornit: *Abax continuus Baudi v. hypocrita n.* nemá umbilikátní řádku teček uprostřed hustou, ale široce přerušenu, jako je tomu u *A. parallelus*. Tím se zamezí nedorozumění a konfusi s *A. parallelus* a protiklady citovaného klíče Schaubergerova 36, 39 doznají jen této neočekávané odchylky.

Zmíněné ex. jsou ♂♂.

Selon Schauberger, Revision des Genus *Abax* Bon. dans Col. Centralbl. II, 1927, p. 121—134 appartient la nouvelle var. au groupe 36 (39) (»Die Punkte der Umbilicarreihe auch in der Mitte gleichmässig dicht nebeneinander gestellt« — *continuus*) et en même temps au groupe 39 (36) (»Die Punkte der Umbilicarreihe in der Mitte viel weitläufiger« — *parallelus* Duft.).

Mon exemplaire de *l'Abax continuus* de Torino et mon type de *continuus s. Wüsthoffi* Schaub. de la Suisse merid. et plusieurs ex. de Milano (Binaghi) correspondent à ce que dit Schauberger sous le nro 36; mais je possède 1 ex. de Milano (X. 1929) de la coll. Jindřich Čejka et 1 de la même localité (Binaghi) offrant l'umbilicata interrompue, comme nous le voyons chez *l'A. parallelus*; outre cela, parmi les ex. de Sign. Binaghi se trouve encore 1 ex. transitaire au point de vue de cette particularité. Comme il s'agit d'un caractère diacritique des espèces en question de valeur cardinal, il me semble utile de donner un nom à la forme de *l'Abax continuus* à la series umbilicata vaguement interrompue **v. hypocrita n.** pour éviter des

méprises et pour ne pas laisser labiles les points 36 et 39 de l'excellent tableau de Schauberg. Tous les ex. de cette var. sont des ♂♂.

Crataraea suturalis Mannh. f. insuturalis n.

Nigrino se zcela černými krovkami, zadní okraje zadečkových tergitů sotva trochu nahnědlé. Nápadně a nezvykle se odlišuje od f. nom. a pojmenování druhu »*suturalis*« (krovky podél švu a na zadním okraji široce žlutohnědé) se touto formou stává absurdním, protože její pojmenování je tu na místě.

Slovakia: Sv. Benedik, 5. V. 1935 (Roub.).

Je to analogický úkaz, jako nedávno popsán u příbuzného rodu *Microglotta*: *M. marginalis* Gyll. f. *obscura* Horion, Entom. Blätt. XXXII, 1936, p. 238.

Toute la surface, c'est-à-dire aussi les élytres (qui offrent, chez la forme nom., la couleur rouge à la suture et au bord postérieur) entièrement noire, seulement le marge des tergites abdominaux très étroitement claire.

Slovakia: Sv. Benedik, 5. V. 1935 (Roub.).

Une forme analogique à celui-ci de *Microglotta marginalis* Gyll., f. *obscura* Horion, Entom. Blätt. XXXII, 1936, p. 238.
