

Doc. Dr. Jan Obenberger:

**DE NOVIS A DOM. ALOIS DAVID IN DUALA GENERIS  
APHANISTICUS SPECIEBUS INVENTIS (COL. BUPR.).**

**NOVÉ DRUHY RODU APHANISTICUS, NALEZENÉ P. A. DAVIDEM  
V KAMERUNU.**

Pan Alois David, který obohatil zoologické sbírky Národního Musea v Praze četnými skvělými sběry zoologickými a zvláště entomologickými, sebranými během pobytu v Dualu v Kamerunu, zaslal ústavu našemu zvláště cenné materiály Coleopter. Byly to velice pečlivě a pozorně, s odborným pochopením sebrané materiály z lovů v okolí Dualy. Tyto sběry se povlnně, jak to čas a naše skromné pracovní možnosti dovolují, preparují a vědecky zhodnocují. Při přebírání takových smýkaných materiálů přišel jsem na několik dosud přehlédnutých kousků krasečků z rodu *Aphanisticus*. Jsou to vesměs docela malé a seménkům podobné druhy. Mezi těmito broučky zjistil jsem tři nové specíe, jichž diagnosy zde podávám. Jsou to formy vesměs systémově velice zajímavé. Dva z nich pojmenoval jsem k počtě pana Aloise Davida a jeho jménem, abych tak zdůraznil vděčnost ústavu našeho tomuto neúnavnému, nenáročnému, pilnému a Národnímu Museu a jeho vznešeným cílům tak oddanému sběrateli a abych se mu aspoň trochu odvděčil za jeho velkou práci, pro ústav náš nezištně podniknutou. Pan David ve své horlivosti obětoval sbírání pro nás veškeren svůj volný čas, zaslal nám četné zásilky, vzorně balené se značnými finančními obětmi a nezanedbal žádné příležitosti, aby naše sbírky obohatil.

Všechny typy zde popisovaných druhů uloženy jsou v Coll. Obenberger v Národním Museu.

**1. *Aphanisticus Davidi* n. sp.**

Long.: 2.9, lat.: 0.9 mm. Hab.: Duala (Camerun — Alois David lgt.).

Corporis forma longa satis depressa. Aspectu nitido. Colore corporis supra nigerrimo. Corpore subtus nigro, nitido. Pubescentia corporis nulla. Capite magno, producto, temporibus longis, rotundatis, oculis parvis, fronte late, longitudinaliter excavata. Fronte longe trapezoidali, excavata; parte interoculari frontis latitudine  $1\frac{1}{2}$  longiori, lateribus versus anticem recte angustatis, angulis aculofrontalibus rectis, sed nullo modo productis. Thorace longitudine circiter duplo latiori, summum latitudinis paullo ante medium attingente, margine anteriori late arcuatim emarginato, disco impressionibus tribus transversalibus inaequali, lateribus versus basim cordatim attenuatis, versus anticem fortiter rotundato et serrulato, lateribus satis planis, parte media transversa leviter elevata, basi utrimque transverse subelevata, fovea lateroposteriori rotunda forti. Scutello parvo. Elytris latitudine baseos circiter  $2\frac{1}{3}$  longioribus, thorace capiteque unitis circiter  $2\frac{1}{5}$  longioribus, a basi versus medium subsinuatis, a medio versus apicem fere recte attenuatis, summum latitudinis circiter in medio attingentibus, valde nitidis, margine lateroapicali integro, margine laterali anguste reflexo, prope humeros leviter serrulato, sutura postice subelevata, sulco subsuturali solum postice distincte et ibi externe subplicatim marginato, disco seriatim lineolato, sculptura hac antice paullo subfoveolata.

Carina humerali elytrali nulla. Apice elytrorum late separatim transverse truncato.

Observatio: Species haec prope *A. tantillum* Obenb. locanda est.

## 2. *Aphanisticus Aloisii* n. sp.

Long.: 2.9, lat.: 0.9 mm. Hab.: Camerun: Duala (A. David lgt.).

Corporis forma depressa, elongata, parum convexa. Aspectu paullo sericeo. Colore corporis supra nigerrimo. Corpore subtus nigro, nitido. Pubescentia corporis nulla. Capite latissimo, maximo, producto, temporibus parallelis, angulo oculofrontali acuto, sed nullo modo producto. Fronte valde lata, late profunde excavata; parte interoculari frontis longitudine  $1\frac{1}{4}$  latiori, lateribus oblique versus anticem attenuatis. Antennis nigris. Thorace longitudine circiter  $2\frac{1}{4}$  latiori, valde cordato, summum latitudinis in medio attingente, ibique anguloso, margine anteriori profunde, late emarginata, disco antice recte; post medium sinuatim, transverse impresso, lateribus planatis, versus basim fortissime sinuatim, cordatim attenuatis, versus anticem late rotundatim attenuatis, lobo antescutellari valde producto, foveis lateroposterioribus paullo impressis. Scutello parvo. Elytris latitudine baseos circiter  $2\frac{1}{2}$  longioribus, thorace capiteque unitis circiter  $2\frac{1}{2}$  longioribus, a basi versus medium levissime sinuatis, dein a medio versus apicem fere recte attenuatis, summum latitudinis circiter in medio attingentibus, satis nitidis, margine lateroapicali integro, planis, sutura postice leviter elevata, sulco subsuturali indistincto, superficie tota lineis impressis striiformibus subtilissimis tecta. Carina longitudinali costiformi elytrorum nulla. Apice elytrorum separatim, late, subtruncatim rotundatis. Pedibus satis longis, tarsis anticis late lamellatis, lamellis ochraceis.

Observatio: Species haec nova, Dom. *Aloisio David* in honorem denominata, ad speciem *A. Hargreavesi* Obenb. pertinet.

## 3. *Aphanisticus dualaicus* n. sp.

Long.: 2.5, let.: 0.7 mm. Hab.: Camerun: Duala (Alois David lgt.).

Corporis forma elongata, satis convexa. Aspectu leviter sericeo, satis nitido. Colore corporis supra nigroaeneo, leviter cuprascente. Corpore subtus nigro, nitido. Pubescentia corporis nulla. Capite semigloboso, medio antice valde sulcato, angulis oculofrontalibus acute productis. Fronte angusta, sulcatim excavata; parte interoculari frontis latitudine duplo longiori, lateribus rectis. Thorace longitudine circiter  $1\frac{2}{3}$  latiori, summum latitudinis in tertia parte anteriori attingente, margine anteriori fere recto, disco antice et post medium leviter transverse depresso, lateribus utrimque fere ad tertium partem anteriorem rectis, dein versus anticem fortiter rotundatis. Elevationibus antescutellaribus paullo distinctis, fovea lateroposteriori forti. Scutello parvo. Elytris latitudine baseos circiter  $2\frac{1}{2}$  longioribus, thorace capiteque unitis circiter  $2\frac{1}{3}$  longioribus, a basi ad mediam parallelis, dein a medio versus apicem longe, recte attenuatis, summum latitudinis circiter in medio attingentibus, satis nitidis, margine lateroapicali integro, sutura postice leviter elevata, sulco subsuturali lato, levi, solum distinctiore, superficie dense, satis fortiter, regulariter foveolatim, seriatim punctata, sculptura hac postice evanescente. Carina longitudinali costiformi elytrorum nulla. Apice elytrorum separatim, anguste, subangulatim rotundato.

Observatio: Species haec prope illum *A. interrogationis* m. locanda est.