

Doc. Dr. Jan Obenberger:

**NOVÉ DRUHY RODU TRACHYS Z PALAEARKTICKÉ OBLASTI
(COL. BUPR.).**

**DE NOVIS GENERIS TRACHYS REGIONIS PALAEARCTICAE
SPECIEBUS (COL. BUPR.).**

V této malé práci podávám popisy šesti vesměs nových, a to velmi zajímavých druhů rodu *Trachys* z palaearktické oblasti, hlavně z východní její části. Čína je dosud velmi nedostatečně po všech stránkách faunistického badání proptřána a tak tato nesmírná země dodá nám ještě zcela určitě mnoho a mnoho forem nových a snad stejně krásných, jako je na př. zde popisovaná nádherná *Fr. Hauseri* m., jeden z nejuhlednějších a největších druhů tohoto rodu vůbec. Všechny typy uloženy jsou v Coll. Obenberger v Národním Museu v Praze.

1. *Trachys* (s. str.) *Hauseri* n. sp.

Long.: 4, lat.: 2.2 mm. Hab.: China, Prov. Yunnan, Vallis Flum. Soling-Ho.

Corporis forma robustissima, ovalis, convexa. Aspectu parum nitido. Colore corporis supra nigro brunneo, elytris fasciis duabus praeapicalibus, una testacea, altera magis versus apicem posita, valde flexuosis, fasciaque praemediana minus distincta alba ornatis, elytrorum spatiis obscuris pube parum visibili nigra tectis. Thorace capiteque testaceo vel ochraceopilosis. Corpore subtus aeneo, nitido. Pubescentia corporis brevi, densa, subtili. Capite thoraceque maculis aliquot albis notatis. Capite valde lato, medio leviter excavato, angulis oculo-frontalibus rotundatis. Fronte lineatim impressa, lata; parte interoculari frontis longitudine circiter $1\frac{1}{2}$ latiori, lateribus versus anticem oblique attenuatis. Epistomate lato, antice profunde emarginato. Thorace longitudine circiter triplo latiori, summum latitudinis in basi summa attingente, margine anteriori late, profunde, simpliciter emarginato, disco aequaliter convexo, margine basali paullulo subelevato, subcarinato, lateribus versus anticem fortiter, oblique, fere recte attenuatis. Thoracis sculptura sub pilositate densa haud visibili. Scutello parvulo. Elytris latitudine baseos circiter $1\frac{3}{5}$ longioribus, thorace capiteque unitis circiter triplo longioribus, a basi versus tertiam partem basalem subparallelis, dein versus apicem arcuatim attenuatis, summum latitudinis circiter in parte humerali attingentibus, satis nitidis, margine latero-apicali levissime denticulato, convexis, aequalibus, humeris leviter elevatis, superficie microscopice subcoriacea, nitida, sine punctura distincta. Carina humerali elytrali nulla. Apice elytrorum satis late conjunctim rotundato. Ornamento elytrorum valde flexuoso, postice distincto, antice vago, e pilis subtilissimis composito. Gulari lobo distincto nullo. Processu prosternali lato, subparallelo, plano. Corpore subtus nitido, haud piloso, solum coxis posterioribus externe rubro ochraceopilosis. Abdomine convexo. Angulo lateroposteriori coxarum posteriorum subobtusum. Palpis tarsisque rubrotestaceis.

Observatio: Species valde insignis, maxima. Dom. G. Hauser in honorem denominata.

2. *Trachys* (s. str.) *opsigona* n. sp.

Long.: 3.2, lat.: 1.3 mm. Hab.: China: Kiulung.

Corporis forma elongata, supra satis depressa. Aspectu nitido. Colore corporis supra duplici: capite thoraceque viridiaeneis, luteopilosis, elytris nigerimis, vage undulatum transverse trifasciatis, fasciis his e pilis longis, sparsis, parum conspicuosis argenteis compositis. Corpore subtus nigro, nitido. Pubescentia corporis subtili, longa, sparsa, tenui. Capite satis lato, antice late excavato, angulis oculifrontalibus rotundatis. Fronte lata, medio concava; parte interoculari frontis longitudine $1\frac{1}{2}$ latiori, lateribus versus anticem in linea recta attenuatis. Epistomate lato, antice arcuatim emarginato. Antennis ab articulo septimo serratis, nigris. Thorace longitudine circiter $3\frac{1}{4}$ latiori, summum latitudinis in basi summa attingente, margine anteriori late, arcuatim, simpliciter emarginato, disco modice, aequaliter convexo, nullo modo depresso, lateribus versus anticem arcuatim attenuatis. Thoracis sculptura e striis areoliformibus subtilissimis, solum hic et ibi distinctioribus composita. Scutello parvo, nigro. Elytris latitudine baseos fere duplo longioribus, thorace capiteque unitis circiter $3\frac{1}{2}$ longioribus, a basi versus medium fere parallelis, dein versus apicem longe oblique attenuatis, summum latitudinis circiter in parte humerali attingentibus, satis nitidis, margine lateroapicali iam fere a medio longitudinis serrato. Carina humerali elytrali nulla. Humeris leviter elevatis. Apice elytrorum in angulo obtuso conjunctim, rotundato. Ornamento elytrorum e tribus fasciis valde flexuosis vagis, satis parum conspicuis, satis latis composito. Gulari lobo nullo. Processu prosternali subparallelo, satis lato. Corpore subtus nigro, nitido. Angulo lateroposteriori coxarum posteriorum late rotundato. Palpis tarsisque nigrescentibus.

3. *Trachys* (s. str.) *iranica* n. sp.

Long.: 2.9, lat.: 1.6 mm. Hab.: Iran: Masenderan.

Corporis forma robusta, convexa, ovali. Aspectu nitido. Colore corporis supra brunneoaeneo. Corpore subtus aeneo, nitido. Pubescentia corporis sparsa, inaequali, parum conspicua, uniformi, brunneogrisea, brevi. Capite lato, de super viso fere plano. Fronte lata, medio lineatim impressa; parte interoculari frontis longitudine circiter $1\frac{1}{2}$ latiori, lateribus versus anticem satis fortiter attenuatis, rectis. Thorace longitudine circiter triplo latiori, summum latitudinis in basi summa attingente, margine anteriori distincte bisinuatim, late emarginato, disco convexo, aequali, impunctato, lateraliter areolatim striatulo, lateribus versus anticem satis fortiter arcuatim attenuatis. Thoracis sculptura e areolis subtilissimis in parte laterali et basali distinctioribus composita, punctis intermixtis nullis, fundamento thoracis haud alutaceo, nitido. Lobo medio antico marginis thoracis anterioris late, valde distincte producto. Scutello minutissimo. Elytris latitudine baseos circiter $1\frac{1}{2}$ longioribus, thorace capiteque unitis circiter $2\frac{2}{3}$ longioribus, a basi versus medium subparallelis, dein versus apicem longe arcuatim attenuatis, summum latitudinis circiter in parte humerali attingentibus, satis nitidis, margine lateroapicali integro; thorace distincte latioribus, aequaliter, fortiter convexis, in seriebus valde vagis subobliquis satis fortiter, superficialiter punctatis. Elytris sine ullis fasciis transversis distinctis, solum sparse pilosis. Carina humerali elytrali nulla. Apice elytrorum satis anguste conjunctim rotundato. Gulari lobo nullo. Processu prosternali antice parallelo, postice subdilatato. Corpore subtus aeneo.

Abdomine convexo. Tarsis palpisque piceobrunneis. Angulo lateroposteriori coxarum posteriorum rotundato.

4. *Trachys* (s. str.) *sussamyrensis* n. sp.

Long.: 3, lat.: 1.8 mm. Hab.: Asia centr.: Montes Sussamyr.

Corporis forma robusta, convexa, ovali. Aspectu nitido et fere glabro. Colore corporis supra brunneoaeneo. Corpore subtus aeneo, nitido. Pubescentia corporis supra aequali, regulari, sparsa, tenui, subtili, brevi, albogrisea. Capite latissimo, medio lineatim impresso, vertice distincte lineatim depresso. Fronte lata, medio impressa; parte interoculari frontis longitudine circiter $1\frac{1}{2}$ latiori, lateribus versus anticem in linea recta satis fortiter attenuatis. Antennis ab articulo septimo serratis, nigris. Thorace longitudine circiter $3\frac{1}{4}$ latiori, summum latitudinis in basi summa attingente, margine anteriori late bisinuatim, satis profunde emarginata, disco convexo, nullo modo depresso, nitido, lateribus versus anticem satis leviter arcuatim attenuatis. Thoracis sculptura ex areolis striiformibus rotundis, praecipue lateraliter et postice distinctis composita, punctis simplicibus microscopicis solum in medio disci haud conspicue intermixtis, fundamento nitido, leviter, microscopice alutaceo. Thorace elytris paullo angustiore. Scutello minutissimo. Elytris latitudine baseos circiter $1\frac{2}{5}$ longioribus, thorace capiteque unitis circiter duplo longioribus, a basi usque versus medium parallelis, dein versus apicem arcuatim attenuatis, summum latitudinis circiter in parte humerali attingentibus, valde nitidis, margine lateroapicali nullo modo denticulato. Carina humerali elytrali nulla. Humeris leviter elevatis. Apice elytrorum satis anguste, conjunctim rotundato. Ornamento elytrorum fasciformi nullo, elytris valde aequaliter et regulariter griseopilosis, irregulariter satis dense punctis medio cribus punctatis. Gulari lobo nullo. Processu proternali lato, parallelo. Corpore subtus satis nitido. Abdomine satis convexo. Palporum parte posteriori atque lamellis tarsorum subtus ochraceobrunneis. Angulo lateroposteriori coxarum posteriorum rotundato.

Observatio: Species haec prope illam *Tr. opulentam* Ab. locanda est.

5. *Trachys* (s. str.) *libanonica* n. sp.

Long.: 3.2, lat.: 1.8 mm. Hab.: Antilibanon.

Corporis forma lata, supra satis convexa, ovali. Aspectu nitido. Colore corporis supra supravioleaceo, nitido. Corpore supra pilis brevibus, sparsis, subtilibus brunneis aequaliter tecta, in elytris fasciis tribus transversis valde vagis albogriseis ornata. Corpore subtus aeneo, nitido. Pubescentia corporis brevi, sparsa, aequali, parum conspicua. Capite lato, plano, medio lineatim impresso. Epistomate valde late, antice rotundatim emarginato. Fronte lata, vertice leviter lineatim impressa; parte interoculari frontis longitudine circiter $1\frac{1}{2}$ latiori, lateribus versus anticem recte attenuatis. Thorace longitudine circiter $3\frac{1}{3}$ latiori, summum latitudinis in basi summa attingente, margine anteriori late bisinuatim emarginato, disco aequaliter convexo, impunctato, subtiliter areolato, lateribus versus anticem in linea recta attenuato. Thoracis sculptura ex areolis striiformibus rotundis subtilibus, praecipue postice et lateraliter composita lobo medio thoracis marginis anterioris distinctissimo. Fundamento nitido, nullo modo alutaceo. Scutello minimo. Elytris latitudine baseos circiter

$1\frac{1}{2}$ longioribus, thorace capiteque unitis circiter $2\frac{1}{2}$ longioribus, a basi usque ad medium subparallelis, dein versus apicem arcuatim attenuatis, summum latitudinis circiter in parte humerali attingentibus, valde nitidis, margine lateroapicali integro. Carina humerali elytrali nulla, humeris leviter elevatis. Apice elytrorum satis anguste conjunctim rotundato. Elytris irregulariter, satis subtiliter punctatis, nitidis. Ornamento elytrorum vago, fasciis ambobus praeapicalibus solis distinctioribus, haud flexuosis. Gulari lobo nullo. Processu prosternali postice dilatato, antice subparallelo. Corpore subtus subalutaceo, aeneo, nitido. Palpis ochraceis, tarsis nigris. Coxarum posteriorum angulo lateroposteriori rotundato.

6. *Trachys* (s. str.) *Isis* n. sp.

Long.: 2.4, lat.: 1.2 mm. Hab.: Aegyptus.

Corporis forma elongata, modice convexa, ovali. Aspectu nitido. Colore corporis supra purpureocupreo, nitido, elytris postice magis purpureis. Corpore subtus cupreoaeneo, nitido. Pubescentia corporis brunneotestacea, in thorace maculis aliquot albis intermixtis, in elytris ornamento fasciformi albo. Capite latissimo, antice concavo, medio longitudinaliter impresso. Fronte valde lata, depressa; parte interoculari frontis longitudine circiter $1\frac{1}{2}$ latiori, lateribus versus anticem recte attenuatis. Antennis nigris, brevibus. Thorace longitudine circiter triplo latiori, summum latitudinis in summa basi attingente, margine anteriori late bisinuatim emarginato, disco aequaliter convexo, nitido, satis dense aequaliter pubescente, lateribus versus anticem leviter, fere recte attenuatis. Thoracis sculptura sub pilositate parum distincta, laevi. Scutello parvulo. Elytris latitudine baseos circiter $1\frac{2}{3}$ longioribus, thorace capiteque unitis circiter $2\frac{1}{3}$ longioribus, a basi primo leviter, a medio dein versus apicem fortius attenuatis, summum latitudinis circiter in parte humerali attingentibus, valde nitidis, margine lateroapicali integro, superficie satis dense, irregulariter, satis subtiliter punctata. Carina humerali elytrali nulla, humeris leviter elevatis. Apice elytrorum satis anguste conjunctim rotundato. Ornamento elytrorum e tribus fasciis tenuibus, valde flexuosis argenteis composito. Gulari lobo nullo. Processu prosternali ubparallelo, satis lato. Corpore subtus nitido, cupreoaeneo, palpis tarsisque testaceis. Angulo lateroposteriori tarsorum posteriorum rotundato.