

147.

Doc. Dr. Jan Obenberger, Praha:

REVISION DES ESPÈCES EXOTIQUES DU GENRE TRACHYS FABR. DU CONTINENT AFRICAÏN.

PŘEHLED EXOTICKÝCH DRUHŮ RODU TRACHYS AFRICKÉ PEVNINY.

I.

V této práci podávám revisi všech četných druhů rodu *Trachys* africké pevniny; nejsou zde zastoupeny druhy severní, palaearktické části a pak druhy madagaskarské, které obojí jsou dosti odlišného rázu. *Trachys* jsou většinou krasečkové nepatrné velikosti — je známo, že žijí ve stadiu larválním v parenchymu listů různých rostlin, kde vyhlubují si charakteristické miny. Většina druhů je velice nesnadná a těžko určitelná a proto volil jsem pro zpracování jich formu klíčovou, která jednak umožňuje snazší určení těchto drobných a úhledných brouků, jednak také osvětluje názorně jich vzájemné vztahy příbuzenské. Tato moje práce představuje jaksi protějšek k mému monografickému zpracování druhů téhož rodu z asijské pevniny, k práci, jež zde pod obdobným názvem vyšla v r. 1929 v VII. svazku Sborníku. K jednotlivým novým, četným druhům v klíči připojil jsem, jakožto krátkou předběžnou diagnosu, jen zcela krátké popisy. Podrobnější a dlouhé popisy druhů zde uvedených, spolu s citacemi všech forem, zde klíčově zpracovávaných, hodlám uveřejniti v druhé části této práce v příštím roce.

Deset let trvalo, nežli jsem zdolal tuto nesnadnou partii. Během této doby prostudoval jsem většinu známých a dosažitelných typů a shromáždil materiál, největší dosud na světě. Teprve pak jsem usoudil, že mám dostatečnou legitimoci k prvému tomuto soubornému zpracování těchto kraseček. Většina druhů zde zmíněných je uložena v mé sbírce, kterou jsem, jak známo, věnoval našemu Národnímu Museu.

*

Dans le travail présent, je donne, pour la première fois dans l'histoire, une révision des espèces du genre *Trachys* du continent africain. J'ai travaillé dix ans sur cette matière; pendant cette époque j'ai aggloméré des matériaux des plus importants de ce genre et j'ai vu et étudié beaucoup des types accessibles du genre. Néanmoins, la détermination exacte de ces Coléoptères minuscules restera toujours des plus difficiles, au moins là, où il est bien difficile de trouver des caractères plus définables. On doit toujours repréparer ces insectes avant la détermination, parceque les caractères du dessous, comme forme de la saillie prosternale, couleur des pattes et palpes, forme des hanches postérieures etc. donnent beaucoup de caractères excellents et de plus grande importance pour notre but. Dans le travail présent j'ai ajouté à chaque espèce nouvelle une courte diagnose préliminaire; cette partie analytique forme alors la première partie du travail entier, dont la deuxième partie, contenant toutes les citations et diagnoses détaillées paraîtra ici en 1938.

- 1 (56) *Elytres ornés de part et d'autre d'une carène fine humérale, plus ou moins élevée, soit entière, soit raccourcie postérieurement. Une mentonnière au prosternum, dont la saillie médiane est large et élargie en arrière.* (Sbg. **Habroloma**.)*)
- 2 (17) Carène humérale des élytres courte, distincte seulement antérieurement, élevée et disparaissant avant le milieu.
- 3 (14) Ecusson nul. Tête très large. Prothorax orné au milieu, les élytres avant l'apex d'une touffe de poils élevés en forme d'une pointe. Surface élytrale plus ou moins inégale, déprimée sur le dos, à pubescence prédominante rousse ou brunâtre. Tête très large, excavée.
- 4 (5) Surface élytrale très inégale; élytres saillants à l'épaule avec le calus huméral surmonté d'une carène oblique dirigée vers l'intérieur, ornés de part et d'autre de quatre fascicules: le premier un peu au delà du calus huméral et plus près de la suture que du bord extérieur, deux autres un peu au delà du milieu, l'un et l'autre à la même hauteur, le quatrième, préapical, situé plus près du bord extérieur que sur la suture; surface assez grossièrement chagrinée. D'un brun violacé pourpré, le milieu du pronotum avec un fascicule de poils roussâtres, surface du front presque lisse. Long.: 4, lat.: 2.3 mm. Afrique or. angl.¹⁾ 1. **Trachys (H.) regia** Kerr.
- 5 (4) Fascicules élytraux moins nombreux, élytres plus convexes, plus parallèles, relativement longs.
- 6 (13) Élytres unicolores, ornés de part et d'autre de deux touffes ou fascicules des poils dressés, formant un carré, situés plus près de la suture que du bord, les antérieurs vers le quart antérieur, les postérieurs situés après le milieu. Calus huméral très accentué; carène humérale aiguë partant de l'épaule, formant une courbe vers l'intérieur du disque et s'arrêtant vers le quart antérieur de la longueur. Prothorax transversalement déprimé postérieurement.
- 7 (8) Pilosité du dessus subuniforme, dense, d'un gris ocré et clair. Faisceaux des élytres clairs, grisâtres. Pilosité élytrale un peu condensée derrière le milieu, formant une bande transversale et vague. Long.: 3.5, lat.: 2 mm. Capland. 2. **Trachys (H.) aetatula** n. sp.
- 8 (7) Pilosité élytrale moins uniforme, beaucoup plus inégulière.
- 9 (12) Pilosité élytrale brunâtre ou rousâtre, condensée derrière le milieu en forme d'une bande transversale, large, cette bande de coloration ocrée ou grisâtre - pubescence élytrale alors distinctement bicolore. Touffes des élytres de coloration claire, brune ou rousse.
- 10 (11) Une touffe distincte (semblable aux faisceaux des élytres) au milieu du prothorax. Pubescence de dessus beaucoup plus dense. Taille plus trapue, plus robuste, plus convexe. D'un noir bronzé. Elytres ornés des étroites fascies obliques sur la moitié antérieure, se réunissant en zigzag, puis d'une grande tache transversale au tiers postérieur, coupée obliquement en avant, puis une petite fascie

*) Ici vient se placer, de même, le 29. *Tr. (H.) capensis* Gory, qui je ne connais pas et dont la diagnose est fort incomplète.

¹⁾ J'ai vu le type de cette espèce!

- transversale avant l'apex. Prosternum large, fortement rétréci en arrière. Long.: 3.5, lat.: 1.75 mm. Natal, Cape Province.
- **3. *Trachys* (H.) *Thomasseti* Théry**
- 11 (10) Sans touffe au milieu du prothorax. Pubescence de dessus plus fine, plus régulière, plus uniforme, moins dense. Surface beaucoup plus luisante, d'un bronzé violacé très obscur. Bande transversale claire, légèrement ocrée, de la partie postérieure des élytres peu dense, simple. Saillie prosternale relativement étroite, brusquement et fortement élargie antérieurement. Long.: 3, lat.: 1.35 mm. Natal.
- **4. *Trachys* (H.) *Zaghana* n. sp.**
- 12 (9) Pilosité du dessus d'un roux très clair et uniforme, sans bande préapicale ou partie postérieure claire. Touffes du prothorax et des élytres d'un noir profond. Surface, sous la pubescence, d'un noir profond et mat. Les yeux sont situés latéralement, presque invisibles de dessus. Tête très large, plus large que chez les deux espèces précédentes, latéralement en carène encore beaucoup plus aiguë et élevée. Prothorax parallèle dans la partie basale. Long.: 2.8, lat.: 1.4 mm. Afrique mer.: East London.
- **5. *Trachys* (H.) *Ennia* n. sp.**
- 13 (6) Elytres bicolores, partie interne du calus huméral étant d'un bleu de indigo et mate, l'autre surface élytrale d'un bronzé noirâtre et violacé, luisant. Seulement un pair des touffes aigus aux élytres, situé un peu derrière le milieu, vers la suture; ces faisceaux sont plus grand que chez les espèces voisines. Tête beaucoup plus large que chez toutes les espèces précitées. Long.: 3.6, lat.: 1.7 mm. Natal.
- **6. *Trachys* (H.) *gratiosissima* n. sp.**
- 14 (3) Ecusson présent, mais très petit. Taille subheptagonale, convexe, régulièrement arquée. D'un bronzé brillant en dessus, avec de bandes de villosité grise. Dessous noir et luisant.²⁾
- 15 (16) D'un bronzé violacé obscur en dessus, les élytres avec des bandes préapicales grises, onduleuses et très vagues. Tête large, convexe et sillonnée en arrière. Elytres avec le calus huméral saillant et surmonté d'une carène oblique; ovulaire, assez épais. Bord des yeux non caréné. Long.: 2.3, lat.: 1.3 mm. Cap de Bonne-Espérance. (Ex Kerr.)³⁾.....
- **7. *Trachys* (H.) *discreta* Kerr.**
- 16 (15) Plus grand. Bronzé brillant en dessus, avec des bandes villeuses grises, sinueuses et assez larges. Bords des yeux tranchants; marge antérieure du prothorax faiblement échancrée en arc, les côtés obliques et faiblement arqués avec les bords tranchants. Elytres droits sur les côtés et obliquement atténués de la base au tiers postérieur; calus huméral peu saillant et surmonté d'une courte carène. Long.: 2.7, lat.: 1.6 mm. Kilimandjaro. (Ex Kerr.).....
- **8. *Trachys* (H.) *massaica* Kerr.**
- 17 (2) Carène élytrale entière.
- 18 (19) Article basal des antennes prolongé en avant en forme d'un petit corne saillant, bien visible de dessus. Cunéiforme, déprimé, atté-

²⁾ Voir aussi: 202. *Tr. (s. str.) puberula* Fahrs et 227. *Tr. (s. str.) occisa* Kerr.

³⁾ Kerremans cite cette espèce parmi les *Trachys* s. str., mais la courte carène élytrale place cette espèce incontestablement parmi les *Habroloma*.

- nué en arrière en ligne droite, d'un noir luisant, éparsément vetu d'une pubescence grise, qui forme, sur les élytres, trois assez vagues et droites bandes transversales. Long.: 3, lat.: 1.7 mm. Fernando Poo. **9. Trachys (H.) monsticornis n. sp.**
- 19 (18) Article basal des antennes normal.
- 20 (23) Surface glabre. Taille ovale, marge latérale des élytres faisant avec la courbure latérale (marginale) du prothorax une seule courbe régulière. Noir. Cavités antennaires grandes. Elytres ponctués sérialement. Une dépression ovale dans les angles antérieurs du prothorax.
- 21 (22) Front sans impression médiane distincte, plan, sans dépression linéaire le long des yeux. Partie latérale du prothorax sans ligne longitudinale allongée. Carène humérale des élytres moins distincte, très fine, située plus latéralement. Disque élytral parcouru par six lignes régulières de fovéoles. Long.: 2.5 mm. Abessynie. (Ex Théry.) **10. Trachys (H.) Raffrayi Théry.**
- 22 (21) Front au milieu avec une impression linéaire très distincte; de part et d'autre de cette ligne distinctement bombé, le long des yeux avec un sillon linéaire, assez profond; la ligne antérieure de la tête, en observant l'insecte de dessus, est alors bien inégale. Une impression linéaire et fine, nette, partant de la fossette antérieure du prothorax et dirigée perpendiculairement vers la base. Carène humérale très nette, forte, aiguë, élevée, plus éloignée du bord latéral. Sculpture fovéolée et linéaire du disque élytral subeffacée, très peu distincte. Long.: 2, lat.: 1.1 mm. Cap de Bonne-Espérance. **11. Trachys (H.) accomodata n. sp.**
- 23 (20) Surface, surtout les élytres, à pubescence distincte.
- 24 (35) Pilosité élytrale unicolore ou presque uniforme.
- 25 (32) Pilosité élytrale blanche ou grise (grise jaunâtre).
- 26 (27) Prothorax et la tête à pubescence éparsée rousse. Subovale, entièrement noir, brillant; les élytres ornés de bandes transversales et sinueuses grises, couverts de rugosités, alternant avec une ponctuation irrégulière et présentent, le long de la marge latérale et à une certaine distance de celle-ci, une côte humérale, qui n'atteint par le sommet. Long.: 3, lat.: 2 mm. Cameroun. (Ex Kerr.) **12. Trachys (H.) camerunica Kerr.**
- 27 (26) Prothorax et la tête à pubescence grise ou blanche, semblable à celle des élytres.
- 28 (29) Surface d'un bleu violacé obscur et luisant. Pubescence de dessus grise, formant sur les élytres deux vagues bandes transversales, fleuveuses et étroites. Long.: 3, lat.: 2 mm. Congo belge.⁴⁾ **13. Trachys (H.) cara Kerr.**
- 29 (28) Surface d'un bronzé plus ou moins obscur et luisant, à pubescence d'un gris jaunâtre, formant, sur les élytres, deux bandes transversales et préapicales.
- 30 (31) Surface plus obscure, front atténué en avant en ligne légèrement sinueuse, base du prothorax plus fortement dépassant les élytres, pubescence du dessus beaucoup plus longue et plus dense, les deux

⁴⁾ J'ai vu le type de cette espèce!

- bandes transversales préapicales des élytres très flexueuses et étroites, semblables. Long.: 3.2, lat.: 2.1 mm. Pondoland. 14. **Trachys (H.) pondolana** n. sp.
- 31 (30) Surface plus claire, d'un brouzé doré, front atténué en avant en ligne légèrement courbée, base du prothorax moins large, pubescence du dessus beaucoup plus fine et plus courte, les deux bandes préapicales, dont la postmédiane est très large, presque réunies en une seule large bande préapicale. Dessous bronzé. Long. 3.4, lat.: 2 mm. Transvaal. 15. **Trachys (H.) Van Soni** n. sp.
- 32 (25) Pilosité élytrale rousse ou d'un brun rouge ou orangé.
- 33 (34) Cuivreux. Plus large, plus petit. Côtés du prothorax déprimés, à pubescence jaune, qui couvre, de même, en large espace l'apex élytral. Lobe antéscutellaire de part et d'autre avec une dépression oblique. Elytres à ponctuation rugueuse, obsolète. Long.: 3.25, lat.: 2.25 mm. Limpopo. (*Trachys (H.) senegalensis* Fahreus nec Cast. et Gory.) 16. **Trachys (H.) Thamentis** nom. n.
- 34 (33) Oblong ovale, d'un bronzé obscur en dessus et couvert d'une abondante villosité, rousse, orné sur le pronotum d'une bande transversale villeuse plus claire et, sur les élytres, de bandes semblables, longitudinales, un peu obliques, incurvées en avant vers la suture, autour d'espaces arrondis, plus dénudés. Dessous bronzé brillant, à courte villosité rousse. Angles postérieurs du pronotum aigus et un peu abaissés sur l'épaule. Long.: 4, lat.: 2 mm. Transvaal. (Ex Kerr.) 17. **Trachys (H.) pretoriensis** Kerr.
- 35 (24) Pilosité élytrale distinctement bicolore.⁵⁾
- 36 (49) Pilosité élytrale d'un blanc gris ou argenté combiné avec de pubescence jaune ou rouge-rouse jusque brune.
- 37 (38) Plus grand (Long.: 4, lat.: 2 mm), subgibbeux, largement arrondi en arrière, noir en dessus, la tête, le pronotum et les élytres couverts d'une pubescence roux doré, mêlée de quelques poils blancs, disposée, sur les élytres, en larges bandes flexueuses limitées en avant par une étroite bande blanche, ces bandes plus nettes en arrière. Tête assez large, les côtés du pronotum obliquement et irrégulièrement arqués et légèrement aplanis. Calus huméral des élytres saillant. Congo belge.⁶⁾ 18. **Trachys (H.) allecta** Kerr.
- 38 (37) Plus petit, cunéiforme et plus ou moins aplani sur le dos, atténué en arrière. Bandes flexueuses des élytres étroites, parfois divisées en quelques macules petites et isolées.
- 39 (42) Prothorax plus large, fortement dilaté vers les côtés, plus aplani latéralement, de part et d'autre du lobe présutellaire avec une légère et distincte dépression oblique. Taille cunéiforme et déprimée, plus grande. D'un noir légèrement bronzé. Pubescence brune, avec ornements blancs.
- 40 (41) Plus robuste, plus large, côtés du prothorax subviolacés. Tête relativement moins large, plus enfoncée dans le prothorax, qui est plus largement arrondi latéralement, ayant sa plus grande largeur un

Kerr.!

⁵⁾ Voir de même les 14. *Trachys (H.) pondolana* m. et 17. *Tr. (H.) pretoriensis*

⁶⁾ J'ai vu le type de cette espèce!

peu avant la base, plus fortement déprimé latéralement, plus inégal, avec les dépressions prébasales plus fortes. Front moins fortement atténué en avant. Pilosité du prothorax brune, avec trois petites macules blanches au milieu, pubescence élytrale plus dense, brune, avec trois bandes onduleuses blanches — ces bandes étant divisées en macules arrondies isolées. Plus obscur, moins luisant. Long.: 3, lat.: 1.9 mm. Congo belge: Eala.

- **19. Trachys (H.) Epimethis n. sp.**
- 41 (40) Moins robuste, plus étroit, plus luisant, d'un bronzé noir plus clair. Tête plus large, moins enfoncée dans le prothorax, qui a la plus grande largeur dans la base et qui est, en général, moins large, moins fortement déprimé latéralement, moins inégal, aux dépressions prébasales plus légères. Front un peu plus fortement atténué en avant. Pilosité du prothorax brune concolore, sans macules blanches, pilosité des élytres brune, avec bandes transversales, vagues et entières, ininterrompues très flexueuses. Long.: 2.9, lat.: 1.7 mm. Cameroun. **20. Trachys (H.) Davidiana Obenb.**
- 42 (39) Prothorax moins large, ayant sa plus grande largeur dans la base, plus régulièrement convexe, sans dépressions obliques prébasales avant l'écusson. Taille plus convexe, plus étroite, moins cunéiforme, plus ovulaire.
- 43 (44) Pilosité élytrale éparse, mais très régulière, disposée en séries longitudinales des poils, d'un brun roux, avec trois vagues lignes onduleuses transversales subinterrompues blanchâtres. Ligne antérieure de la tête, visible de dessus, distinctement trisinuée, avec une impression médiane et deux impressions latérales, avec les bords oculofrontaux en carène. D'un bronzé brun et luisant. Long.: 2.2, lat.: 1.2 mm. Zouloulund. **21. Trachys (H.) zuluana n. sp.**
- 44 (43) Pilosité élytrale plus dense, plus longue, disposée irrégulièrement.
- 45 (46) Tête assez avancée, aux angles oculofrontaux distinctement aigus. D'un bronzé violacé luisant, couvert de pilosité d'un brun ocré, très irrégulière et éparse, surtout sur les élytres, où elle forme deux vagues bandes transversales plus distinctes. Angle latéropostérieur des hanches postérieures subarrondi. Long.: 2.9, lat.: 1.9 mm. Transvaal. **22. Trachys (H.) repetitrix n. sp.**
- 46 (45) Angles oculofrontaux arrondis, nullement en carène. Tête plus enfoncée dans le prothorax.
- 47 (48) Angle latéropostérieur des hanches postérieures subarrondi. Pilosité générale des élytres blanchâtre, avec entremêlés poils brunâtres, sans un dessin plus clair. Pubescence de la tête et du prothorax d'un brun ocré roussâtre. Long.: 3, lat.: 1.7 mm. Mashonaland. **23. Trachys (H.) Argathra n. sp.**
- 48 (47) Angle latéropostérieur des hanches postérieures aigu. Pilosité générale des dessus rousse, avec, sur les élytres, trois vagues bandes flexueuses et transversales d'un jaune blanchâtre. Long.: 2.5, lat.: 1.7 mm. Mashonaland. **24. Trachys (H.) Naghma n. sp.**
- 49 (36) Pilosité élytrale ocrée ou d'un jaune grisâtre, combinée avec espaces ou macules plus obscurs, noirâtres, ⁷⁾ les espaces

⁷⁾ Voir aussi le 24. *Tr. (H.) Naghma n. sp.*

obscur souvent à l'apparence lisse et glabre, en réalité couverts de pubescence obscure peu perceptible.

- 50 (51) Un large espace postscutellaire, en forme d'un carré allongé, sur les élytres glabre. Une très large bande préapicale de jaune ocré sur les élytres. Pubescence prédominante du prothorax d'un gris ocré, au milieu avec deux macules discales d'un brun roux. Suture élytrale étroitement bordée de brun. Angles latéropostérieurs des hanches postérieures subarrondis. Long.: 3.5, lat.: 2.1 mm. Mashonaland. 25. **Trachys (H.) salisburyensis** n. sp.
- 51 (50) Sans large espace rectangulaire sur les élytres, derrière l'écusson, à l'ornementation normale des bandes transversales élytrales, plus claires que le fond.
- 52 (53) Ces deux bandes préapicales élytrales larges et réunies ou presque réunies dans une seule très large bande, à coloration d'ailleurs peu différente de nuance générale de pilosité élytrale. Ligne antérieure, visible de dessus, du front presque droite, bords oculofrontaux subarrondis. Long.: 4.5, lat.: 2 mm. Transvaal. 26. **Trachys (H.) absterrens** n. sp.
- 53 (52) Les deux bandes flexueuses élytrales sont bien isolées avant l'apex. Bords oculofrontaux caréniformes. D'un bronzé violacé noirâtre, à pubescence générale rousse ou brune.
- 54 (55) Plus luisant. Tête, vue de dessus, simplement et légèrement excavée, beaucoup moins large. Marge antérieure du prothorax plus profondément échancrée. Pilosité du dessus plus fine et moins dense, celle des bandes flexueuses élytrales seulement un peu plus dense que celle de l'autre surface. Long.: 3, lat.: 1.7 mm. Port Saint John. 27. **Trachys (H.) Gamadega** n. sp.
- 55 (54) Moins luisant, à pilosité beaucoup plus dense. Ligne antérieure de la tête, vue de dessus, distinctement bisinuée, le front étant déprimé le long des yeux et au milieu, aux bords oculofrontaux caréniformes. Pilosité du dessus rude et beaucoup plus dense, longue, celle des bandes flexueuses élytrales beaucoup plus dense que celle de l'autre surface. Long.: 3, lat.: 1.9 mm. Mashonaland. 28. **Trachys (H.) Xamartha** n. sp.
- 56 (1) *Sans carène humérale des élytres. Mentonnière en général absente ou indistincte. Saillie prosternale en général étroite, jamais en trapèze très élargi postérieurement.*
(Sbg. **Trachys s. str.**)
- 57 (68) Elytres ornés, le plus souvent dans la partie préapicale, des touffes de poils dressés.
- 58 (63) Quatre touffes des poils dressés sur les élytres. Corselet sans touffes semblables.⁸⁾
- 59 (60) Ces touffes des élytres placées antérieurement: les élytres présentant de part et d'autre deux calus, l'un huméral, l'autre subsutural, garnis d'une villosité rousse, hérissée; court, épais, convexe, légèrement relevé au bout, d'un noir violacé en dessus, avec, sur la tête et le pronotum, une villosité roux doré alternant avec des taches

⁸⁾ Voir aussi le 235. *Tr. (s. str.) Schultzzei* Kerr.!

blanches. Elytres garnis d'une villosité rousse, sur toute leur surface, mais plus dense sur les côtés et au sommet avec quelques poils épars, blans et irrégulièrement disposés sauf sur deux bandes, linéaires nettes, très fleuveuses, l'une au tiers postérieur, l'autre vers le sommet. Marge latérale du prothorax crénelée. Elytres très convexes le long de la base, droits ensuite et légèrement relevés au sommet, couverts de séries longitudinales des points avec, çà et là, la villosité suivant l'allure de ces séries. Long.: 4.5, lat.: 2.8 mm. Zambèze. (Ex Kerr.) 29. **Trachys (s. str.) obesa** Kerr.

- 60 (59) Touffes des élytres situées postérieurement. Taille plus cunéiforme. Prothorax et tête à pilosité dorée, tête simplement et largement excavée au milieu, élytres noirs, à pilosité noire très courte, plus ou moins distincte, ornés d'une bande fleuveuse prémédiane rousse et de deux semblables et beaucoup plus distinctes bandes semblables préapicales, dont la partie des poils est, postérieurement, relevée et dressée en forme de petite brosse ou touffe, obscurcie au sommet.

- 61 (62) Taille plus allongée; prothorax et tête d'un bronzé clair au fond. Elytres plus longs, à pubescence noirâtre plus distincte, plus étroits, à partie basale moins convexe. Pubescence des bandes préapicales plus courte. Angle latéropostérieur des hanches postérieures subaigu. Long.: 4, lat.: 2.1 mm. Congo belge.⁹⁾

..... 30. **Trachys (s. str.) comitessa** Kerr.

- 62 (61) Taille plus raccourcie, prothorax et tête souvent plus obscurs au fond; élytres plus courts, à pubescence noirâtre moins distincte, plus larges, à partie basale plus convexe. Pilosité des bandes préapicales plus longue. Angle latéropostérieur des hanches postérieures subarrondi. Long.: 3.7, lat.: 2.3 mm. Afrique or. c.¹⁰⁾

..... 31. **Trachys (s. str.) Masoni** Théry.

- 63 (58) Deux touffes seulement aux élytres.

- 64 (67) Tête et corselet à coloration différente, d'un bronzé doré, de celle des élytres, qui sont noirs ou d'un bleu violacé. Taille allongée, cunéiforme, peu convexe.

- 65 (66) Elytres noirs, densément couverts de pubescence courte et noire. Taille, coloration et ornementation générale ressemble beaucoup à celle de *Tr. Masoni* Théry, qui précède, mais sans traces de touffes dans la partie apicale des élytres et, avec une petite touffe noire de part et d'autre de l'écusson, dans la partie basale des élytres. Long.: 4, lat.: 2 mm. Cameroun.

..... 32. **Trachys (s. str.) Dughbara** n. sp.

- 66 (65) Taille et ornementation générale du *Tr. Masoni* Kerr., mais les élytres presque glabres, d'un bleu violacé et luisant, une touffe, peu distincte d'ailleurs, dans la partie externe de bande transversale préapicale. Les fascies préapicales ocrées et peu distinctes,

⁹⁾ J'ai vu le type de cette espèce!

¹⁰⁾ Le *Trachys (s. str.) subnodosa* Kerr., dont j'ai vu le type, est très semblable à cette espèce; il est seulement un peu plus long et plus lisse, avec les épaules un peu plus élevées et sans touffes préapicales, mais ces-ci peuvent bien être frottés chez le type. Une espèce, qui de même, ressemble beaucoup à ces deux espèces est mon 33. *Trachys (s. str.) rivularis* Obenb. et 32. *Tr. (s. str.) Dughbara* n. sp. m.; qui suivent.

- l'aspect général lisse et luisant. Long.: 3.7, lat.: 1.9 mm. Congo belge. 33. **Trachys (s. str.) rivularis** n. sp.
- 67 (64) Toute la surface de coloration uniforme, d'un violacé noir. Taille très robuste, courte, convexe et ovale. Toute la surface couverte très densément d'une pubescence rousse, un peu plus sombre dans la partie discale, plus rousse et encore plus condensée latéralement; qui couvre presque entièrement la surface, dont la sculpture du fond est alors peu distincte. Tête et prothorax avec plusieurs macules argentées et petites, élytres avec une petite macule semblable au milieu de la base et avec trois bandes transversales, très flexueuses et très minces, dont une au tiers basal, une derrière le milieu et dernière préapicale. Calus huméral et élévation présutellaire de part et d'autre ornés de touffes de poils roux, peu élevés et en général, bien visibles seulement, quand on observe l'insecte de côté. Une des plus robustes et lourdes espèces du genre. Long.: 4.2—4.7, lat.: 2.7—3 mm. Transvaal, Mashonaland. (Tr. crassa m. in litt.) 34. **Trachys (s. str.) crassata** n. sp.
- 68 (57) Pas de trace de touffes de poils ou de groupes de poils dressés sur le prothorax et sur les élytres.
- 69 (70) Elytres avec chacun deux reliefs arrondis à la base et avec le sommet relevé en bosse; tête et pronotum bronzé cuivreux clairs et convertis d'une pubescence rousse mêlée de points argentés; élytres noirs avec de poils argentés épars et, vers le sommet, des agglomérés de poils roux sans allure distincte. Long.: 4.5, lat.: 2.3 mm. Erythrée.¹¹⁾ 35. **Trachys (s. str.) subnodosa** Kerr.
- 70 (69) Base élytrale normale, sans élévations distinctes.
- 71 (516) Tête et prothorax toujours avec une pubescence plus ou moins dense.
- 72 (489) Pubescence de la tête et du prothorax identique à celle des élytres (voir aussi: 484 [367]).
- 73 (97) Taille en ovale très allongé, parfois parallèle et subcylindrique.
- 74 (81) Surface à pubescence jaune claire.
- 75 (76) Marge antérieure du prothorax coupée en ligne droite. D'un bronzé brunâtre, à pilosité éparse; tête au milieu déprimée, excavée; prothorax fortement atténué en avant, transversalement et faiblement déprimé latéralement; élytres deux fois plus longs que larges. Long.: 2.25, lat.: 1.25 mm. Natal.
- 36. **Trachys (s. str.) lucidula** Fahr.
- 76 (75) Marge antérieure du prothorax distinctement échancrée en arc plus ou moins profond.
- 77 (78) Marge antérieure du prothorax échancrée en arc simple, large et profond. Cuivreux en dessus; prothorax court, quatre fois plus

¹¹⁾ J'ai vu le type de cette espèce. L'exemplaire typique ressemble beaucoup à 31. *Tr. Masoni* Théry, et je ne suis pas assez sûr, que ce ne soit pas un exemplaire frotté de cette espèce. En réalité il diffère, en outre de la pubescence différente, seulement par les épaules plus élevées, dépourvues des touffes, de l'espèce de *M. Théry*. Le prothorax et la tête sont pubescents de la même façon que chez 31. *Tr. Masoni* Théry.

¹²⁾ On trouve sous ce nom dans les collections divers exemplaires des espèces les plus hétérogènes. Surtout *Kerremans* a déterminé beaucoup des *Trachys* d'Afrique sous ce nom, dont la plupart erroneusement.

large que long, irrégulièrement pubescent. Elytres subparallèles jusque vers le milieu, deux fois plus longs que larges, peu convexes, rugueux latéralement, moins distinctement sur le dos, à pilosité jaune et irrégulière. Long.: 3, lat.: 1.6 mm. Natal.

..... 37. *Trachys (s. str.) incerta* Fahr.

78 (77) Marge antérieure du prothorax échancrée en ligne distinctement bisinuée.

79 (80) D'un bronzé verdâtre obscur. Tête à peine impressionnée au milieu. Prothorax plus fortement atténué en avant en ligne arquée plus oblique, sans carène latérale visible de dessus ou aplatie, nettement ponctué, surtout latéralement. Sculpture élytrale fine, coriacée. Pilosité de dessus jaune, plus condensée postérieurement en forme de bande transversale plus distincte. Long.: 2.7, lat.: 1 mm. Africa c.: Mombo.

..... 38. *Trachys (s. str.) Mystaxidora* n. sp.

80 (79) Bronzé, recouvert partiellement d'une pilosité d'un blanc jaunâtre épaisse sur la tête et sur le pronotum, groupée sur les élytres pour y former des dessins à la partie postérieure, ces dessins sont très vagues et formés d'une pubescence très peu serrée. Tête impressionné sur le front, parcourue sur toute sa longueur par un fin sillon. Prothorax aux côtés très faiblement arqués, vus de dessus, aplatis en mince carène tranchante complètement droite, avec les angles postérieurs largement obtus, la base largement bisinuée avec le lobe médian arrondi, son rebord relevé en fine carène saillante ainsi que la base des élytres; sans ponctuation nette. Elytres à ponctuation formée de fovéoles grossières, disposées sans ordre, assez serrées, réparties sur toute la surface, plus grosse et plus forte à la base; cette ponctuation donne à l'élytre un aspect corrodé. Long.: 2.75, lat.: 1.25 mm. Abessynie. (Ex Théry.)

..... 39. *Trachys (s. str.) abyssinica* Théry.

81 (74) Pilosité de dessus blanche.¹³⁾

82 (89) Pilosité élytrale disposée postérieurement en bandes transversales, plus ou moins onduleuses.

83 (84) Plus grand entièrement noir. Epais, ovalaire; les côtés à peine atténués en arrière, très brillant; les élytres ornés de deux vagues bandes sinueuses grises, l'une médiane, l'autre au tiers postérieur et d'un point préapical de même. Tête excavée, bords des yeux faiblement carénés. Pronotum faiblement échancré en arc en avant. Long.: 2.5, lat.: 1.3 mm. Assinie. (Ex Kerr.)

..... 40. *Trachys (s. str.) assinica* Kerr.

84 (83) Plus petit. D'un bronzé plus ou moins clair. Elytres ornés de deux vagues bandes, assez larges, l'une avant le tiers postérieur, l'autre préapicale, sans aucun point préapical. Tête plus ou moins profondément sillonnée au milieu.

85 (88) Marge antérieure du prothorax échancrée en arc cimple, sans trace du lobe médian antérieur.

86 (87) Taille plus courte, plus large. Elytres plus courts environ $1\frac{2}{3}$ fois plus longs que larges, au dessin fasciforme beaucoup plus

¹³⁾ Voir, de même, le 39. *Trachys (s. str.) abyssinica* Théry!

distinct. Prothorax plus large, plus profondément et plus largement échancré en avant; base thoracique légèrement relevée. Saillie prosternale distinctement dilatée postérieurement. Long.: 2.2—2.7, lat.: 1.15—1.5 mm. Africa occ. mer.

.....41. **Trachys (s. str.) damarigena n. sp.**

- 87 (86) Taille très allongée, subcylindrique, élytres deux fois plus longs que larges, à pubescence beaucoup plus vague, formant des bandes transversales peu régulières, moins denses et beaucoup moins distinctes. Prothorax moins large, à marge antérieure beaucoup moins fortement échancré, base thoracique simple. Saillie prosternale subparallèle. Long.: 2.25, lat.: 1 mm. Afrique mér.

.....42. **Trachys (s. str.) evanescens Fahr.**

- 88 (85) Marge antérieure du prothorax échancrée en arc très nettement bisinué, lobe médian antérieur très large, mais distinct. Tête très grande, très large, prothorax presque quatre fois plus large que long. Saillie prosternale subparallèle. Long.: 2.7, lat.: 1.1 mm. Transvaal. Afrique mér. occ.

.....43. **Trachys (s. str.) eurycephala n. sp.**

- 89 (82) Pilosité élytrale uniforme ou subuniforme, parfois plus distincte postérieurement, où elle n'est pas condensée en forme de fascie ou bandes transversales.

- 90 (91) Elytres d'un bronzé brillant avec la moitié postérieure plus rugueuse que l'antérieure et couverte d'une rare villosité d'un gris blanchâtre. Ecourté, convexe, subparallèle sur les côtés; tête large, forte, à peine pointillée, déprimée entre les yeux. Marge antérieure du pronotum faiblement bisinuée; les côtés un peu obliques et à peine arqués. Ponctuation élytrale consiste des séries de points irrégulièrement disposées. Long.: 2.5, lat.: 1 mm. Bas Narok. (Ex Kerr.)44. **Trachys (s. str.) parallela Kerr.**

- 91 (90) Sculpture élytrale et pilosité du dessus uniforme ou subuniforme.

- 92 (93) Espèce bronzée, plus grande. Oblong, écourté, épais, les côtés parallèles, couvert en dessus d'une très courte villosité grise, espacée. Tête large, faiblement excavée en avant, côtés du pronotum obliquement atténués en arc, élytres à ponctuation peu profonde, mais assez régulière. Long.: 3, lat.: 1.7 mm.¹⁴⁾ (Ex Kerr.) Voir:.....

.....53. **Trachys (s. str.) Simoni Kerr.**

- 93 (92) Plus petit (environ 2—2.7 mm), d'un bronzé plus obscur, parfois noirâtre.

- 93 (94) Marge antérieure du prothorax échancrée en arc simple, sans lobe large médian distinct. Tête grande et large, plane, avec une ligne très fine longitudinale au milieu du front. Surface d'un bronzé noirâtre, couverte d'une pubescence grise, très régulière et fine. Angle latéropostérieur des hanches postérieures aigu. Saillie prosternale assez étroite, parallèle. Long.: 2.3, lat.: 1.1 mm. Transvaal.45. **Trachys (s. str.) capicola n. sp.**

- 94 (93) Marge antérieure du prothorax échancrée en ligne nettement bisinuée, à lobe médian antérieur large, mais bien distinct.

- 95 (96) Tête très large, plane. Prothorax très court, presque quatre fois plus large que long. D'un bronzé obscur. Taille de *Tr. eurycephala*

¹⁴⁾ Voir de même le 56. *Trachys (s. str.) Tiwiana* Obenb.!

m. Long.: 2.2—2.8, lat.: 0.95—1.4 mm. Transvaal, Pondoland, Ukerewe etc.

46. **Trachys (s. str.) tenuis** n. sp.

- 96 (95) Tête beaucoup moins large, distinctement déprimée au milieu. Prothorax environ $3\frac{1}{3}$ fois plus large que long. D'un bronzé un peu plus clair. Long.: 2.2, lat.: 1 mm. Zanzibar. Ukerewe.

47. **Trachys (s. str.) prolongatula** n. sp.

- 97 (73) Taille plus courte, en ovale plus ou moins régulier ou bien elliptique; élytres subparallèles seulement dans la partie basilaire, jamais jusque' au milieu.

- 98 (366) Pilosité élytrale unicolore.

- 99 (104) Élytres ornés d'une aréole ovale, encirclant un espace allongé et postscutellaire glabre ou à pubescence obscure peu perceptible ou bien à partie postscutellaire ovale glabre et l'autre surface élytrale à pubescence subégale, les deux parties élytrales très nettement délimitées.

- 100 (103) D'un bronzé brillant, plus ou moins obscur en dessus, dessous d'un bronzé un peu plus obscur. Pubescence élytrale d'un jaune ou d'un gris jaunâtre. Bord des yeux non caréné.

- 101 (102) Plus grand. Élytres brusquement déclives au sommet. Entièrement bronzé brillant et couvert d'une pubescence gris jaunâtre, assez dense sur le pourtour extérieur des élytres, où elle est très vaguement agglomérée en bandes sinueuses, laissant toute la région discale, de la base au tiers supérieur, presque' entièrement glabre. Tête sillonnée, faiblement creusée; prothorax échancré en avant en ligne nettement bisinuée avec un lobe médian subanguleux. Long.: 3, lat.: 1.7 mm. Kilimandjaro. (Ex Kerr.)

48. **Trachys (s. str.) circumdata** Kerr.

- 102 (101) Plus petit. Élytres à convexité normale. D'un bronzé très obscur et luisant, couvert d'une pubescence jaune, très régulière, fine et assez dense, qui laisse un espace allongé et ovale, situé derrière l'écusson et prolongé, le long de la suture, jusque dans les $\frac{3}{5}$ postérieures de la longueur élytrale, glabre (en réalité couvert d'une pubescence extrêmement fine et éparse, noirâtre, presque' imperceptible). Tête seulement faiblement déprimée au milieu. Prothorax échancré antérieurement en ligne régulièrement arquée, sans trace du lobe antérieur médian. Long.: 2.5, lat.: 1.2 mm. Ukerewe, Congo belge: Vista.

49. **Trachys (s. str.) fenestrella** n. sp.

- 103 (100) D'un bronzé violacé en dessus, d'un noir profond en dessous, couvert, sur les élytrales, de pubescence d'un blanc grisâtre, sans nuance jaune. Un espace allongé et ovalaire, se prolongeant depuis la base jusqu' au tiers postérieur est couvert d'une pubescence obscure, grisâtre, invisible sous un certain angle. Tête largement creusée. Prothorax antérieurement échancré en arc distinctement bisiné et très large. Long.: 2.8, lat.: 1.8 mm. Congo belge.

50. **Trachys (s. str.) maligna** n. sp.

- 104 (99) Élytres sans ornementation d'une aréole ou d'un espace ovalaire glabre ou différent de pubescence latérale des élytres, ornés de pubescence uniforme ou bien disposée en bandes transversales.

- 105 (223, 358) Pubescence élytrale blanche ou grise, unicolore.
- 106 (119) Pilosité élytrale uniforme, sans dessin des bandes transversales.
- 107 (108) Front large et creusé. Tête et pronotum bronzé verdâtre, clair, élytres bronzé cuivreux très brillant. Dessous bronzé obscur. Bord oculo-frontal caréné, pronotum faiblement échancré en avant, aux côtés obliquement arqués. Élytres lisses, vaguement ponctués, les points épais mais peu profonds, la villosité grise plus dense sur la moitié postérieure, calus huméral saillant, surmonté d'une carène arquée.¹⁵) Long.: 3, lat.: 1.6 mm. Afrique or. angl. (Ex Kerr.) 51. **Trachys (s. str.) levipennis** Kerr.
- 108 (107) Tête plus ou moins faiblement excavée ou bien subplane.
- 109 (116) Espèces plus grandes, 2.75—3 mm de longueur. Tête large, les côtés plus ou moins parallèles.
- 110 (111) Élytres à ponctuation forte, rugueuse latéralement. D'un cuivreux doré, élytres d'un éclat violacé. Long.: 2.75—3 mm. Somalie. 52. **Trachys (s. str.) somala** Gestro.
- 111 (110) Élytres à ponctuation médiocre ou bien souvent peu sensible, jamais rugueuse latéralement.
- 112 (113) Tête fortement excavée en avant et finement sillonnée en arrière. Bronzé, couvert d'une très surte pilosité espacée. Ponctuation élytrale peu profonde, mais assez régulière. Oblong, écourte, épais, arrondi en avant et en arrière, les côtés parallèles. Long.: 3, lat.: 1.7 mm. Cape de Bonne-Espérance. (Ex Kerr.) 53. **Trachys (s. str.) Simoni** Kerr.
- 113 (112) Tête très large, vue de dessus plane, finement sillonnée en avant; d'un bronzé plus ou moins obscur. Epistome très large; saillie prosternale parallèle. Palpes et tarses noirs.
- 114 (115) Angle latéropostérieur des hanches postérieures aigu. Bronzé obscur, à pilosité élytrale longue, très espacée. Ponctuation élytrale peu distincte, virégulière. Marge antérieure du prothorax échancrée en ligne bisinuée, cette échancrure assez faible. Long.: 2.8, lat.: 1.6 mm. Kilimandjaro. 54. **Trachys (s. str.) Kijabensis** Obenb.
- 115 (114) Angle latéropostérieur des hanches postérieures arrondi. Bronzé assez clair, chagriné et coriacé sur toute la surface. Pilosité élytrale dense et courte, régulière. Marge antérieure du prothorax échancrée en arc simple et profond. Long.: 2.9, lat.: 1.8 mm. Cape de Bonne-Espérance. 55. **Trachys (s. str.) Hessei** n. sp.
- 116 (109) Espèce plus petites (2—2.6 mm), de taille allongée. Tête, vue de dessus, sans trace du sillon longitudinal. Ligne latérale de la tête, vue de dessus continuée dans la ligne latérale du prothorax; celui-ci atténué en avant en ligne oblique, légèrement arquée. Pattes et palpes noirs. Angle latéropostérieur des hanches postérieures aigu. Saillie prosternale subdilataée postérieurement.
- 117 (118) Saillie prosternale plus courte, aux stries latérales plus convergentes en avant. Espèce plus grande. Marge antérieure du protho-

¹⁵) Ce dernier caractère, donné par l'auteur, qui place son espèce parmi les *Trachys* s. str. laisse soupçonner, que ce soit une *Habroloma*. Je ne connais pas cette espèce en nature et j'ai reproduit seulement les caractères, donnés dans la diagnose originale, d'ailleurs assez insuffisante.

rax plus profondément échancrée en arc simple. D'un bronzé doré assez clair et luisant. Long.: 2.5, lat.: 1.5 mm. Afrique or. anglaise. 56. **Trachys (s. str.) tiwiana** Obenb.

- 118 (117) Saillie prosternale plus longue, aux stries moins fortement converglantes en avant. Plus petit. Marge antérieure du prothorax plus faiblement échancrée, cette échancrure distinctement bisinuée, au lobe median distinct. D'un ovale très regulier, bronzé brillant, couvert de pubescence grise, vaguement disposée en bandes irrégulières sur la région postérieure des élytres. Dessous d'un bronzé plus cuivré et plus brillant que le dessus. Long.: 2.6 mm. Afrique or. anglaise. 57. **Trachys (s. str.) ovis** Kerr.

- 119 (106) Pilosité élytrale disposée en forme d'ornementation spéciale des bandes.

- 120 (222) Ces bandes transversales et simples, plus ou moins onduleuses, jamais prolongées la long de la suture en forme de bande longitudinale (combinée postérieurement avec une des bandes préapicales transversales).

- 121 (128) Elytres d'un bleu clair ou un peu violacé.

- 122 (125) Prothorax bleu ou, au moins d'un noir bleuâtre, à reflets bleus ou un peu violacés.

- 123 (124) Dessous bronzé violacé. Pattes d'un jaune ocré obscur. Saillie prosternale large, courte et parallèle, à peine atténuée en avant. Taille ovulaire, plus convexe, d'un bleu plus clair et plus luisant, bandes transversales préapicales onduleuses vagues, d'un blanc jaunâtre. Angle latéropostérieur des hanches postérieures subaigu. Elytres atténués en arrière depuis la base, à marge basale normale, nullement relevée. Un assez grand espace des yeux visible de dessus. Long.: 2.6, lat.: 1.5 mm. Zambesi.

..... 58. **Trachys (s. str.) Zambesica** n. sp.

- 124 (123) Dessous noir. Pattes et palpes d'un jaune orangé très clair. Saillie prosternale subparallèle. Taille plus déprimée et plus parallèle, d'un bleu un peu violacé sur les élytres, tête et prothorax d'un bleu noirâtre. Bandes onduleuses transversales beaucoup plus claires, argentées et très distinctes. Angle latéropostérieur des hanches postérieures arrondi. Elytres subparallèles dans la moitié basale; bord basal du prothorax étroitement, mais très distinctement relevé en carène. Seulement un très étroit espace des yeux visible de dessus. Long.: 2.4, lat.: 1.6 mm. Zululand.

..... 59. **Trachys (s. str.) eucyanea** n. sp.

- 125 (122) Prothorax noir. Deux bandes transversales préapicales et fluxueuses sur les élytres.

- 126 (127) Ovalaire, noir, à pubescence éparsse blanche, élytres bleus, à ponctuation éparsse. Tête très courte, avec un impression arrondie au dessus de l'épistome. Marge antérieure du prothorax presque coupée en ligne droite. Elytres deux fois plus longs que larges. Long.: 2.5, lat.: 1.5 mm. Gariep.

..... 60. **Trachys (s. str.) timida** Boh.

- 127 (126) D'un bleu violacé un peu noirâtre, à pubescence grise condensée dans une bande postmédiane transverse et une vague bande préapicale, l'autre surface couverte d'une pilosité fine et éparsse, peu per-

- ceptible, noirâtre. Marge antérieure du prothorax profondément et largement échancrée en arc simple. Elytres environ $1\frac{3}{5}$ fois plus longs que larges. Long.: 3, lat.: 1.8 mm. Sierra Leone.
- **61. *Trachys* (s. str.) *Cythaeris* n. sp.**
- 128 (121) Surface d'un bronzé plus ou moins clair ou bien noire.
- 129 (219) Tête, corselet et les élytres de la même coloration.
- 130 (153) D'un noir profond en dessus.
- 131 (136) Espèces plus grandes: longueur 3.2—3.6 mm.
- 132 (133) Sommet des élytres relevé en bosse, brusquement déclive postérieurement. Court, épais, arrondi en arrière, d'un noir brillant, très légèrement bleuâtre, les élytres couverts d'une rare pilosité grise, vaguement disposée en bandes vers le sommet. Tête largement creusée, le bord des yeux relevé et tranchant, calus huméral très fort et caréné.¹⁶⁾ Long.: 3.4, lat.: 1.8 mm. Afrique or. anglaise. (Ex Kerr.) **62. *Trachys* (s. str.) *africana* Kerr.**
- 133 (132) Sommet des élytres normal, peu élevé; calus huméral des élytres normal. Déclivité postérieure des élytres médiocre. Tête largement excavée, sillonnée au milieu. Prothorax impressionné latéralement. Angle latéropostérieur des hanches postérieures largement arrondi. Prosternum assez large, subélargi postérieurement, un peu étranglé au milieu. Palpes roux, tarses d'un brun très obscur. Marge antérieure du prothorax fortement échancrée.
- 134 (135) Angle oculofrontal sur la tête subcaréné. Marge antérieure du prothorax plus largement, moins profondément échancrée en ligne subbisinuée, à lobe médian présent, quoique très légèrement tracé. Prothorax à dépression latérale prolongée vers le milieu du disque, quoique' ici peu sensible. Long.: 3.6, lat.: 2 mm. Cameroun, Congo belge.¹⁷⁾ **63. *Trachys* (s. str.) *Kraatzii* Kerr.**
- 135 (134) Angle oculofrontal subarrondi. Marge antérieure du prothorax plus fortement échancrée en arc simple, sans trace du lobe antérieur. Prothorax sans dépressions transversales, les impressions des côtés étant arrondies et latérales. Long.: 3.3, lat.: 2 mm. Limpopo, Rhodesie, Congo belge. **64. *Trachys* (s. str.) *coracina* Fahr.**
- 136 (131) Espèce de taille beaucoup moindre: long.: 2.5—2.7 mm.
- 137 (138) Taille convexe et ovoïde, tête très large et plane, sans impression médiane distincte. La ligne latérale du tête, vue de dessus, faisant le prolongement simple de la courbure des côtés du prothorax, qui est largement, profondément échancré en avant en arc simple. Long.: 2.1, lat.: 1.1 mm. Cape de Bonne-Espérance.
- **65. *Trachys* (s. str.) *Racilia* n. sp.**
- 138 (137) Taille moins ovalaire, tête moins large, toujours plus ou moins fortement subdéprimée au milieu. Moins convexe.
- 139 (140) Tête excavée légèrement; front sillonné. Oblong-ovale, à pubescence du dessus rare et très espacée. Elytres ornés, sur la région posté-

¹⁶⁾ Je ne connais pas cette espèce de *Kerremans* et j'ai reproduite la diagnose originale de l'auteur. Le calus huméral très fort et caréné laisse penser, que ce pourrait être une espèce aberrante du sousgenre *Habroloma*, mais *Kerremans* n'a pas, en général, décrit ces espèces trop consciencieusement.

¹⁷⁾ J'ai vu le type de cette espèce!

- rieure de très vagues bandes sinueuses blanches. Long.: 2.7, lat.: 1.3 mm. Congo belge. **66. *Trachys* (s. str.) *Tschoffeni* Kerr.**
- 140 (139) Tête fortement excavée et impressionnée.
- 141 (142) Ovale, épais. Elytres ornés de deux vagues bandes sinueuses grises, l'une médiane, l'autre au tiers postérieur et d'un point pré-apical de la même allure. Bord des yeux faiblement carénés. Échancrure antérieure du prothorax faible, en arc simple. Long.: 2.5, lat.: 1.3 mm. Assinie. Voir:
- **40. *Trachys* (s. str.) *assinica* Kerr.**
- 142 (141) Allongé, moins épais. Fascies transversales blanches simples et, le plus souvent, vagues; pas de points isolés blancs préapicaux.
- 143 (144) Marge antérieure du prothorax échancrée en arc bisinué, avec un lobe médian distinct. Taille ovale, assez allongée, à pubescence argentée assez dense. Prothorax faiblement atténué en avant. Saillie prosternale assez large, un peu sinueusement atténuée en avant. Angle latéropostérieur des hanches postérieures arrondi. Palpes et tarses obscures. Long.: 2.8, lat.: 1.6 mm. Mashonaland.
- **67. *Trachys* (s. str.) *dasytricha* n. sp.**
- 144 (143) Marge antérieure du prothorax profondément échancrée en arc simple, sans trace du lobe médian antérieur. Angle latéropostérieur des hanches postérieures aigu. Palpes et tarses jaunâtres.
- 145 (148) Saillie prosternale assez large et subparallèle.
- 146 (147) Plus petit. Pubescence de la tête et du prothorax très distincte, blanche, assez longue et assez dense. Elytres plus étroits. Long.: 2, lat.: 1.05 mm. Kilimandjaro.
- **68. *Trachys* (s. str.) *Psecas* n. sp.**
- 147 (146) Plus grand. Pubescence de la tête et du prothorax brunâtre, très peu distincte, très courte. Taille plus ovale, élytres plus larges. Long.: 2.4, lat.: 1.4 mm. Afrique c. or.
- **68. *Trachys* (s. str.) *Dictynna* n. sp.**
- 148 (145) Saillie prosternale plus étroite, étranglée au milieu et dilatée, arrondie au sommet.
- 149 (150) Espèce plus grande. Angles antérieurs du prothorax très aigus, tête fortement excavée, marge antérieure du prothorax profondément échancrée. Long.: 2.9, lat.: 1.35 mm. Uélé.
- **69. *Trachys* (s. str.) *Philomela* n. sp.**
- 150 (149) Espèces plus petites, à marge antérieure du prothorax seulement légèrement échancrée, aux angles antérieurs du corselet courts et moins aigus, à l'excavation frontale beaucoup plus faible. Taille assez allongée.
- 151 (152) Trois bandes transversales, vagues mais distinctes, grises, aux élytres. Tête moins large, une partie plus grande des yeux visible de dessus. Partie interoculaire du front plus étroite. Epistome un peu plus large. Long.: 2, lat.: 1.1 mm. Cameroun.
- **70. *Trachys* (s. str.) *Mundama* n. sp.**
- 152 (151) Une bande préapicale flexueuse et une bande prémédiane, parfois incomplète sur les élytres. Tête plus large, une partie étroite des yeux visible de dessous. Partie interoculaire du front plus large. Epistome un peu plus étroit. Long.: 2, lat.: 1 mm. Ukerewe.
- **71. *Trachys* (s. str.) *Sabirra* n. sp.**

- 153 (130) D'un bronzé, doré, cuivreux ou violacé clair bronzé en dessus.
- 154 (155) Tête très large. Marge antérieure du prothorax presque coupée en ligne droite, à peine échancrée. Ovalaire, très convexe, d'un bronzé clair en dessus, couvert d'une pubescence rare, argentée et formant au sommet des élytres des bandes fleuveuses très vagues. Elytres formant avec le pronotum, une courbe régulière et continuée, côtés des élytres régulièrement arqués, surface élytrale finement granuleuse entre les espaces lisses et les points très épars, disposés sans ordre apparent. Long.: 2, lat.: 1.2 mm. Monts Dongollo (Erythrée)..... 72. **Trachys (s. str.) latifrons** Kerr.
- 155 (154) Tête moins large.
- 156 (157) Elytres avec un calus huméral saillant et surmonté d'une carène oblique.¹⁸⁾ Bronzé violacé obscur en dessus, les élytres avec des bandes préapicales grises, onduleuses et très vagues. Tête large, convexe et sillonnée en arrière, les bords des yeux non carénés. Marge antérieure du pronotum faiblement échancrée en avant. Ovalaire, assez épais. Long.: 2.3, lat.: 1.3 mm. Cape de Bonne-Espérance. (Ex Kerr.) Voir:..... **Trachys (s. str.) discreta** Kerr.
- 157 (156) Elytres sans calus huméral saillant et surmonté d'une carène oblique.
- 158 (161) Taille allongée, plus que deux fois aussi longue que large.
- 159 (160) Pilosité de dessus jaunâtre. Voir: 36. **Trachys (s. str.) lucidula** Fahr. et 37. **Trachys (s. str.) incerta** Fahr.
- 160 (159) Pilosité de dessus blanche. D'un bronzé obscur, tête déprimée, étroitement sillonnée, marge antérieure du prothorax subtronquée. Pilosité du dessus très fine, blanche, épars, pubescence élytrale subvariée. Elytres de la même largeur que le prothorax. Long.: 2.25, lat.: 1 mm. Natal..... 73. **Trachys (s. str.) evanescens** Fahr.
- 161 (158) Taille plus courte, plus ovalaire ou ovoïde, au plus deux fois aussi longue que large.
- 162 (163) Tête à vertex sans dépression distincte. Bandes claires élytrales éparsés et très vagues. Dessous d'un bronzé plus clair que le dessus. Saillie prosternale large, à stries marginales droites et légèrement convergeantes en avant. Tarses et palpes noirs. Angle latéropostérieur des hanches postérieures légèrement subarrondi. Kilimandjaro, Afrique or. Voir:..... 57. **Trachys (s. str.) ovis** Kerr.
- 163 (162) Tête, vue de dessus, de plus souvent à vertex plus ou moins fortement impressionné. Bandes élytrales plus denses et plus distinctes. Tarses noirâtres. Dessous d'un bronzé plus ou moins obscur.
- 164 (165) Prothorax à marge antérieure presque droite, très court et large. D'un bronzé cuivreux. Tête fortement concave; épistome étroit. Prothorax bombé, arrondi sur les côtés, aux angles antérieurs aigus. Elytres à peine plus larges que le prothorax à l'épaule, légèrement carénés à la base, calus huméral assez saillant; presque parallèles jusqu'au milieu, puis s'atténuant, couverts de gros points enfoncés, transversaux à la base, presque réticulés. Trois vagues

¹⁸⁾ Ce caractère suspecte de cette espèce, qui je ne connais pas en nature laisse penser, que ce soit une forme aberrante du sous-genre *Habroloma*.

fascies transverses mal déterminées aux élytres. Dessous bronzé lisse. Long.: 2, lat.: 1.2 mm. Sierra Leone. (Ex Théry.)

..... **74. *Trachys* (s. str.) *argenteosparsa* Théry.**

165 (164) Prothorax à marge antérieure très nettement et distinctement échancrée.

166 (167, 168, 192) Saillie prosternale dilatée en arrière, bombée, rébordée latéralement par un fin sillon, les côtés un peu divergeants, en avant. Subparallèle, court, ovalaire, bronzé assez brillant, élytres recouverts de dessins de pubescence grisâtre, argentée, peu nets. Tête large. Pronotum fortement échancré, subsinué au fond de l'échancrure. Long.: 2.5 mm. (Ex Théry.)

..... **75. *Trachys* (s. str.) *Jakobi* Théry.**

167 (166, 168, 192) Saillie prosternale peu bombée, les fins sillons latéraux soit parallèles, soit convergents antérieurement. Bronzé, subparallèle au milieu, subovalaire, peu atténué postérieurement, assez brillant. Tête large, faiblement impressionnée en avant. Long.: 2.5, lat.: 1.45 mm. Soudan anglais. (Ex Théry.)

..... **76. *Trachys* (s. str.) *Bedfordi* Théry.**

168 (166, 167, 192) Saillie prosternale généralement plus large, beaucoup plus fortement arrondie au bout, stries fines prosternales moins rapprochés, droits, parallèles ou couvrants légèrement en avant en ligne droite.

169 (176) Marge antérieure du prothorax échancrée en arc plus ou moins profond et simple; pubescence de dessus assez longue, recourbée en arrière, un peu laineuse; peu dense et formant, sur la moitié postérieure quelques fascies mal définies.

170 (173) D'un bronzé cuivreux. Tête très large. Saillie prosternale presque aussi large en avant qu'en arrière, large. Long.: 2.5—2.6 mm.

171 (172) Saillie prosternale rétrécie au milieu. Noir bronzé en dessous, bronzé cuivreux en dessus. Côtés du prothorax atténués en avant plus fortement et en ligne légèrement arquée. Elytres latéralement légèrement sinués derrière les épaules. Moins convexe, à pilosité élytrale plus rare. Tête très large et, vue de dessus, subanguleusement échancrée. Marge antérieure du prothorax échancrée en arc plus profond. Long.: 2.6, lat.: 1.4 mm. Somalie italienne.

..... **77. *Trachys* (s. str.) *Patrizziana* Théry.**

172 (171) Saillie prosternale large et subparallèle. Bronzé clair en dessous, bronzé cuivreux en dessus. Côtés du prothorax atténués en avant moins fortement et en ligne droite. Elytres très régulièrement arrondis latéralement, sans sinuation posthumérale. Très régulièrement convexe, à pilosité élytrale plus dense, à dessin élytral plus clair et plus distinct. Tête vue de dessus presque sans excavation perceptible, subplane. Marge antérieure du prothorax échancrée en arc plus faible. Angle latéropostérieur des hanches postérieures subarrondi au sommet. Long.: 2.5, lat.: 1.6 mm. Transvaal.

..... **78. *Trachys* (s. str.) *proflata* n. sp.**

173 (170) D'un bronzé violacé très obscur en dessus. Tête moins large. Saillie prosternale avec les lignes, latérales droites, distinctement convergentes en avant, de forme moins large. Angle latéropostérieur des hanches postérieures subarrondi.

- 174 (175) Forme plus large, prothorax plus fortement atténué avant. Palpes et tarses d'un jaune roux et très clair. Pubescence du dessus plus courte. Dessin élytral formé de trois bandes très flexueuses et plus distinctes. Long.: 2.5, lat.: 1.5 mm. Natal. 79. **Trachys (s. str.) Arxa n. sp.**
- 175 (174) Forme plus étroite, prothorax et tête beaucoup moins larges, corselet moins fortement atténué en avant. Pubescence de dessus plus longue, plus obscure, les trois bandes élytrales moins distinctes. Palpes et tarses d'un noir un peu brunâtre, très obscurs. Long.: 2.6, lat.: 1.4 mm. Uélé. 80. **Trachys (s. str.) Procris n. sp.**
- 176 (169) Marge antérieure du prothorax échancrée en ligne nettement bisinuée, à lobe médian antérieur distinct.
- 177 (185) Stries latérales de la saillie prosternale parallèles. Saillie prosternale plus large. Angle latéropostérieur des hanches postérieures subarrondi au sommet.
- 178 (181) Palpes et lamelles des tarses d'un jaune roux et très clair.
- 179 (180) Plus grand, d'un noir à peine bronzé en dessus. Pubescence argentée des élytres très régulière et subégale dans la partie latérale des élytres, disposée, dans la partie suturale, en trois bandes flexueuses assez larges, peu denses et régulières. Lobe médian antérieur du prothorax plus distinct. Tête plus large, plus largement et plus profondément excavée; côtés du prothorax atténués en avant en ligne droite. Base du prothorax nullement relevée dans la partie antéscutellaire. Prothorax moins court, un peu moins large que la base des élytres. Long.: 2.9, lat.: 1.7 mm. Cameroun. 81. **Trachys (s. str.) argyroneta** Obenb.
- 180 (179) Plus petit, d'un bronzé assez obscur et luisant. Pubescence grise des élytres moins distincte et moins régulière, disposée en trois vagues bandes flexueuses et transversales. Lobe médian antérieur de l'échancrure prothoracale peu distinct. Tête moins large, plus faiblement excavée. Côtés du prothorax, qui est beaucoup plus court et relativement plus large, atténués en avant en ligne légèrement arquée. Base du prothorax étroitement relevée en carène, surtout aussi avant l'écusson. Prothorax de la même largeur que les élytres. Long.: 2.5, lat.: 1.3 mm. Zouloulouland. 82. **Trachys (s. str.) Paphne n. sp.**
- 181 (178) Palpes et lamelles des tarses noirs. Prothorax au bord postérieur légèrement et étroitement relevé.
- 182 (183) D'un bronzé assez obscur, mais luisant. Marge oculofrontale légèrement subcarénée. Tête plus distinctement et largement excavée. Trois bandes élytrales flexueuses grises, toute la surface élytrale couverte de pubescence semblable, un peu plus obscure et moins claire. Élytres plus convexes, atténués en arrière depuis la base. Long.: 2.5, lat.: 1.5 mm. Congo belge. 83. **Trachys (s. str.) Lavinia n. sp.**
- 183 (182) D'un noir violacé, à pubescence argentée. Marge oculofrontale arrondie. Tête subplane. Trois bandes élytrales flexueuses et transversales argentées, l'autre surface élytrale presque glabre. Élytres

- moins convexes, subparallèles dans la partie basale. Long.: 2.5, lat.: 1.4 mm. Natal. **84. Trachys (s. str.) Xanthe n. sp.**
- 185 (177) Stries prosternales convergeantes en avant en ligne droite; saillie prosternale moins large.
- 186 (189) Palpes et tarses noirâtres, très obscurs.
- 187 (188) Trapue et assez convexe. Tête assez étroite, impressionnée au milieu, marges oculifrontales arrondies. Prothorax aux côtés assez faiblement atténués vers le sommet. Angle latéropostérieur des hanches postérieures subbaigu au bout. D'un bronzé presque noir en dessus, avec la pubescence élytrale grise, courte et espacée, réunie en séries de mouchetures blanches le long de la suture et des côtés. Dessous plus obscur. Long.: 2.2, lat.: 1 mm. Afrique orientale anglaise.¹⁹⁾ **85. Trachys (s. str.) credula Kerr.**
- 188 (187) Allongé. Tête large, à peine déprimée. Angle latéropostérieur des hanches postérieures arrondi. Pubescence élytrale disposée en trois vagues bandes transversales de pubescence éparse et grise. D'un bronzé assez clair en dessus. Long.: 2.6, lat.: 1.2 mm. Afrique orientale anglaise. **86. Trachys (s. str.) Pyrameis n. sp.**
- 189 (186) Palpes et tarses d'un roux clair ou d'un jaune ocré. Angle latéropostérieur des hanches postérieures arrondi. D'un bronzé assez obscur.
- 190 (191) Marge basale du prothorax légèrement relevée en carène. Pubescence de dessus beaucoup moins distincte, grise, plus rare, moins régulière. Marge antérieure du prothorax plus largement et plus profondément échancrée. Long.: 2.2, lat.: 1.2 mm. Congo belge. **87. Trachys (s. str.) Van den Plasi n. sp.**
- 191 (190) Marge basale du prothorax à peine relevée. Pubescence du dessus plus riche, plus claire, argentée, régulière; marge antérieure du prothorax moins largement et moins profondément échancrée. Long.: 2.2, lat.: 1.45 mm. Tanganyika, Ukerewe. **88. Trachys (s. str.) Marshalli Théry.**
- 192 (166, 167, 168) Saillie prosternale étroite et plus petite, subétranglée entre les hanches, fines stries marginales de cette saillie plus rapprochées, surtout au milieu, où ils sont subsinueux, convergeants en avant en ligne sinueuse.
- 193 (206) Marge antérieure du prothorax simplement échancrée en arc, sans lobe médian antérieur distinct.
- 194 (195) Tarses d'un testacé clair. Subovalaire, bronzé, assez brillant, recouvert en dessus d'une pubescence d'un blanc argenté, formant principalement une tache apicale, une fascie antéapicale et une tache sur le milieu du bord latéral de chaque élytre, ces taches vagues; entre les taches il existe des poils analogues, bruns, visibles seulement avec un fort grossissement. Dessous presque noir. Long.: 2.6, lat.: 1.5 mm. Afrique or. anglaise. (Ex Théry.) **89. Trachys (s. str.) Staudingeri Théry.**
- 195 (194) Tarses noirs.
- 196 (201) Angle latéropostérieur des hanches postérieures arrondi.

¹⁹⁾ J'ai vu le type de cette espèce!

- 197 (200) Marge basale du prothorax étroitement marginée, étant légèrement relevée en carène.
- 198 (199) Plus petit. Tête étroite. D'un bronzé obscur et luisant. Prothorax plus étroit, atténué en avant en ligne arquée; marge antérieure du prothorax échancrée en arc moins large, moins profond. Pilosité du prothorax éparse, subuniforme, celle des élytres formant trois vagues et très flexueuses bandes transversales. Long.: 2, lat.: 1.2 mm. Cameroun. 90. **Trachys (s. str.) argentipilis** Obenb.
- 199 (198) Plus grande. Tête plus large. D'un bronzé un peu plus obscur. Prothorax très large, atténué en avant en ligne droite; marge antérieure du prothorax très largement échancrée. Pilosité du prothorax plus inégale, condensée sur le disque en forme de trois bandes longitudinales et droites, étroites. Long.: 2.8, lat.: 1.75 mm. Uganda. 91. **Trachys (s. str.) Sphaxa** n. sp.
- 200 (197) Marge basale du prothorax non marginée, non relevée en carène étroite. D'un bronzé obscur assez luisant, à pilosité grise assez régulière, formant, sur les élytres, trois bandes transversales et onduleuses. Tête médiocre, à peine déprimée. Marge latérale du prothorax atténuée en avant en ligne régulièrement arquée. Long.: 2, lat.: 1.1 mm. Cape de Bonne-Espérance. 92. **Trachys (s. str.) Artaoxa** n. sp.
- 201 (196) Angle latéropostérieur des hanches postérieures aigu.
- 202 (205) Marge basale du prothorax étroitement relevée en carène, — ce qui est bien visible surtout sous un certain angle — et ainsi marginée.
- 203 (204) Taille plus allongée. Prothorax et tête moins larges; moins convexe. Prothorax atténué en avant en ligne oblique presque droite. Pubescence élytrale riche, condensée en deux très vagues et larges bandes transversales, peu flexueuses. D'un bronzé doré un peu verdâtre. Long.: 2.5, lat.: 1.2 mm. Usambara. 93. **Trachys (s. str.) Livia** n. sp.
- 204 (203) Taille en ovale plus court et plus convexe. Tête et prothorax larges, celui-ci atténué en avant en ligne arquée. Pubescence élytrale formant trois vagues bandes flexueuses et blanches. D'un bronzé cuivreux et assez obscur. Long.: 2.1, lat.: 1.4 mm. Zouloulund. 94. **Trachys (s. str.) Zaghra** n. sp.
- 205 (202) Marge basale du prothorax nullement relevée en carène ou marginée. En ovale assez convexe, d'un bronzé brun et obscur, assez luisant, à pubescence vague et blanche, formant sur les élytres quelques très vagues et peu distinctes bandes transversales et flexueuses. Tête large, à peine déprimée, prothorax atténué en avant en ligne légèrement arquée. Long.: 2.2, lat.: 1.5 mm. Mashonaland. 95. **Trachys (s. str.) Namithra** n. sp.
- 206 (193) Marge antérieure du prothorax échancrée en arc distinctement bisinué, avec un lobe median plus ou moins accentué.
- 207 (208) Palpes et tarses testacés. Subovalaire, d'un bronzé cuivreux, plus violacé sur les élytres, dessus recouvert d'une pubescence claire, formant sur les élytres, deux vagues fascies transversales. Tête

large, faiblement creusée en avant. Prothorax atténué en avant en ligne arquée. Long.: 2.3, lat.: 1.3 mm. Zambesi. (Ex Théry.)

..... 96. **Trachys (s. str.) Lesnel** Théry.

208 (207) Palpes et tarses d'un noir uniforme et profond.

209 (210) Angle latéropostérieur des hanches postérieures aigu. D'un violacé bronzé, assez luisant; en ovale régulier et convexe, allongé. Tête très large, à dépression linéaire au milieu. Prothorax convexe, assez large, couvert des mailles rondes, élytres à ponctuation subsériale, assez groinée mais superficielle et vague, à pubescence argentée, disposée en trois vagues bandes flexueuses et transversales. Long.: 2, lat.: 1.1 mm. Cape de Bonne-Espérance.

..... 97. **Trachys (s. str.) Porcia** n. sp.

210 (209) Angle latéropostérieur des hanches postérieures subarrondi. D'un bronzé brun plus ou moins obscur ou d'un bronzé cuivreux, sans reflets violacés.

211 (212) Espèce allongée, à pilosité élytrale condensée en deux fascies transversales sur les élytres et bordant unisérialement la suture. Bronzé, tête assez large, largement et assez profondément sillonnée en avant. Prothorax $2\frac{1}{4}$ fois plus large que long, atténué en avant en ligne arquée. Long.: 2.65, lat.: 1.4 mm. Zambesi. (Ex Théry.)

..... 98. **Trachys (s. str.) chembana** Théry.

212 (211) Espèces plus courtes, moins allongées.

213 (218) Espèces plus grandes (Long.: 2.2—2.5 mm), plus obscures, de taille plus robuste et plus trapue. Prothorax plus large. Marge basale du prothorax très étroitement relevée en carène et ainsi marginée.

214 (217) D'un bronzé très obscur, noirâtre, luisant; trois bandes vagues et flexueuses sur les élytres.

215 (216) Pubescence du dessus plus dense. Tête moins large. Prothorax atténué en avant en ligne très légèrement arquée, plus court. Long.: 2.5, lat.: 1.5 mm. Transvaal, Mashonaland.

..... 99. **Trachys (s. str.) Swiertsrae** n. sp.

216 (215) Pubescence du dessus moins dense. Tête plus large. Prothorax atténué en avant en ligne droite, oblique, distinctement moins court. Long.: 2.2, lat.: 1.3 mm. Cape de Bonne-Espérance.

217 (214) D'un bronzé cuivreux assez clair et luisant, en ovale assez large et régulier. Tête large, assez plane, prothorax atténué en avant en ligne légèrement arquée. Elytres ornés de trois vagues et très onduleuses bandes transversales blanches. Long.: 2.5, lat.: 1.1 mm. Cape de Bonne-Espérance, Mashonaland.

..... 101. **Trachys (s. str.) Darnotha** n. sp.

218 (213) Petit, bronzé doré, luisant, en ovale assez acuminé postérieurement. Prothorax peu large, atténué en avant en ligne légèrement courbée. Tête très large, légèrement déprimée en avant, élytres ornés d'un dessin argenté de trois assez larges et onduleuses bandes transversales. Long.: 1.6—2.1, lat.: 0.8—1.2 mm. Congo belge.

..... 102. **Trachys (s. str.) micans** n. sp.

219 (129) Surface bicolore: tête et prothorax de coloration bronzé, élytres obscurs, noirs.

220 (221) Ovalaire, assez épais, arrondi en arrière. Tête et pronotum bronzés, élytres noirs avec deux bandes sinueuses grises vers le sommet. Des-

sous noir. Tête largement et peu profondément excavée, avec le bord des yeux tranchant; élytres vaguement striés, le calus huméral saillant et surmonté d'une courte carène oblique, dirigée vers la suture, le sommet un peu relevé en bosse, et ensuite brusquement déclive.²⁰⁾ Long.: 3, lat.: 1.6 mm. Afrique or. anglaise. (Ex Kerr.)

- 103. *Trachys* (s. str.) *percauta* Kerr.
- 221 (220) Subcunéiforme, ayant sa plus grande largeur aux épaules. Tête, pronotum et écusson d'un bronzé, sombre, élytres d'un noir violacé, dessous noir. La pubescence de la tête et du pronotum un peu dorée, celle des élytres peu dense, en partie noire et invisible, pubescence blanche élytrale disposée en une vague fascie avant le milieu et deux autres antéapicales; la pubescence de gros poils recourbés ne voile pas le fond. Tête profondément impressionnée; sculpture élytrale formée de cicatrices très superficielles et très irrégulières. Long.: 2.9, lat.: 1.74 mm. Kenya. (Ex Théry.)
- 104. *Trachys* (s. str.) *Dummeri* Théry.
- 222 (120) Une ornementation spéciale sur les élytres: une bande étroite et longitudinale, située de part et d'autre de la suture, courbée dans le tiers apical en angle droit et prolongée vers les côtés en forme d'une bande transversale et droite; une bande préapicale droite semblable entre cette bande postmédiane et l'apex. D'un bleu clair et très luisant, à surface (à l'exception des bandes précitées) glabre; tête légèrement déprimée au milieu, marge antérieure du prothorax échancrée en arc simple, prothorax atténué en avant en ligne régulièrement courbée; saillie prosternale assez large, stries latérales légèrement rapprochées au milieu. Angle latéropostérieur des hanches postérieures subarrondi. Convexe, ovalaire, atténué vers le sommet depuis la base élytrale. Long.: 2.6, lat.: 1.6 mm. Congo belge.
- 105. *Trachys* (s. str.) *ioccosula* n. sp.
- 223 (105, 358) Elytres à pilosité jaune ou dorée, unicolore (parties entre les fascies élytrales parfois couvertes d'une pilosité jaune de nuance plus profonde).
- 224 (233) Pubescence élytrale uniforme ou subuniforme.
- 225 (226) Grand, couvert d'une pilosité très dense, et longue, jaune. Tête très large, aussi large que les $\frac{2}{3}$ de la largeur basale du prothorax. Angle latéropostérieur des hanches postérieures aigu. Saillie prosternale assez large, atténuée en avant en ligne droite. Marge basale du prothorax étroitement relevée en carène. Tête largement et peu profondément excavée. D'un bronzé brun assez luisant, assez convexe, élytres subparallèles dans la moitié basale. Long.: 3, lat.: 1.7 mm. Abessynie.
- 106. *Trachys* (s. str.) *solivaga* n. sp.
- 226 (225) Tête moins large, angle latéropostérieur des hanches postérieures subarrondi.
- 227 (230) Tête, observée de dessus, sans impression médiane distincte.

²⁰⁾ Dans ses diagnoses des *Trachys* nouveaux dans les »Genera« *Kerremans* repète plusieurs fois cette mention des épaules »surmontées d'une carène courte«. Il s'agit évidemment des *Trachys* s. str., mais cette expression laisserait à penser, qu'il s'agirait des *Habroloma*. Je pense, qu'il s'agit ici, encore une fois, d'inexactitude descriptive, bien connu chez *Kerremans*, qui étudiait ses insectes vraisemblablement sous un aggrondissement faible et, en général, très superficiellement!

- 228 (229) Grand, à pilosité de dessus jaune très obscure, presque brune. Angle latéropostérieur des hanches postérieures fortement arrondi. D'un bronzé assez obscur, un peu brunâtre. Long.: 3, lat.: 1.8 mm. Afrique mér. occ. Voir: 114. **Trachys (s. str.) solaria n. sp.**
- 229 (228) Petit, pilosité de dessus jaune pâle, plus fine, plus espacée. Angle latéropostérieur des hanches postérieures subaigu. Long.: 2.5, lat.: 1.4 mm. Congo belge. Voir: **Trachys (s. str.) eliminata n. sp.**
- 230 (227) Tête, vue de dessus, distinctement sillonnée au milieu. Marge antérieure du prothorax bisinuée.
- 231 (232) Pubescence de dessus très rare, disposée, sur les élytres, en vagues lignes transversales. Plus luisant, élytres à sculpture superficielle. Long.: 1.9, lat.: 1.1 mm. Senegal. Voir:
..... 116. **Trachys (s. str.) Baumiella n. sp.**
- 232 (231) Pubescence de dessus dense, très égale, fine. Elytres à sculpture assez grossière régulière. Saillie prosternale atténuée en avant en ligne droite. Taille petite, ovale, convexe, élytres atténués vers l'apex depuis la base en ligne régulièrement arquée. D'un noir un peu bronzé. Long.: 2, lat.: 1.1 mm. Rhodesie bor. occ.
..... 107. **Trachys (s. str.) Epischia n. sp.**
- 233 (224) Pubescence élytrale disposée en bandes transversales flexueuses jaunes.
- 234 (243) Surface bicolore — prothorax et tête à coloration différente de celle des élytres ou bien les élytres bicolores.²¹⁾
- 235 (236) Très grand, ovale, épais, écourté, tête et prothorax bronzé obscur, couverts d'une villosité jaune grisâtre terne, élytres noirs, couverts de la même villosité, très rare sur le disque, disposée en vagues bandes larges vers le sommet. Dessous noir à reflets violacés. Tête assez large excavée, avec le bord des yeux saillant. Côtés du pronotum atténués en ligne oblique, presque droite, élytres très rugueux, grossièrement chagrinés, le calus huméral très saillant et caréné, mais non prolongé en côte, le sommet relevé et ensuite brusquement déclive. Long.: 4, lat.: 2.2 mm. Stanley Falls.²²⁾ (Ex Kerr.) 108. **Trachys (s. str.) abietis Kerr.**
- 236 (235) Plus petit. Tête et prothorax cuivreux, élytres bleuâtres. Angle latéropostérieur des hanches postérieures subaigu.
- 237 (240) Saillie prosternale subparallèle. Elytres d'un bleu obscur à l'apex violacé. Deux bandes dorées très flexueuses préapicales sur les élytres. Palpes et tarses noirs.
- 238 (239) Tête et prothorax d'un bleu semblable à celui des élytres. Sans pubescence élytrales en outre des bandes préapicales. Tête très largement et distinctement excavée au milieu. Prothorax plus large, atténuée en avant en ligne distinctement arquée. Taille plus large, plus cunéiforme. Long.: 2.3, lat.: 1.5 mm. Pondoland.
..... 109. **Trachys (s. str.) Anthraora n. sp.**
- 239 (238) Tête et pronotum violacés. Avec une fascie vague et transversale dans le tiers basal des élytres. Tête subplane, large. Prothorax

²¹⁾ Voir aussi le 128b. *Trachys barbatula* var. *Kličkana* n. var.

²²⁾ Une denomination de l'espèce des plus erroneusement choisies: jamais une espèce de *Trachys* n'était trouvée sur une *Conifère*, surtout en *Abies*!

- beaucoup moins large, atténué en avant en ligne droite. Taille plus ovale, moins large, plus convexe. Long.: 2.3, lat.: 1.2 mm. Africa or. c. 110. **Trachys (s. str.) Sibylla n. sp.**
- 240 (237) Saillie prosternale distinctement convergente en avant. Palpes et tarses roux. Tête excavée. Une seule fascie préapicale, parfois mal délimitée.
- 241 (242) Tête et prothorax violacés, élytres d'un bleu assez clair. Tête plus large, prothorax moins profondément et plus largement échancré. Allongé, élytres parallèles dans la moitié basale, assez grossièrement et irrégulièrement ponctués. Long.: 2.8, lat.: 1.5 mm. Congo belge. 111. **Trachys (s. str.) Sempronia n. sp.**
- 242 (241) Tête et prothorax d'un violacé très obscur, élytres noirâtres. Tête plus étroite, prothorax plus profondément et plus étroitement échancré en avant. Pilosité du dessus très fine. Ponctuation élytrale moins grossière, très régulière, assez forte. Long.: 2.5, lat.: 1.5 mm. Haute Uélé. 112. **Trachys (s. str.) Salpia n. sp.**
- 243 (234) Surface unicolore.
- 244 (245) Elytres longs, deux fois aussi longs que larges. Voir: 36. **Trachys (s. str.) lucidula** Fhrs. et 37. **Trachys (s. str.) incerta** Fhrs.
- 245 (244) Elytres plus ovales, au plus $1\frac{2}{3}$ fois plus longs que larges.
- 246 (331) Saillie prosternale subétranglée entre les hanches où bien à côtés droits, mais ceux-ci convergents en avant et l'espace compris entre eux toujours étroit, partie apicale de la saillie prosternale étant toujours subdilataée.
- 247 (258) Angle latéropostérieur des hanches postérieures assez largement arrondi.²³⁾
- 248 (255) Tarses et palpes d'un noir profond ou d'un brun presque noir, obscur.
- 249 (250) Grand. Marge antérieure du prothorax fortement échancrée en arc simple et profond. Tête faiblement subdéprimée. Taille assez robuste, peu convexe, moitié antérieure des élytres subparallèle. D'un noir légèrement bronzé, à pilosité longue, très fine, bandes élytrales d'un jaune grisâtre, l'autre surface à pubescence semblable, mais peu perceptible noirâtre. Long.: 2.8, lat.: 1.8 mm. Congo belge. 113. **Trachys (s. str.) Pomona n. sp.**
- 250 (249) Espèces moins grandes. Marge antérieure du prothorax faiblement échancrée en arc subbisiné.²⁴⁾
- 251 (254) Tête, vue de dessus, subplane, impression médiane du front étroite et superficielle. Pilosité du dessus plus dense, d'un jaune plus doré. Bandes transversales élytrales plus distinctes.
- 252 (253) Espèce plus grande. Tête plus grande, marge antérieure du prothorax plus fortement échancrée. Saillie prosternale beaucoup plus large, plus grande. Prothorax régulièrement convexe, atténué en avant en ligne droite. Elytres convexes, en ovale allongé, couverts d'une ponctuation grossière, mais régulière, superficielle et assez dense. Espaces entre les bandes élytrales couverts d'une pubescence

²³⁾ Voir aussi 273 (262).²⁴⁾ Voir aussi 255 (248)!

jaune d'une nuance un peu plus obscure que celle des bandes transversales. Long.: 3, lat.: 1.8 mm. Afrique mér. occ.

- 114. **Trachys (s. str.) Solaria n. sp.**
- 253 (252) Espèce, petite. Tête plus petite; marge antérieure du prothorax plus faiblement échancrée plus fortement bisinuée. Saillie prosternale beaucoup plus étroite, beaucoup plus fortement atténuée en avant. En ovale régulier et convexe, d'un bronzé noirâtre et luisant. Elytres à ponctuation plus fine, plus éparsée et irrégulière. Marges latérales du prothorax atténuées en avant en ligne droite. Long.: 2, lat.: 1.2 mm. Cape de Bonne-Espérance.
- 115. **Trachys (s. str.) Capicola n. sp.**
- 254 (251) Tête, vue de dessus, fortement impressionnée au milieu, à dépression médiane profonde. Pilosité de dessus plus espacée, d'un jaune pâle. Bandes transversales des élytres moins distinctes. D'un bronzé noirâtre et luisant, marge latérale des élytres atténuée en avant en ligne légèrement arquée. Ponctuation élytrale peu dense, mais grossière et superficielle. Long.: 1.9, lat.: 1.1 mm. Sénégal.
- 116. **Trachys (s. str.) Baumlilla n. sp.**
- 255 (248) Tarses et palpes d'un brun ocré ou roux très clair. En ovale allongé, assez peu convexe.
- 256 (257) Marge antérieure du prothorax très nettement bisinuée. Un peu plus allongé. D'un bronzé brun obscur et luisant, à pubescence de dessus plus longue. Elytres avec trois vagues fascies transversales jaunes. Long.: 2.6, lat.: 1.7 mm. Congo belge.
- 117. **Trachys (s. str.) Tethis n. sp.**
- 257 (256) Marge antérieure du prothorax échancrée en arc presque simple, lobe médian antérieur à peine distinct. Pubescence du dessus plus courte, plus dense, condensée sur les élytres en trois bandes transverses et très flexueuses. Long.: 2.5, lat.: 1.5 mm. Ukerewe. Angola.
- 118. **Trachys (s. str.) Praocris n. sp.**
- 258 (247) Angle latéropostérieur des hanches postérieures aigu ou subarrondi seulement au sommet extrême.²⁵⁾
- 259 (296) Tarses et le plus souvent, de même, les palpes d'un noir profond ou d'un ocré ou brun très obscur.
- 260 (261) Epistome très large, au moins deux fois aussi large que long (au milieu); surface à pubescence très dense. Tête très large. Marge antérieure du prothorax fortement et largement échancrée en arc presque simple. En ovale assez allongé et assez peu convexe, à ponctuation élytrale assez dense, fine et irrégulière. D'un bronzé obscur et luisant. Prothorax fortement atténué en avant en ligne presque droite. Long.: 4, lat.: 1.8 mm. Congo belge.
- 119. **Trachys (s. str.) Gérardi n. sp.**
- 261 (260) Epistome plus étroit, au plus 1½ fois plus large que long.
- 262 (273) Echancrure antérieure du prothorax faible et distinctement bisinuée. Ecusson plus petit. Prothorax plus convexe, de même que les élytres. Tête large. Surface à pubescence plus dense. Angles antérieurs du prothorax très peu saillants.

²⁵⁾ Chez les espèces sous 265 (264) cet angle est droit et très légèrement arrondi au sommet.

- 263 (268) Tête assez fortement déprimée au milieu. Epistome environ $1\frac{1}{2}$ fois plus large que long (au milieu). Bord antérieur de l'échancrure du prothorax faible et très légèrement bisinué. Elytres environ $1\frac{2}{3}$ fois plus longs que larges.
- 264 (265) Espèce plus grande (2.5—2.6 mm). Allongé, assez convexe, luisant, à pubescence fine et dense. Prothorax atténué en avant en ligne légèrement arquée. Elytres à sculpture fine, peu perceptible sous la pilosité générale. Bord antérieur du prothorax faiblement échancré en ligne bisinuée. Long.: 2.5, lat.: 1.5 mm. Afrique or. anglaise. 120. **Trachys (s. str.) Kikuyina** Obenb.
- 265 (264) Espèces minuscules. Angle latéropostérieur des hanches postérieures subarrondi étroitement au sommet. Bord antérieur du prothorax très distinctement échancré en ligne bisinuée, avec lobe médian très distinct.
- 266 (267) Tarses et palpes d'un noir profond. Une assez grande partie des yeux visible de dessus. Tête moins large, prothorax très régulièrement convexe, élytres plus courts, plus convexes, ornés de trois bandes transversales et vagues dorées. D'un noir un peu bronzé. Prothorax sans dépression oblique latérale, dirigée vers la partie discale. Marge basale du prothorax seulement très étroitement relevée en carène mince. Luisant, en ovale régulier. Long.: 2, lat.: 1.1 mm. Zouloulund. 121. **Trachys (s. str.) Ariaxis** n. sp.
- 267 (266) Palpes et tarses d'un brun ocré noirâtre. Seulement une très étroite partie des yeux visible de dessus. Tête très large, aux bords oculo-frontaux légèrement subcarénée. D'un noir brun, un peu bronzé. Prothorax plus large, avec une dépression oblique latérale, marge basale plus largement et plus distinctement relevée en carène. Elytres un peu plus longs et plus parallèles, couverts de pilosité rare jaune, d'où émergent les trois vagues et très peu distinctes bandes transversales d'un jaune un peu plus clair. Luisant, allongé. Long.: 2.1, lat.: 1 mm. Mashonaland. 122. **Trachys (s. str.) Misanthra** n. sp.
- 268 (263) Tête, vue de dessus, presque plane. Epistome assez étroit, subquadratique; bord antérieur, de l'échancrure du prothorax faiblement arqué, mais très distinctement bisinué. Elytres assez courts. Taille de 2.3—2.4 mm.
- 269 (270) Taille plus large. Lobe médian antérieur du prothorax plus avancé. Prothorax plus long, élytres plus convexes. Saillie prosternale atténuée en avant en ligne courbée; moins dilatée postérieurement. Angles antérieurs du prothorax plus courts. Tête plane, grande, à dépression linéaire au milieu, prothorax très régulièrement convexe, au bord postérieur très étroitement et légèrement relevé. Taille convexe, ovulaire; d'un bronzé luisant et obscur, à pubescence dorée avec trois bandes vagues transversales d'une nuance légèrement plus claire sur les élytres. Long.: 2.1, lat.: 1.2 mm. Transvaal. 123. **Trachys (s. str.) Polyxena** n. sp.
- 270 (269) Tête un peu moins large. Lobe médian antérieur du prothorax moins distinct. Prothorax plus court, plus large, élytres moins convexes. Saillie prosternale fortement dilatée postérieurement, atté-

nué en avant en ligne droite. Les angles antérieurs du prothorax un peu plus longs et plus aigus. Prothorax atténué en avant en ligne oblique presque droite.

- 271 (272) Tarses et palpes d'un noir profond. Taille plus convexe. Plus luisant, prothorax moins large, plus convexe, au bord postérieur à peine relevé en carène. Pilosité élytrale plus fine, plus courte, d'un jaune plus obscur, agglomérée en trois très vagues bandes transversales, mais répandue régulièrement partout sur les élytres. Long.: 2.5, lat.: 1.4 mm.

124. *Trachys* (s. str.) *eliminata* n. sp.

- 272 (271) Tarses et palpes d'un brun ocré très obscur. Taille plus déprimée, plus allongée; moins luisant, d'un bronzé plus clair, à pubescence d'un jaune pâle beaucoup plus claire, plus longue, condensée en trois vagues bandes flexueuses, mais présente partout sur les élytres. Marge basale du prothorax très distinctement relevée en carène. Long.: 2.1, lat.: 1.5 mm. Ukerewe.

125. *Trachys* (s. str.) *Gabbala* n. sp.

- 273 (262) Echancrure antérieure du prothorax plus profonde. Ecusson en général plus grand. Taille souvent plus allongée. Tête plus étroite, fortement impressionnée au milieu. Angles antérieurs du prothorax plus fortement saillants.

- 274 (275) D'un bronzé cuivreux clair et luisant. Tête assez large, déprimée au milieu, yeux peu convexes, prothorax large, régulièrement convexe, légèrement relevé en carène au bord postérieur, atténué en avant en arc régulier, élytres assez courts et assez trapus, ornés de trois bandes jaunâtres assez vagues. Long.: 2.2, lat.: 1.6 mm. Zoulouländ.

126. *Trachys* (s. str.) *Miarga* n. sp.

- 275 (274) D'un bronzé plus ou moins verdâtre ou bien d'un bronzé noir assez obscur.

- 276 (277) Tête très large, yeux situés plus latéralement. Tête assez avancés. Palpes et tarses d'un noir profond. Convexe, ovalaire, subparallèle dans la moitié antérieure des élytres, bord postérieur du prothorax à peine relevé en carène, atténué en avant en ligne presque droite. Pilosité élytrale éparsée et longue, vague, irrégulière, formant des vagues bandes sur les élytres. Dessous bronzé. Long.: 2.7, lat.: 1.3 mm. Zoulouländ.

127. *Trachys* (s. str.) *Leuctria* n. sp.

- 277 (276) Tête beaucoup moins large, yeux situés plus obliquement.

- 278 (283) Espèce assez grande, plus déprimée, assez cunéiforme, plus grande. Marge basale du prothorax plus fortement relevée en carène. Ponctuation élytrale subsériale, médiocre. Tête largement excavée en avant en angle obtus; prothorax large, atténué en avant presque en ligne droite, les épaules assez élevées, fémurs plus longs, dépassant distinctement le corps en repos. Long.: 2.2—2.8, lat.: 1—1.5 mm. Congo belge.

- 279 (282) Surface unicolore — prothorax et tête de la même couleur que les élytres.

- 280 (281) Surface d'un bronzé noirâtre et obscur.

128. *Trachys* (s. str.) *barbatula* n. sp.

- 281 (280) Surface d'un bronzé doré clair. 128 a. **Tr. barbaluta** var. **dolosa** n. var.
- 282 (279) Surface bicolore — tête et prothorax d'un bronzé clair ou bronzé verdâtre, élytres d'un noir bronzé. 128. b **Tr. barbatula** var. **Kličkana** n. var.
- 283 (278) Espèces plus convexes, plus ovalaires. éémurs plus courts. Taille plus trapue.
- 284 (289) Saillie prosternale relativement assez large, élargie au sommet, subparallèle antérieurement ou atténué en avant en ligne presque droite.
- 285 (288) Palpes et tarsi d'un brun ocré très obscur.
- 286 (287) Tête relativement très étroite, très faiblement, mais donc distinctement déprimée au milieu. Tête et prothorax à pilosité jaune éparse, mais très régulière. Elytres plus étroits, fascies transversales des élytres composées de poils épars, de la même densité que l'autre pubescence élytrale, qui est obscure et peu perceptible. Ponctuation élytrale subéffacée, très peu sensible. Prothorax beaucoup plus court. Surface d'un bronzé obscur un peu cuivreux. Long.: 2, lat.: 1.1 mm. Cameroun. 129. **Trachys (s. str.) Exmiaris** n. sp.
- 287 (286) Tête large, à peine imprimée au milieu. Tête et prothorax à pilosité plus longue, éparse, mais assez irrégulière. Elytres très larges, fascies transversales élytrales composées de pubescence d'un jaune plus clair, condensée et différente alors de pilosité de l'autre surface, qui est, dans les parties intermédiaires jaunâtre, d'une nuance un peu plus obscure. Ponctuation élytrale distincte, assez grossière, vague. Prothorax distinctement plus long. Surface d'un bronzé brunâtre. Long.: 2.2, lat.: 1.4 mm. Natal. 130. **Trachys (s. str.) Dolomedea** n. sp.
- 288 (285) Palpes et tarsi d'un noir profond et luisant. En ovale allongé, assez acuminé postérieurement, tête médiocre, prothorax court, marge basale à peine relevée en carène. D'un bronzé noir assez luisant, élytres couverts de pubescence assez longue et fine, formant trois fascies transversales flexueuses peu condensées. Ponctuation élytrale médiocre. Long.: 2.2, lat.: 1.1 mm. Natal. 131. **Trachys (s. str.) Xampethis** n. sp.
- 289 (284) Saillie prosternale très étranglée au milieu, dilatée brusquement au sommet, en général petite et étroite.
- 290 (291) Palpes et tarsi d'un noir profond. D'un brun noirâtre un peu bronzé. Tête assez large, assez plane antérieurement, prothorax très régulièrement convexe, sans dépression fine le long de la marge basale, élytres parallèles dans la moitié antérieure, atténués en arc vers le sommet, où ils sont assez étroitement arrondis, à pilosité subégale, fine, formant trois vagues et étroites bandes très flexueuses sur un fond, couvert de pilosité semblable, mais obscure, peu apparente. Long.: 2.1, lat.: 1.2 mm. Cape de Bonne-Espérance. 132. **Trachys (s. str.) Mixiora** n. sp.
- 291 (290) Palpes d'un ocre brun très obscur.
- 292 (293) Piloité des élytres très dense, d'un jaune ocré, d'où émergent les trois fascies flexueuses et transversales d'un jaune de nuance un

- peu plus claire. D'un noir un peu bronzé. Tête assez large, à dépression linéaire au milieu; prothorax court et très large, atténué en avant en ligne presque droite. Long.: 2.2, lat.: 1.2 mm. Nairobi. Kenya Colony. 133. **Trachys (s. str.) Xenarthra** n. sp.
- 293 (292) Pilosité élytrale peu dense, un peu plus longue, plus irrégulière et, en général, éparse. Fascies élytrales très vagues.
- 294 (295) Plus grand, plus large, moins convexe. Tête et prothorax plus larges. Elytres couverts de pubescence éparse, fine, mais subégale, fascies transversales jaunâtres à peine condensées, vagues, espaces intermédiaires à pilosité semblable, mais obscure, peu perceptible. D'un noir un peu bronzé. Long.: 2.1, lat.: 1.2 mm. Natal. 134. **Trachys (s. str.) Dalaraea** n. sp.
- 295 (294) Très petit, convexe, tête et prothorax moins larges. Elytres plus convexes, à pilosité jaunâtre condensée en vagues bandes transversales, sans pubescence obscure dans les espaces intermédiaires. D'un noir bronzé légèrement verdâtre. Long.: 2, lat.: 1 mm. Abessynie or.: Minna bella. 135. **Trachys (s. str.) heliochaera** n. sp.
- 296 (259) Tarses et palpes d'un roux ou d'un jaune testacé très clair.
- 297 (306) Marge antérieure du prothorax échancrée en arc simple et large; tête assez large, impressionnée au milieu.
- 298 (299) Saboralaire, assez convexe et régulièrement arqué en dessus, d'un bronzé obscur et brillant. Marge antérieure du prothorax faiblement échancrée. Elytres régulièrement atténués de la base au sommet, celui-ci subacuminé et très finement dentelé. D'un bronzé obscur et brillant, couvert d'une pubescence jaunâtre plus dense sur le tiers postérieur des élytres, où elle forme deux larges bandes transversales subsinueuses et presque couligues. Long.: 2.8, lat.: 1.3 mm. Kilimandjaro.²⁶⁾ 136. **Trachys (s. str.) montana** Kerr.
- 299 (298) Espèces plus ou moins subalongées; tête plus ou moins large, sillonnée. Marge latéropostérieure des élytres inerme.
- 300 (305) Taille subparallèle, élytres ornés de trois bandes transversales et flexueuses.
- 301 (302) Tête très large, aussi large que les trois quarts de la largeur basale du prothorax. D'un bronzé noir nu peu violacé. Surface couverte d'une pilosité subégale, régulière bandes transversales vagues et peu distinctes, nullement condensées, pilosité des espaces intermédiaires des élytres semblable, mais obscure, peu perceptible. Long.: 2.5, lat.: 1.4 mm. Transvaal. 137. **Trachys (s. str.) Junodi** n. sp.
- 302 (301) Tête moins large.
- 303 (304) Tête plus petite, plus enfoncée dans le prothorax, yeux plus grands et plus saillants. D'un noir à peine bronzé, taille beaucoup plus large, plus acuminée postérieurement. Pilosité du dessus moins régulière, plus longue, plus éparse. Prothorax plus large, atténué en avant en ligne arquée. Long.: 2.4, lat.: 1.5 mm. Zoulouland. 138. **Trachys (s. str.) Litha** n. sp.

²⁶⁾ J'ai vu le type de cette espèce!

- 304 (303) Tête plus large et plus grande, plus avancée, yeux plus aplanis. D'un bronzé verdâtre obscur, taille beaucoup plus allongée, plus parallèle, plus étroite. Pilosité du dessus d'une nuance plus dorée, très régulière, plus courte, plus dense. Prothorax moins large, atténué en avant en ligne oblique droite. Long.: 2.2—2.7, lat.: 1.5—1.6 mm. Congo belge. **139. Trachys (s. str.) Dabraxa n. sp.**
- 305 (300) Taille plus ovale. D'un bronzé cuivreux légèrement violacé et obscur, assez luisant, à pilosité de dessus assez dense et assez longue; pubescence élytrale subégale, formant dans la partie apicale des élytres deux bandes superposées un peu obliques, assez larges et un peu condensées, l'autre surface à pilosité jaune d'une nuance plus foncée. Prothorax large, atténué en avant en ligne courbée. Long.: 2.8, lat.: 1.8 mm. Natal. Zouloulund. Afrique mér. occ. Cape de Bonne-Espérance. **140. Trachys (s. str.) Daghma n. sp.**
- 306 (297) Marge antérieure du prothorax échancrée en ligne faiblement, mais dont bien distinctement bisinuée, à lobe médian antérieur plus ou moins développé.
- 307 (320) Pilosité de dessus plus dense, fascies transversales des élytres étant composées de pubescence plus condensée que celle des autres espaces intermédiaires des élytres et, parfois, un peu hérissées. Dessous d'un bronzé assez clair.
- 308 (309) Surface bicolore — tête et prothorax bronzés, élytres noirs, brillants, couverts d'une pubescence vaguement disposée suivant une croix de Saint-André commune aux deux élytres. Calus huméral des élytres très saillant. Tête large, pronotum obliquement et faiblement arqué sur les côtés. Long.: 2.7, lat.: 1.3 mm. Congo belge.²⁷⁾ **141. Trachys (s. str.) Lameerei Kerr.**
- 309 (308) Coloration de toute la surface concolore. Fascies élytrales normales.
- 310 (319) Espèces de taille plus grande (Long.: 2.4—2.8 mm). Marge postérieure du prothorax distinctement et très étroitement relevée en carène fine et légère.
- 311 (314) Taille plus cunéiforme, moins ovale; ligne dorsale des élytres, vue en, profil, droite. Angles postérieurs du prothorax aigus, un peu saillants et abaissés sur les élytres.
- 312 (313) D'un cuivreux bronzé assez luisant. Pilosité élytrale plus dense, condensée postérieurement en deux bandes transversales obliques. Long.: 2.8, lat.: 1.8 mm. Afrique mér. Voir: **140. Trachys (s. str.) Daghma n. sp.**
- 313 (312) Bronzé un peu brunâtre, élytres ornés de trois bandes flexueuses et transversales. Pilosité de dessus moins dense. Tête large, courte, à peine déprimée antérieurement, prothorax très large, à bord postérieur légèrement, étroitement, mais très distinctement élevé en carène, fortement atténué en avant en ligne légèrement arquée; élytres subcunéiformes, atténués en arrière en ligne légèrement arquée, d'une ponctuation fine, subéfacée, légèrement coriacés, assez étroitement arrondis postérieurement. Long.: 2.5, lat.: 1.3 mm. Congo belge. **141. Trachys (s. str.) Coryphaea n. sp.**

²⁷⁾ J'ai vu le type de cette espèce!

- 314 (311) Taille plus convexe, ovalaire, plus courte. Bords oculofrontaux arrondis.
- 315 (318) Tête très large, angle basal du prothorax de part et d'autre un peu abaissé sur les élytres, prolongé et aigu. Bord postérieur étroit du prothorax relevé.
- 316 (317) Taille plus large. Tête plus courte et moins large, lobe antérieur médian du prothorax moins distinct, lobe médian postérieur (préscutellaire) plus grand, plus prolongé. Pubescence du dessus d'un jaune pâle, espaces entre les bandes élytrales à pilosité légèrement brunâtre. Elytres $1\frac{1}{2}$ fois plus longs que larges, plus largement arrondis postérieurement. Long.: 2.6, lat.: 1.4 mm. Cape de Bonne-Espérance. 142. **Trachys (s. str.) Zarogha n. sp.**
- 317 (316) Taille plus étroite. Tête un peu plus avancée, relativement plus large, lobe antérieur du prothorax beaucoup plus distinct, lobe postérieur (préscutellaire) moins, avancé, moins grand, plus faiblement développé. Pubescence du dessus d'un jaune ocré, espaces entre les bandes élytrales à pilosité semblable, à peine plus obscure. Elytres un peu plus longs, plus étroitement, en courbure plus allongée arrondis postérieurement. Long.: 2.5, lat.: 1.4 mm. Africa or.: Katona. 142. **Trachys (s. str.) antistes n. sp.**
- 318 (315) Tête moins large, normale, angle latéropostérieur court, à peine prolongé postérieurement. D'un bronzé assez obscur et luisant, pubescence élytrale jaune, simple, condensée en trois larges et assez vagues bandes transversales, peu flexueuses. Tête assez grande, vue de dessus subplane, prothorax environ trois fois aussi large que long, atténué assez fortement latéralement en avant en ligne légèrement arquée, au bord postérieur très étroitement et légèrement élevé, au lobe médian antérieur bien distinct, au lobe médian basal assez peu développé, élytres atténués en arrière depuis la base, environ $1\frac{1}{2}$ fois plus longs que larges, assez étroitement arrondis au sommet, à pubescence fine et pas trop dense, assez longue. Long.: 2.4, lat.: 1.4 mm. Cape de Bonne-Espérance, Pondoland. Kenya Colony, Usambara. 143. **Trachys (s. str.) Scyrrhaea n. sp.**
- 319 (310) Espèce minuscule, d'un bronzé brun obscur. Base du prothorax à peine relevée en carène. Tête assez petite, yeux situé obliquement, front légèrement déprimé, bord oculofrontal arrondi. Pubescence de dessus assez longue, fine, mais éparse et très irrégulière, d'un jaune pâle, formant de vagues, peu distinctes bandes transversales sur les élytres. Prothorax fortement bisiné antérieurement, au lobe médian très distinct, lobe postérieur préscutellaire peu développé; prothorax environ $2\frac{2}{3}$ fois plus large que long, au bord latéraux atténués en avant en ligne presque droite. Elytres $1\frac{1}{2}$ fois plus longs que larges, atténués en arrière depuis le milieu, subparallèles antérieurement, étroitement arrondis au sommet. Long.: 1.7, lat.: 1.1 mm. Gambia. 144. **Trachys (s. str.) Gambiana n. sp.**
- 320 (307) Pilosité du dessus plus éparse, bandes transversales seules étant plus distinctes, espace compris entre elles plus ou moins glabre

- ou couvert d'une pilosité beaucoup plus indistincte et plus obscure.²⁸⁾
- 321 (326) Tête vue de dessus, très peu excavée ou impressionnée antérieurement, à peu près plane. Taille petite et courte, élytres plus acuminés et atténués en arrière déjà presque de la base.
- 322 (323) Marges latérales du prothorax étroitement relevée, fortement atténuées en avant en ligne presque oblique. Marge antérieure du prothorax beaucoup plus profondément échancrée; bord postérieur du prothorax très distinctement relevé en carène. D'un bronzé brun un peu cuivreux sur les côtés du prothorax. Écusson assez grand. Pubescence du dessus éparsée et assez obscure, d'un jaune brunâtre, fine, assez longue. Long.: 2.4, lat.: 1.1 mm. Congo belge. 145. *Trachys* (s. str.) *delectabilis* n. sp.
- 323 (322) D'un bronzé doré assez clair. Marges latérales du prothorax normales, nullement relevées en carène. Marge antérieure du prothorax plus faiblement échancrée. Écusson ponctiforme. Pilosité du dessus plus longue, et plus claire.
- 324 (325) Taille plus robuste. Côtés du prothorax atténués en avant en ligne plus arquée. Front et épistome beaucoup plus larges. D'un bronzé plus cuivreux. Lobe préscutellaire, basal du prothorax plus développé, plus avancé. Pubescence de la partie basale du prothorax roussâtre. Élytres plus longs, plus cunéiformes, espaces entre les bandes et partie antérieure des élytres à pilosité un peu roussâtre. Long.: 3, lat.: 1.7 mm. Natal. 146. *Trachys* (s. str.) *Simba* n. sp.
- 325 (324) Taille moins robuste, côtés du prothorax atténués en avant en ligne presque droite. Front et épistome plus étroits. D'un bronzé plus verdâtre et plus obscur. Lobe préscutellaire, basal, du prothorax beaucoup plus petit, moins avancé. Pubescence de dessus sub-uniforme, sans traces de poils roussâtres; élytres plus courts, plus ovalaires, espaces entre les bandes élytrales, qui sont très vagues, à pilosité semblable un peu moins dense. Long.: 2.1, lat.: 1.1 mm. Usambara. 147. *Trachys* (s. str.) *Proculeia* n. sp.
- 326 (321) Tête, vue de dessus, fortement excavée et impressionnée au milieu. Élytres assez longs. Taille suballongée.
- 327 (328) Marges latéraux du prothorax étroitement relevés et aplanis antérieurement. Partie latéroantérieure thoracale subdéprimée. Pubescence de dessus éparsée et assez longue. Tête simplement excavée, sans ligne médiane impressionnée distincte; bords oculofrontaux subcarénés. Marge antérieure du prothorax échancrée en arc large et très profond, presque simple, marge basale très distinctement, mais très étroitement relevée, côtés atténués en avant en ligne assez fortement arquée. Élytres peu convexes, subparallèles jusqu' au milieu, atténués en ligne arquée jusque vers le sommet, où ils sont assez étroitement et conjointement arrondis, à ponctuation irrégulière, médiocre, distincte. D'un bronzé obscur un peu verdâtre, pilosité d'un jaune gris pâle. Long.: 2.5, lat.: 1.4 mm. Africa or.: Katona. 148. *Trachys* (s. str.) *luxuriosa* n. sp.

²⁸⁾ Voir, de même, les 143. *Tr.* (s. str.) *Scyrrhaea* n. sp. et 144. *Tr.* (s. str.) *Gambiana* n. sp., qui précèdent.

- 328 (327) Marges latérales du prothorax non relevées, normales. Pubescence du dessus plus dense. Tête excavée plus ou moins fortement, mais toujours avec une ligne médiane impressionnée au milieu.
- 329 (330) Plus grand, plus robuste, élytres environ $1\frac{1}{2}$ fois plus longs que larges, marge antérieure du prothorax plus fortement échancrée en arc presque simple; prothorax plus court, plus que trois fois aussi large que long. Pilosité de dessus plus dense, mais un peu plus courte. Epistome plus long.²⁹⁾ Tête grande, assez avancée, prothorax assez faiblement atténué en avant en ligne presque droite. D'un bronzé brunâtre presque noir, pubescence élytrale d'un jaune assez profond, formant trois vagues bandes un peu flexueuses sur les élytres. Long.: 2,5, lat.: 1,5 mm. Congo belge.
149. **Trachys (s. str.) saga** n. sp.
- 339 (329) Plus petit, plus grêle, plus allongé, élytres $1\frac{2}{3}$ fois plus longs que larges, marge antérieure du prothorax beaucoup plus faiblement échancrée en ligne très nettement bisinuée. Prothorax plus long, à peine trois fois plus large que long. Pilosité du dessus plus espacée et plus longue. Noirâtre, un peu bronzé. Épaules assez élevées, pilosité élytrale formant deux bandes préapicales flexueuses d'un jaune grisâtre. Long.: 2,3, lat.: 1,2 mm. Afrique or. anglaise.³⁰⁾
150. **Trachys (s. str.) tavetana** Obenb.
- 331 (246) Saillie prosternale aux côtés subparallèles, droits, en général un peu plus large que chez les espèces précédentes, à peine dilatée postérieurement.
- 332 (337) Tarses et palpes d'une noir profond ou d'un ocré brunâtre presque noir et très obscur.
- 333 (334) Angle latéropostérieur des hanches postérieures arrondi au bout. D'un bronzé clair et assez luisant. Surface couverte dans la majeure partie d'une pilosité jaune, seulement avec deux bandes transversales assez vagues, faibles et blanchâtres. Long.: 2,8, lat.: 1,5 mm. Afrique or. anglaise.
151. **Trachys (s. str.) ramisina** Obenb.
- 334 (333) Angle latéro postérieur des hanches postérieures aigu ou subaigu. Prothorax régulièrement convexe. Surface convexe, plus courte, plus ovale, plus acuminée.
- 335 (336) Marge antérieure du prothorax profondément échancrée en arc simple. Tête fortement sillonnée au milieu; violacé à reflet bleuâtre. Pilosité dessus éparse. Partie supérieure du front glabre. Epistome assez étroit. Ovale, prothorax très régulièrement convexe, atténué en avant en ligne presque droite, marge basale très étroitement et légèrement relevée, lobe antéscutellaire peu avancé, peu développé. Élytres à ponctuation suboblitérée, $1\frac{1}{2}$ fois plus longs que larges, subparallèles au tiers basal, atténués en arrière en ligne très régulièrement arquée, assez étroitement arrondis au sommet. Pubescence de dessus éparse et vague. Long.: 2,4, lat.: 1,4 mm. Lourenço Marques.
152. **Trachys (s. str.) Laurencii** n. sp.

²⁹⁾ Voir aussi les 157. *Tr. (s. str.) novicia* n. sp. et 158. *Tr. (s. str.) Bolivari* Obenb., qui est surtout bien semblable, mais à marge antérieure du prothorax à l'échancrure beaucoup plus fortement bisinuée.

³⁰⁾ J'ai vu le type de cette espèce!

- 336 (335) Marge antérieure du prothorax fortement bisinuée, à lobe médian très distinct. Tête sillonnée profondément, faiblement pubescente. D'un bronzé verdâtre obscur. Pilosité de la surface dense, assez longue et assez régulière. Marge basale du prothorax assez fortement relevée; prothorax large, couvert de mailles fines et rondes, assez faiblement atténué en avant en ligne oblique, légèrement arquée. Élytres assez robustes, à peine $1\frac{1}{2}$ fois plus longs que larges, atténués depuis la base, assez largement arrondis au sommet. Long.: 2.7, lat.: 1.4 mm. Ile San Thomé.
- 153. *Trachys (s. str.) resupinans* n. sp.
- 337 (332) Tarse et palpes d'un roux ou jaune ocré très clair.
- 338 (345) Angles latéropostérieurs des hanches postérieures arrondis au bout.
- 339 (340) D'un cuivreux plus clair. Espèce grande. Pubescence des élytres composée de poils plus brunâtres entremêlés avec trois lignes flexueuses transversales, composées de poils dorés. Long.: 3.2, lat.: 1.8 mm. Afrique orientale anglaise.³¹⁾
- 154. *Trachys (s. str.) purpurea* Kerr.
- 340 (339) D'un bronzé plus obscur. Pubescence élytrale plus éparse, jaune, marge antérieure du prothorax fortement échancrée en arc simple.
- 341 (342) Tête très large. épistome très large. Marge antérieure du prothorax plus largement échancrée. D'un bronzé brun assez obscur. Taille allongée, élytres parallèles jusque' au milieu, puis atténués en ligne longue et courbée vers le sommet, qui est assez étroitement arrondi. Prothorax très large et court, un peu moins large que les élytres, assez faiblement atténué en avant en ligne subarquée, légèrement déprimée le long de la base. Élytres à pilosité assez régulière, formant trois bandes élytrales flexueuses et transverses. Ponctuation élytrale irrégulière, superficielle et assez forte. Long.: 2.4, lat.: 1.4 mm. Cape de Bonne-Espérance.
- 155. *Trachys (s. str.) penaria* n. sp.
- 342 (341) Tête moins large. Epistome moins que deux fois aussi large que long (au milieu). Prothorax légèrement déprimé latéralement.
- 343 (344) Bronzé verdâtre doré. Prothorax plus court. Pilosité du dessus plus longue, plus éparse. Prothorax plus fortement atténué en avant en ligne très légèrement arquée, couvert de mailles arrondies; base thoracale légèrement relevée le long du lobe préscutellaire, normale latéralement. Élytres à ponctuation fine, peu dense, suboblitérée; épaules assez saillantes. Long.: 2.2, lat.: 1.2 mm. Africa or.: Katona.
- 156. *Trachys (s. str.) patrona* n. sp.
- 344 (343) D'un bronzé violacé obscur. Pubescence élytrale plus courte, plus dense; prothorax plus large, moins fortement atténué latéralement. Bandes transversales élytrales très vagues, formées de pilosité éparse. Espaces obscures, à l'apparence plus lisse, couverts d'une pilosité fine et éparse, noirâtre et peu perceptible. Tête grande et assez avancée, marge antérieure du prothorax échancrée en arc simple. Ponctuation élytrale grossière, mais irrégulière et très superficielle. Long.: , lat.: 1 mm. Congo belge.
- 157. *Trachys (s. str.) Novicia* n. sp.

³¹⁾ J'ai vu le type de cette espèce!

- 345 (338) Angles latéropostérieurs des hanches postérieures aigus au bout.
- 346 (351) Marge antérieure du prothorax échancrée en ligne fortement bisinuée, avec un lobe antérieur très distinct.
- 347 (348) Tête très large. Lobe médian antérieur de l'échancrure antérieure du prothorax très large. Marge latérale du prothorax finement relevée en gouttière, atténuée en avant en ligne droite. D'un bronzé verdâtre obscure et assez luisant. Long.: 2.9, lat.: 1.5 mm. Biafra Bay (Afrique occidentale). 158. **Trachys (s. str.) Bolivari** Obenb.
- 348 (347) Tête moins large. Marge latérale du prothorax simple, nullement relevée en gouttière.
- 349 (350) Marge latérale du prothorax légèrement défléchie. Tête plus longue, moins large, beaucoup plus fortement excavée. Angles antérieurs du prothorax beaucoup plus allongés et plus aigus. Pubescence jaune des élytres distincte partout, même à l'apex. Taille allongée, ovale, peu convexe, élytres relativement longs. D'un bronzé brun assez clair et luisant. Prothorax un peu moins large que les élytres, atténué en avant en ligne droite et oblique. Pilosité jaune des élytres formant trois vagues, peu denses bandes transversales, dont les espaces intermédiaires sont couverts d'une pubescence semblable, de la même densité et finesse, mais un peu plus brunâtre ou roussâtre. Long.: 2.7, lat.: 1.3 mm. Congo belge. 159. **Trachys (s. str.) Ecloga** n. sp.
- 350 (349) Marge latérale du prothorax normale; non défléchie. Tête plus courte et plus large, faiblement excavée. Angles antérieurs du prothorax plus courts, moins avancés, pubescence de l'apex élytral obscure, roussâtre, formant une espèce de macule apicale, nettement séparée en ligne légèrement arquée de la bande transversale préapicale. D'un bronzé cuivreux luisant, en ovale allongé, subcuinéiforme; de taille peu convexe. Tête assez large, thorax très large, fortement atténué en avant en ligne légèrement arquée, à marge postérieure légèrement relevée postérieurement, ponctation élytrale fine, éparse, régulière, superficielle. Long.: 2.7, lat.: 1.5 mm. Congo belge. 160. **Trachys (s. str.) novella** n. sp.
- 351 (346) Marge antérieure du prothorax échancrée en arc simple et plus ou moins profond.
- 352 (355) Tête plus fortement échancrée en avant ou excavée; pubescence élytrale plus longue, moins dense, plus claire. Taille moins convexe.
- 353 (354) Taille plus allongée. D'un bronzé verdâtre assez clair, à ponctuation élytrale assez fine et éparse, subsériale, distincte. Tête plus grande et plus avancée. Prothorax à l'échancrure antérieure plus large et moins profonde. Élytres beaucoup plus allongés, plus parallèles, moins convexes. Long.: 2.6, lat.: 1.3 mm. Congo belge. 161. **Trachys (s. str.) Proagora** n. sp.
- 354 (353) Taille plus robuste, plus courte, plus ovale. D'un bronzé obscur, presque noir sur les élytres. Ponctuation élytrale grossière et éparse, mais superficielle, surface élytrale à l'apparence plus inégale. Prothorax à l'échancrure antérieure moins large, plus profonde, tête plus enfoncée dans le prothorax. Élytres plus courts,

- moins parallèles, plus convexes. Long.: 2, lat.: 1.1 mm. Zouloul-land. 162. **Trachys (s. str.) Nanubis** n. sp.
- 355 (352) Tête plus large, pubescence du dessus plus courte, taille plus convexe.
- 356 (357) Plus allongé, plus étroit. Epistome plus large, échancrure antérieure du prothorax plus étroite. Ovalaire, assez épais, bronzé obscur. Élytres à calus huméral peu saillant. Long.: 3, lat.: 1.7 mm. Afrique or. anglaise.³²⁾ 163. **Trachys (s. str.) differens** Kerr.
- 357 (356) Espèce plus robuste, à l'épistome moins large, échancrure antérieure du prothorax très large. D'un bronzé, un peu cuivreux sur les élytres, prothorax très large, atténué en avant en ligne oblique et droite, à marge basale étroitement relevée en carène. Élytres $1\frac{3}{5}$ fois plus longs que larges, presque subparallèles dans la moitié antérieure, à ponctuation médiocre et distincte. Pilosité élytrale dorée, peu dense, formant des bandes transversales, dont les espaces intermédiaires sont couverts d'une pubescence semblable grise et obscure, peu visible. Long.: 2.5, lat.: 1.4 mm. Congo belge. 164. **Trachys (s. str.) Armilla** n. sp.
- 358 (105, 223) Élytres à pilosité rousse ou d'un testacé roux, parfois brunâtre
- 359 (360, 365) Pubescence du dessus uniforme ou subuniforme. Ovalaire assez épais, les côtés un peu obliques et atténués vers le sommet, bronzé brillant; assez lisse; pilosité rousse de dessus rare, agglomérée vers le sommet. Dessous noir. Tête large, à peine excavée, pronotum relativement haut, les côtés très obliquement atténués en ligne droite, la base onduleuse avec un large lobe médian arqué. Élytres à ponctuation épaisse, le calus huméral assez saillant, mais non caréné, le sommet à peine relevé et obliquement déclive ensuite. Long.: 2.5, lat.: 1.5 mm. Afrique or. anglaise. (Ex Kerr.) 165. **Trachys (s. str.) erratica** Kerr.
- 360 (359, 365) Pubescence rousse élytrale formant des bandes transversales distinctes.
- 361 (362) Taille plus parallèle. Epistome assez large. Pilosité de dessus brunâtre. Ovalaire, assez épais, d'un bronzé obscur. Tête largement et peu profondément excavée. Long.: 3, lat.: 1.7 mm. Afrique or. anglaise. Voir: 163. **Trachys (s. str.) differens** Kerr.
- 362 (361) Taille ovalaire. Pilosité de dessus d'un roux orangé et clair, longue, assez dense, fine, agglomérée sur les élytres en bandes transversales. Tête grande et très large, prothorax très largement échancré en ligne légèrement bisinuée, atténué en avant en ligne, droite, à marge basale légèrement relevée. Élytres convexes, ovalaires, allongés, à ponctuation forte, mais irrégulière, superficielle. Saillie prosternale parallèle, assez large, palpes et tarses d'un testacé clair. Angle latéropostérieur des hanches postérieures aigu. D'un bronzé violacé-cuivreux, assez luisant en dessus, noir en dessous. Long.: 3, lat.: 1.6 mm. Usambara. 164. **Trachys (s. str.) Usambarae** n. sp.

³²⁾ J'ai vu le type de cette espèce!

365 (360, 359) Élytres à ornementation spéciale: le tiers supérieur des élytres garni d'une vestiture d'un roux doré, remontant le long de la suture jusque vers le tiers antérieur. Ovalaire, convexe, atténué à l'extrémité, tête et pronotum d'un noir légèrement bronzé et couverts de poils espacés et dorés; élytres d'un noir violacé à reflets pourprés. Dessous noir brillant avec reflets violacés. Tête peu excavée, nettement sillonnée, la marge des yeux légèrement relevée. Pronotum à marge antérieure très largement, mais peu profondément échancrée en arc; les côtés obliques et à peine arqués. Long.: 3, lat.: 1.5 mm. Ogowé. (Ex Kerr.)

..... 165. **Trachys (s. str.) fluviatilis** Kerr.

366 (98) Élytres à pilosité bicolore ou tricolore: blanche, jaune, rousse ou noire; cette dernière très distincte.

367 (484) Pilosité du dessus bicolore.

368 (473) Pilosité élytrale d'un blanc, combiné avec un jaune clair ou brunâtre ou bien d'un blanc et roux profond.

369 (438) Élytres à pilosité blanche, combinée avec pubescence d'un jaune clair ou brunâtre.

370 (399) Saillie prosternale plus large, soit parallèle, entre les hanches, soit subsinuée latéralement, mais dans ce cas dernier l'espace antérieur entre les deux fines lignes, bordantes cette saillie est à peu près le même que dans la partie apicale.

371 (380) Angle latéropostérieur des hanches postérieures arrondi.

372 (377) Tarses (et le plus souvent, de même, les palpes) d'un noir intense ou d'un brun ocré très obscur, à peu près noir.

373 (376) Surface d'un cuivreux clair ou légèrement violacée.

374 (375) D'un bronzé cuivreux, surface couverte dans sa majeure partie de pubescence blanche, seulement avec quelques poils dorés entremêlés. Saillie prosternale plus large, deux fois aussi longue que large; stries latérales parallèles. Pilosité de dessus plus longue. Saillie prosternale de mâle avec une granule allongée au milieu. Long.: 3, lat.: 1.5 mm. Afrique or. anglaise.³³⁾

..... 166. **Trachys (s. str.) Jeanneli** Kerr.

375 (374) D'un bronzé clair. Surface couverte dans sa majeure partie de pubescence jaune, seulement avec quelques petites macules de poils blanchâtres. Saillie prosternale plus étroite, presque trois fois plus longue que large; stries latérales plus convergeantes. Long.: 2.8, lat.: 1.5 mm. Afrique or. anglaise.

..... 167. **Trachys (s. str.) ramisina** Obenb.

376 (373) D'un bronzé assez obscur. Taille assez robuste, ovalaire. Tête large, anguleusement et assez largement déprimée au milieu, yeux obliques, peu visibles de dessus. Corselet profondément et largement, à peu près simplement, échancré en avant, atténué en avant en ligne arquée, largement et transversalement déprimé le long de la base, à marge basale relevée. Élytres un peu plus que 1½ fois plus longs que larges, subparallèles dans la moitié basale, arrondis largement vers le sommet. Toute la surface est couverte d'une pilosité

³³⁾ J'ai vu le type de cette espèce!

- longue, grise, irrégulière, d'où émerge, çà et là, une pubescence jaunâtre. Saillie prosternale large, subparallèle. Long.: 2.4, lat.: 1.4 mm. Congo belge. 168. **Trachys (s. str.) Nautica n. sp.**
- 377 (372) Tarses et palpes d'un jaune ocré ou d'un roux clair.
- 378 (379) Plus grand, marge antérieure du prothorax échancrée en arc moins large, mais plus profond et bisinué, au lobe médian distinct. Tête moins large, yeux plus plans. Pubescence du dessus très distincte et longue. Prothorax beaucoup plus large. D'un bronzé obscur, pubescence prédominante élytrale grise, avec les espaces entre les bandes à pilosité jaunâtre plus obscure. Marge extrême basale du prothorax relevée en carène. Taille robuste, élytres $1\frac{1}{2}$ fois plus longs que larges, à ponctuation irrégulière et assez fine, subparallèles dans la partie basale, arrondis largement au sommet. Dessous bronzé luisant, saillie prosternale large et parallèle. Long.: 3.1, lat.: 1.9 mm. Afrique méridionale occ.: Gaub. 169. **Trachys (s. str.) Nomas n. sp.**
- 379 (378) Espèce plus petite; marge antérieure du prothorax échancrée en arc large et simple, moins profond. Tête très large, yeux plus convexes. D'un bronzé assez clair, allongé, ovalaire, peu convexe. Tête largement déprimée. Prothorax relativement assez long. Élytres allongés, assez étroitement et conjointement arrondis au sommet, à convexité assez légère; pilosité élytrale fine, pubescence prédominante brunâtre, avec trois vagues bandes argentées transversales; très fine régulière et assez éparse. Saillie prosternale large et parallèle. Long.: 2, lat.: 1 mm. Congo belge. 170. **Trachys (s. str.) contexta n. sp.**
- 380 (371) Angle latéropostérieur des hanches postérieures aigu. Saillie prosternale large, environ deux fois plus long que large. Tête, vue de dessus déprimée, à contour sinueux.
- 381 (390) Palpes et tarses roux ou d'un jaune ocré.
- 382 (385) Surface luisante, d'un cuivreux violacé ou violacé clair pourpré, élytres rarement avec macules violacées plus obscures.
- 383 (384) Plus grand. Prothorax plus atténué en avant. Tête très large, faiblement excavée. Marge antérieure du prothorax plus faiblement échancrée en arc distinctement bisinué. Surface plus convexe et plus acuminée postérieurement. Pubescence élytrale prédominante blanche. Ovalaire, allongé, d'un bronzé cuivreux et luisant. Élytres plus que $1\frac{1}{2}$ fois plus longs que larges, parallèles jusqu'au milieu, puis atténués en courbe régulière, couverts d'une pubescence éparse et fine jaunâtre, avec trois bandes légèrement flexueuses de pilosité semblable argentée, transversales. Tête et prothorax à pubescence dorée, fine et éparse. Long.: 2.7, lat.: 1.2 mm. Mashonaland. 171. **Trachys (s. str.) Armacone n. sp.**
- 384 (383) Beaucoup plus petit, plus étroit. Tête moins large. Prothorax atténué en avant en ligne plus arquée; tête moins large, fortement et largement excavée. Epistome beaucoup plus étroit. Marge antérieure du prothorax fortement échancrée en arc presque simple. Surface assez déprimée, taille assez étroite, subparallèle. Pubescence

de dessus jaune, avec trois vagues et larges bandes transversales et argentées sur les élytres. D'un cuivreux rouge un peu violacé dans la base des élytres. Long.: 1.7, lat.: 0.95 mm. Tanganyika.

..... 172. **Trachys (s. str.) ruralis** n. sp.

385 (382) Surface bronzée ou noirâtre, jamais pourprée ou violacée.

386 (387) Espèce assez grande. D'un bronzé assez clair, pubescence de dessus plus dense et plus longue, blanche, avec les ornés de quelques traces de bandes d'un jaune brunâtre. Marge antérieure du prothorax échancrée plus profondément et moins distinctement bisinuée. Prothorax atténué en avant en ligne plus droite. Saillie prosternale légèrement subdilaté au bout, atténuée en avant en ligne droite. Espèce luisante, allongée, assez faiblement convexe. Long.: 2.8, lat.: 1.5 mm. Afrique or. anglaise.

..... 173. **Trachys (s. str.) confusula** Obenb.

387 (386) Espèces plus petites, d'un noir intense ou d'un bronzé violacé noirâtre et luisant. Au moins les parties latérales des élytres à pubescence courte ou peu apparente, éparses, parfois à l'apparence blabre. Saillie prosternale subparallèle, légèrement dilatée postérieurement.

388 (389) D'un noir un peu violacé; plupart des élytres glabre, à pilosité rare, très fine et courte, brunâtre, avec deux vagues bandes onduleuses élytrales blanches. Marge antérieure du prothorax moins profondément échancrée en arc très distinctement bisinué. Prothorax atténué en avant en ligne plus arrondie. Tête déprimée en avant. Ovalaire, peu convexe. Long.: 2.7, lat.: 1.3 mm. Congo belge.³⁴⁾

..... 174. **Trachys (s. str.) Bequaerti** Kerr.

389 (388) D'un noir bronzé très légèrement violacé, allongé, subparallèle, peu convexe. Tête large, largement et profondément creusée au milieu, yeux obliques. Prothorax large et court, atténué en avant en ligne presque droite, échancré antérieurement en arc très large et profond, simple, sans lobe médian distinct. Surface luisante. Tête et prothorax à pubescence rare et fine, jaune, prothorax marqué d'une macule blanche semblable avant l'écusson. Élytres parallèles jusque derrière le milieu, puis arrondis en arc assez court vers le sommet, couverts d'une pubescence fine et rare brunâtre, régulière, plus rousse vers la suture, ornés de trois vagues bandes de pilosité semblable, argentée, légèrement onduleuses et transversales. Long.: 2.3, lat.: 1.4 mm. Congo belge.

..... 175. **Trachys (s. str.) Phanerogaea** n. sp.

390 (381) Tarses et palpes d'un noir profond ou d'un brun ocré très foncé presque noir.

391 (394) Surface d'un bronzé plus ou moins clair. Marge antérieure du pronotum à l'échancrure forte. Élytres subparallèles jusqu' au milieu. Yeux peu visibles de dessus.

392 (393) D'un bronzé assez clair, un peu doré, couvert d'une pubescence blanche un peu jaunâtre. En ovale allongé. Tête large, peu profondément, mais largement échancrée. Marge antérieure du prothorax échancrée en arc légèrement bisinueux, au lobe médian antérieur

³⁴⁾ J'ai vu le type de cette espèce!

- très large et peu distinct. Lobe médian basal du prothorax peu avancé. Long.: 2.9, lat.: 1.4 mm. Congo belge.
- 176. **Trachys (s. str.) confusissima** Obenb.
- 393 (392) D'un bronzé très obscur et luisant, couvert de pubescence jaune, avec, sur les élytres, trois bandes étroites et flexueuses blanches. Tête assez grande, assez large. Taille en ovale assez acuminé postérieurement. Front largement excavé. Prothorax large, aux angles postérieurs droits; atténué en avant en ligne oblique et droite, aux angles antérieurs aigus. Élytres luisant assez longs, couverts d'un ponctuations assez faible, alignée en vagues lignes un peu obliques. Pilosité du dessus rare et fine. Saillie prosternale parallèle, subarrondie postérieurement. Long.: 2.4, lat.: 1.2 mm. Natal.
- 177. **Trachys (s. str.) Xenonyma** n. sp.
- 394 (391) Surface d'un pourpre cuivreux ou pourpre un peu violacé et luisant. Tarses d'un brun obscur. Tête courte et assez plane, yeux arrondis. Lobe basal médian du prothorax assez fortement avancé. Saillie prosternale subparallèle. Marge antérieure du prothorax faiblement échancrée, largement et faiblement bisinueuse. Élytres plus acuminés postérieurement, convexes, atténués vers le sommet depuis le calus huméral. Angle latéropostérieur des hanches postérieures subobtus.
- 395 (398) Pilosité prédominante élytrale blanche, formant des bandes flexueuses transversales argentées avec les parties intermédiaires d'un brun ou roux obscur. Bord postérieur du prothorax un peu relevé en carène. Prothorax atténué en avant en ligne oblique presque droite.
- 396 (397) Taille plus courte. Bandes blanches formées de pubescence beaucoup plus condensée, fine et distinctement plus courte. Tête beaucoup plus large. Ponctuation élytrale plus forte, disposée vaguement en lignes longitudinales subobliques. Long.: 2.4, lat.: 1.4 mm. Mashonaland.
- 178. **Trachys (s. str.) Maxapha** n. sp.
- 397 (396) Taille plus allongée. Bandes blanches formées de pilosité semblable à celle de l'autre surface, fine, mais assez longue, éparse. Tête moins large. Ponctuation élytrale moins forte, vague, irrégulière. Long.: 2.6, lat.: 1.3 mm. Inhambane.
- 179. **Trachys (s. str.) agitosa** n. sp.
- 398 (395) D'un pourpre rouge doré plus clair. Bandes élytrales transverses jaunâtres, pilosité de dessus en général plus dorée. Tête large. Élytres longs, assez étroits, très régulièrement convexes, à ponctuation fine, éparse et irrégulière. Prothorax assez long, atténué en avant en ligne oblique, presque droite et faible. Long.: 2.5, lat.: 1.4 mm. Rhodésie.
- 180. **Trachys (s. str.) Xithris** n. sp.
- 399 (370) Saillie prosternale plus étroite, en général plus petite, stries latérales de cette saillie subétranglées au milieu ou beaucoup plus fortement atténués en avant, l'apex de cette saillie plus fortement dilaté au sommet.
- 400 (429) Angle latéropostérieur des hanches postérieures aigu au sommet.
- 401 (418) Tarses et palpes noirs ou d'un brun ocré très obscur, presque noir.
- 402 (403) Tête très large, plane, vue de dessus. Marge antérieure du prothorax très largement et très profondément échancrée en arc bisiné.

Taille plus allongée. Prothorax moins fortement atténué en avant. Élytres parallèles jusque derrière le milieu. Marge postérieure du prothorax étroitement et nettement relevée en carène; prothorax faiblement atténué en avant, couvert, ainsi que la tête. De mailles rondes et très distinctes partout. Pubescence élytrale jaune avec trois vagues bandes flexueuses et transversales argentées, assez dense, longue et fine. Ponctuation élytrale fine et irrégulière, assez dense. D'un bronzé assez clair. Long.: 2.1, lat.: 1.3 mm. Afrique or. anglaise: Katona. **181. *Trachys* (s. str.) *erogata* n. sp.**

403 (402) Tête normale, moins large, plus ou moins impressionnée. Taille plus acuminée, moins parallèle.

404 (413) Palpes et tarses d'un noir intense.

405 (408) Dessous d'un bronzé clair et luisant. Pilosité de la tête et du prothorax grise.

406 (407) Plus robuste. D'un bronzé cuivreux plus obscur. Tête plus avancée, à peine excavée antérieurement. Marge antérieure du prothorax plus nettement et bisinueusement échancrée. Pubescence de dessus beaucoup plus dense, assez longue, fine, celle des élytres roussâtre, avec trois vagues bandes flexueuses argentées et transversales. Surface beaucoup plus convexe, prothorax atténué en avant en ligne distinctement arquée. Long.: 2.5, lat.: 1.2 mm. Congo belge: Cap Plate. **182. *Trachys* (s. str.) *Tiburtia* n. sp.**

407 (406) Moins robuste, plus étroit, allongé, à pubescence de dessus moins dense et moins régulière. D'un bronzé doré et très luisant, à ponctuation élytrale fine et assez dense, irrégulière. Tête plus courte, légèrement subdéprimée au milieu. Marge antérieure du prothorax échancrée profondément et en arc presque simple. Pubescence élytrale roussâtre; trois vagues bandes flexueuses et blanches sur les élytres. Prothorax obliquement atténué en avant en ligne presque droite. Long.: 2.2, lat.: 1.2 mm. Congo belge.

..... **183. *Trachys* (s. str.) *Rita* n. sp.**

408 (405) Dessous d'un noir à peine bronzé.

409 (410) Bord oculofrontal des yeux subcaréniforme, yeux presque invisibles de dessus. Marge antérieure du prothorax largement échancrée en arc simple et profond. Tête largement excavée antérieurement. D'un noir luisant, un peu bronzé sur la tête et prothorax, couvert d'une fine, dense, régulière pilosité dorée, d'où émergent, sur les élytres, trois fascies semblables, peu denses, vagues, transversales, onduleuses, argentées. Prothorax obliquement atténué en avant en ligne droite. Élytres $1\frac{3}{5}$ fois plus longs que larges, subparallèles jusqu'au milieu, au sommet assez étroitement arrondi. Long.: 2, lat.: 1.1 mm. Zoulouländ.

..... **184. *Trachys* (s. str.) *Zethmaea* n. sp.**

410 (409) Bord oculofrontal subarrondi, yeux visibles de dessus. Marge antérieure du prothorax échancré en arc moins profond, plus ou moins bisiné au fond. Tête à peine excavée. Pilosité prédominante du dessus grise, condensée sur les élytres en trois vagues fascies transversales et flexueuses, avec les parties intermédiaires de la surface élytrale couvertes de pilosité brunâtre. Front relativement étroit, en trapèze.

- 411 (412) Front en trapèze distinctement plus large que long. Marge antérieure du prothorax échancrée en ligne plus distinctement bisinuée. Sculpture aréolée du prothorax subsquamuliforme. Ponctuation élytrale grossière, mais très oblitérée. D'un bronzé noirâtre en dessus. Long.: 2.5, lat.: 1.3 mm. Transvaal. 185. **Trachys (s. str.) Mariaxis n. sp.**
- 412 (411) Front à peine plus large que long. Marge antérieure du prothorax échancrure en arc presque simple. Sculpture aréolée du prothorax simple. Ponctuation élytrale fine et superficielle, subeffacée et assez dense. Tête et prothorax d'un bronzé légèrement cuivreux, élytres d'un bronzé un peu plus violacé. Long.: 2.6, lat.: 1.6 mm. Congo belge. 186. **Trachys (s. str.) Gasurra n. sp.**
- 413 (404) Palpes et tarses d'un brun noirâtre, très obscur.
- 414 (415) Espèce plus grande. Pilosité de dessus pour la majeure partie jaune. Marge antérieure du prothorax peu échancrée et distinctement bisinuée. Allongé, assez convexe, brillant, à pubescence fine et dense, assez irrégulière, jaune en dessus, cette pilosité formant quelques lignes onduleuses sur les élytres, les parties avoisinantes plus glabres. Tête très large. Long.: 2.5, lat.: 1.5 mm. Afrique or. anglaise. 187. **Trachys (s. str.) Kikuyina Obenb.**
- 415 (414) Espèces plus petites. La majeure partie de la surface est couverte de pilosité grise, fine, assez espacée et régulière, formant sur les élytres des bandes transversales et onduleuses, vagues, nullement à pubescence condensée, dont les espaces intermédiaires sont couverts de pilosité brune. Prothorax atténué en avant en ligne presque droite.
- 416 (417) Espèce petite. Tête plus courte, plus petite, plus large. Prothorax échancré en avant en ligne nettement bisinuée. Taille plus allongée, plus acuminée postérieurement. Ponctuation élytrale plus forte, mais très oblitérée. Long.: 1.7, lat.: 1.1 mm. Pondoland. 188. **Trachys (s. str.) Iphitheia n. sp.**
- 417 (416) Espèce plus grande. Tête grande, plus avancée, moins large, marge antérieure du prothorax plus profondément échancrée en avant en ligne simplement arquée. Taille plus robuste, plus arrondie postérieurement, ponctuation élytrale fine, oblitérée. Long.: 2.2, lat.: 1.3 mm. Rhodésie. 189. **Trachys (s. str.) Theochaera n. sp.**
- 418 (401) Tarses et palpes d'un jaune ocré ou roux très clair.
- 419 (424) Assez peu convexe. Tête assez profondément déprimée, marges intérieures des yeux légèrement subcarénés. Fémurs postérieurs assez longs, dépassant les hanches postérieures.
- 429 (421) Surface noirâtre, à peine bronzée. Tête excavée profondément. Prothorax large, à l'échancrure antérieure simple et large, assez fortement atténué en avant en ligne arquée; marge basale légèrement relevée. Élytres assez longs, atténués depuis la base, avec trois vagues bandes flexueuses argentées et étroites, composées de pubescence fine et assez dense, régulière, à peine condensée, avec quelques macules d'un jaune doré, aux espaces entre cette ornementation couverts d'une nette pubescence noire. Long.: 2.5, lat.: 1.5 mm. Africa or.: Amani. 190. **Trachys (s. str.) Tiburtia n. sp.**

- 421 (429) Surface cuivreuse ou bronzée, sans trace de pubescence foncière noire.
- 422 (423) Espèce plus grande, plus large, plus ovalaire. D'un cuivreux clair et luisant. Prothorax beaucoup plus large, échancré en avant plus largement et en ligne légèrement bisinuée. Pubescence de la tête et du prothorax moins dense et plus irrégulière. Prothorax plus fortement atténué en avant, aux angles postérieurs subaigus. Élytres $1\frac{1}{2}$ fois plus longs que larges, avec trois bandes blanches transversales, et avec une pilosité vague, d'un jaune grise entre elles. Long.: 2.7, lat.: 1.5 mm. Mashonaland.
- 191. **Trachys (s. str.) Pharaxis n. sp.**
- 423 (422) D'un bronzé brun plus obscur, allongé, luisant, peu convexe. Marge antérieure du prothorax très profondément échancrée en arc simple. Prothorax moins large, plus faiblement atténué en avant, aux angles postérieurs droits. Élytres $1\frac{1}{2}$ fois plus longs que larges, avec trois vagues bandes transversales grises; partie intermédiaire à pilosité vague jaunâtre. Long.: 2.2, lat.: 1.1 mm. Congo belge: Bondo (Dr. Baum).
- 192. **Trachys (s. str.) Phaedaena n. sp.**
- 424 (419) Espèces petites. Marge intérieure des yeux subarrondie. Fémurs postérieurs courts, en dépassant pas latéralement les hanches postérieures.
- 425 (426) D'un noir profond et luisant subparallèle, peu convexe, allongé peu atténué, élytres parallèles jusque derrière le milieu. Pilosité de dessus très éparsée et très fine, peu distincte, pubescence prédominante jaune brunâtre avec quelques bandes transversales sur les élytres très peu distinctes et grisâtres. Tête large, excavée au milieu, marge antérieure du prothorax à l'échancrure profonde et large, simple. Élytres environ $1\frac{2}{3}$ fois plus longs que larges. Long.: 2.2, lat.: 1.1 mm. Congo belge.
- 193. **Trachys (s. str.) pulex n. sp.**
- 426 (425) D'un bronzé plus ou moins clair. Taille plus convexe, plus acuminée.
- 427 (428) Epistome presque aussi long que large, petit. Cavités antennaires très grandes. Saillie prosternale plus étroite. Marge antérieure du prothorax faiblement échancrée en ligne distinctement bisinuée. Tête et prothorax bronzés, élytres d'un cuivreux pourpre un peu plus obscur. Long.: 2, lat.: 0.9 mm. Afrique or. anglaise.³⁵⁾
- 194. **Trachys (s. str.) riparia Kerr.**
- 428 (427) Epistome court et transversal. Cavités antennaires médiocres. Saillie prosternale plus large. Marge antérieure du prothorax plus profondément échancrée en arc presque simple. D'un bronzé assez clair et luisant, allongé, peu convexe. Tête très large, excavée au milieu, prothorax très large, au bord postérieur légèrement relevé, atténué en avant en ligne légèrement arquée. Élytres environ $1\frac{2}{3}$ fois plus longs que larges, atténués depuis la base, couverts, comme la tête et prothorax, d'abondante pubescence fine, assez dense, assez longue, régulière, grise, formant sur les élytres des vagues bandes transversales et onduleuses, dont les espaces intermédiaires sont couverts de pubescence semblable, mais brunâtre. Élytres à punctua-

³⁵⁾ J'ai vu le type de cette espèce!

tion fine, irrégulière. Long.: 2.5, lat.: 1.3 mm. Haute Uélé.

..... 195. **Trachys (s. str.) blandula** n. sp.

- 429 (400) Angle latéropostérieur des hanches postérieures arrondi au sommet.
430 (433) Tarses et palpes d'un noir profond ou bien d'un brun ocré très obscur, presque noir.

- 431 (432) Plus grand, plus large, tête largement et peu profondément excavée. Prothorax très largement et assez profondément échancré antérieurement en arc presque simple, aux angles antérieurs aigus. D'un noir un peu bronzé, élytres avec trois vagues bandes transversales grises, peu onduleuses, prothorax et tête à pilosité semblable, espaces entre les bandes élytrales étant couverts d'une pilosité très fine et peu perceptible, grise brunâtre. Élytres subparallèles jusqu' au milieu, sans ponctuation plus distincte. Dessous noir, saillie prosternale étroite, atténuée en avant en ligne droite. Long.: 2.4, lat.: 1.4 mm. Congo belge.

..... 196. **Trachys (s. str.) matrona** n. sp.

- 432 (431) Plus petit, plus ovalaire, plus convexe, tête à peine déprimée antérieurement. Prothorax à marge antérieure échancrée moins profondément et en arc distinctement bisinué, aux angles antérieurs subarrondis. D'un bronzé assez obscur et luisant, élytres à pubescence régulière, mais beaucoup plus rare et avec les bandes transversales argentées, vagues et moins distinctes, les espaces entre elles sont couverts de pubescence semblable brunâtre. Ponctuation élytrale fine, irrégulière, assez dense, mais suboblitérée. Dessous d'un bronzé obscur, saillie prosternale subétranglée au milieu et très atténuée en avant. Long.: 2.1, lat.: 1.2 mm. Mashonaland.

..... 197. **Trachys (s. str.) Dabaltha** n. sp.

- 433 (430) Tarses et palpes d'un jaune ou roux très clair.
434 (435) Marge antérieure du prothorax fortement échancrée en arc simple. Tête très profondément excavée antérieurement. D'un noir bronzé, un peu violacé, à pubescence de dessus dense, jaunâtre par places sur la tête et le prothorax, formant sur les élytres trois vagues bandes transversales grises, avec quelques macules (et une ligne étroite le long de la suture) d'un jaune clair et avec quelques espaces à l'apparence glabre, couverts en réalité d'une pubescence peu visible noire. Marge basale du prothorax légèrement relevée. Long.: 2.5, lat.: 1.7 mm. Congo belge.

..... 198. **Trachys (s. str.) spectatrix** n. sp.

- 435 (434) Marge antérieure du prothorax échancrée en arc bisinué. Tête vue de dessus, subplane.
436 (437) D'un bronzé doré clair et luisant; épistome beaucoup plus large. Un point enfocé au-dessus de chaque cavité antennaire. Tête très large. Prothorax très large, atténué en avant en ligne légèrement arquée, convexe, marge basale étroitement élevée en carène. Élytres longs et convexes, à pilosité d'un gris un peu jaunâtre, formant trois vagues bandes transversales un peu condensées, parties intermédiaires étant à pubescence d'un jaune brunâtre. Dessous bronzé, saillie prosternale assez étroite, atténué en avant en ligne droite. Long.: 2.8, lat.: 1.8 mm. Natal.

..... 199. **Trachys (s. str.) erudita** n. sp.

- 437 (436) D'un bronzé noirâtre. Plus trapu. Épistome beaucoup plus petit et plus étroit, cavités antennaires simples. Prothorax convexe, aux côtés atténués en ligne presque droite; marge basale étroitement relevée en carène. Élytres convexes, à pilosité blanche vague et assez éparse, formant trois vagues bandes transversales et onduleuses, avec les espaces intermédiaires couverts de pubescence jaunâtre. Pilo-
sité en général vague et assez irrégulière et très fine. Yeux placés très obliquement. Dessous d'un bronzé obscur, saillie prosternale élargie au sommet et fortement atténuée en avant en ligne droite. Long.: 2.4, lat.: 1.3 mm. Congo belge.
..... 200. **Trachys (s. str.) sternax** n. sp.
- 438 (369) Élytres à pubescence d'un blanc argenté combiné avec roux plus ou moins profond ou clair,³⁶⁾ pilosité rousse couvrant les plus sou-
vent le fond, blanche formant le dessin.
- 439 (440) Espèce très grande. Pubescence rousse de la base élytrale parfois un peu hérissée. Tête très large, largement déprimée en avant, pro-
thorax très large, à l'échancrure antérieure très profonde, en arc simple; tête et prothorax à pubescence rousse, avec quelques macu-
les blanches; élytres très convexes et très robustes, à pubescence générale obscure, presque invisible, avec trois très étroites bandes argentées et très flexueuses, bordés antérieurement étroitement de
pubescence rousse, qui fait encore quelques macules isolées, le fond étant couvert de pubescence obscure mentionnée ci-dessus. Saillie
prosternale étroite, atténuée en avant en ligne droite. Palpes et tarses d'un roux testacé clair. Long.: 4.4, lat.: 2.5 mm. Natal.³⁷⁾
..... 201. **Trachys (s. str.) Gilli** n. sp.
- 440 (439) Espèces plus petites, à pubescence toujours simple, même dans la
partie basale des élytres.
- 441 (442) Élytres subcarénés dans la partie humérale. D'un violacé cuivreux,
tête déprimée antérieurement; prothorax sur les côtés et vers la
marge basale subdéprimé, aux angles antérieurs saillants, quatre
fois plus large que long, abruptement atténué en avant, à l'échan-
crure antérieure large. Élytres deux fois plus longs que larges, atté-
nués depuis les épaules au sommet étroitement arrondi, peu con-
vexes, à pilosité rousse vers les côtés, avec un vague dessin argenté
de bandes transversales. Dessous d'un bronzé cuivreux. Long.: 3,
lat.: 1.75 mm. Gariep. (Ex Fahreus.)
..... 202. **Trachys (s. str.) puberula** Fahr.
- 442 (441) Élytres simples, moins que deux fois plus longs que larges.
- 443 (444) Espèce grande, noire, luisante, à pilosité assez dense, mais très fine,
noirâtres un fond, avec macules rousses, avec trois bandes fle-
xueuses et très étroites argentées sur les élytres. Angle latéroposté-
rieur des hanches postérieures arrondi; partie supérieure de la tête
très luisante, glabre. Tête très large, fortement excavée antérieure-
ment. Ovalaire, assez convexe, d'un noir brillant. Long.: 3.5, lat.:
1.7 mm. Congo belge.³⁸⁾ 203. **Trachys (s. str.) lembana** Kerr.

³⁶⁾ Voir aussi les: 226. *Tr. (s. str.) fidens* Kerr. et 242. *Tr. (s. str.) juvenilis* Kerr.³⁷⁾ Voir aussi le 34. *Tr. (s. str.) crassata* n. sp.³⁸⁾ J'ai vu le type de cette espèce!

- 444 (443) Partie antérieure de la tête normale, pubescente, ou bien toute la tête est entièrement lisse et glabre.
- 445 (446) Tête en tièrement lisse et glabre. Angle latéropostérieur des hanches postérieures arrondi. Tête fortement excavée antérieurement. Prothorax à marge antérieure échancrée en arc profond. Saillie prosternale dilatée au sommet, fortement et brusquement atténuée en avant. Palpes roux, tarsi noirâtres. D'un noir profond et luisant, pilosité élytrale noire avec trois fascies onduleuses blanches, avec quelques poils roux entremêlés dans partie scutellaire et suturale. Long.: 3.3, lat.: 2 mm. Rhodésie, Limpopo, Congo belge. Voir: 64. **Trachys (s. str.) coracina** Fahr.
- 446 (445) Tête à pubescence distincte.
- 447 (466) Saillie prosternale subparallèle entre les hanches, plus ou moins dilatée postérieurement. Palpes et très souvent, de même, les tarsi d'un jaune ou roux clair.
- 448 (455) Angle latéropostérieur des hanches postérieures subaigu.
- 449 (450) Plus déprimé, moins convexe, plus luisant. Tête étroite, fortement excavée. Marge antérieure du prothorax à l'échancrure plus faible, plus étroite, simple. D'un noir un peu violacé, à pilosité prédominante brune, assez obscure, dense, très courte et très fine; bandes flexueuses blanches élytrales assez apparentes. Surface luisante. Long.: 2.8, lat.: 1.5 mm. Fernando Poo. 204. **Trachys (s. str.) Isabellae** Obenb.
- 450 (449) Plus ovale, plus convexe. Tête grande, peu excavée ou bien plane antérieurement. Marge antérieure du prothorax à l'échancrure plus forte et plus large.
- 451 (454) Plus grand, moins luisant, d'un cuivreux violacé plus ou moins clair. Pilosité de dessus rousse, avec un dessin argenté. Tête à peine excavé en avant. Marge antérieure du prothorax échancrée en arc large et simple.
- 452 (453) Taille plus allongée. Prothorax moins large, moins court, atténué en avant en ligne légèrement arquée, tête beaucoup plus large, élytres couverts d'une pubescence obscure, noiâtre, assez longue et vague, avec fascies et macules diverses, peu nombreuses rousses et avec trois bandes flexueuses argentées, transversales. Élytres beaucoup plus allongés, plus étroits et plus acuminés. Long.: 2.5, lat.: 1.3 mm. Rhodésie. 205. **Trachys (s. str.) sebakwensis** n. sp.
- 453 (452) Taille plus large, plus courte, plus ovale. Prothorax beaucoup, plus court, atténué en avant en ligne droite et oblique, tête moins large. Élytres à pubescence semblable, mais pilosité obscure peu apparente, pubescence grise plus riche. Élytres plus larges, plus ovalaires, moins acuminées. Long.: 2.5, lat.: 1.5 mm. Transvaal. 206. **Trachys (s. str.) plausibilis** n. sp.
- 454 (451) Espèce petite, d'un bronzé cuivreux assez obscur et très luisant. Pilosité de dessus dorée russe, sur les élytres avec trois vagues bandes argentées semblables, mais vagues, sans pubescence noire. Tête faiblement, mais distinctement excavée en avant; marge antérieure du prothorax très distinctement, quoique légèrement bisinueuse-

ment, profondément échancrée. Prothorax fortement atténué en avant en ligne légèrement arquée. Élytres assez longs, subparallèles dans la moitié antérieure, assez largement arrondis au sommet, à ponctuation dense, assez forte, mais irrégulière. Long.: 2.5, lat.: 1.3 mm. Somalie. 207. **Trachys (s. str.) giubbana n. sp.**

455 (448) Angle latéropostérieur des hanches postérieures plus ou moins subarrondi.

456 (459) Marge antérieure du prothorax très fortement échancrée en arc profond et simple.

457 (458) D'un noir à peine bronzé. Tête très grande et très large. Surface très densément couverte d'une pilosité assez, longue, rousse, avec fascies transversales, blanches, étroites et très flexueuses, sur les élytres, qui sont plus convexes, étroits, plus étroitement atténués et arrondis au sommet. Côtés du prothorax fortement et obliquement atténués en avant. Long.: 2.8, lat.: 1.8 mm. Fernando Poo.

..... 208. **Trachys (s. str.) Lucia n. sp.**
458 (457) D'un violacé obscur et luisant, aux reflets bleuâtres. Tête moins grande moins large, pilosité du dessus plus rare, régulière, plus fine. Surface moins convexe, fascies transversales élytrales moins flexueuses, vagues et grises. Élytres plus courts, plus parallèles antérieurement, avec les épaules plus élevées, plus largement arrondis au sommet. Côtés du prothorax atténués en avant en ligne arquée. Long.: 2.6, lat.: 1.6 mm. Natal.

..... 209. **Trachys (s. str.) Xauaria n. sp.**
459 (456) Marge antérieure du prothorax échancrée en arc nettement bisinué, avec un lobe médian antérieur plus ou moins développé.

460 (463) D'un bronzé luisant un peu violacé ou bien d'un noir légèrement violacé en dessus.

461 (462) Élytres $2\frac{1}{4}$ fois plus longs que la tête et le prothorax réunis. Tête beaucoup plus large, prothorax atténué en avant, en ligne droite, distinctement un peu plus étroit que les élytres. D'un bronzé luisant, un peu violacé sur les élytres. Tête et prothorax couverts d'une pubescence pâle, élytres à pubescence jaune claire, avec fascies flexueuses et transversales blanches plus denses et bien distinctes. Pilosité élytrale assez longue, tête et prothorax à pubescence grise. Tête largement et peu profondément échancrée. Long.: 2.3, lat.: 1.1 mm. Erythrée.

..... 210. **Trachys (s. str.) Erythraea n. sp.**
462 (461) Élytres trois fois plus longs que la tête et le prothorax réunis, plus larges, moins convexes, subparallèles jusqu' au milieu. D'un noir légèrement violacé, très luisant, pubescence de dessus rousse, fine, courte et éparse, mais très régulière, avec, sur les élytres, seulement quelques traces de vagues et étroites bandes transversales argentées. Tête plus profondément excavée, large, prothorax très court, atténué en ligne légèrement arquée en avant. Long.: 2.8, lat.: 1.8 mm. Zouloulund.

..... 211. **Trachys (s. str.) Pharamis n. sp.**
463 (460) D'un noir bleuâtre en dessus ou bien d'un bronzé plus ou moins obscur, toujours plus obscur, d'un violacé noirâtre, sur les élytres.

Élytres à pubescence courte, pubescence rousse étant limitée aux côtés antérieurs des élytres ou à la partie scutellaire et suturale, parties à l'apparence glabre étant couvertes d'une pilosité très courte, noire, très peu perceptible. Marges latérales du prothorax plus défléchies. Tête profondément excavée en avant.

- 464 (465) D'un noir un peu bleuâtre. Plus grand, plus robuste, tête plus large, marge antérieure du prothorax plus largement excavée, en arc, très distinctement bisinuée, tête et prothorax couverts d'une pilosité courte, éparse et fine, rousse, obscure. Angles antérieurs du prothorax beaucoup plus avancés et plus aigus. Élytres ayant la plus grande largeur au milieu, où ils sont subdilates, couverts d'une pubescence noire très fine, éparse, d'où émergent fascies blanches, qui sont vagues et étroites, pubescence rousse étant limitée à la région suturale et à la région posthumérale latérale. Marge basale du prothorax un peu relevée. Dessous d'un bronzé un peu violacé; saillie prosternale parallèle et large, palpes jaunes. Long.: 2.9, lat.: 1.8 mm. Congo belge.

212. *Trachys* (s. str.) *clathrifera* n. sp.

- 465 (464) D'un bronzé violacé ou d'un noir violacé un peu obscur. Plus petit, plus cunéiforme, tête plus étroite, marge antérieure du pronotum plus étroitement excavée en arc presque simple, tête et prothorax couverts d'une pilosité plus longue; angles antérieurs du prothorax moins avancés. Élytres ayant la plus grande largeur à la base. Long.: 2.8, lat.: 1.5 mm. Fernando Poo. Voir:

204. *Trachys* (s. str.) *Isabellae* Obenb.

- 466 (447) Prosternum à saillie médiane subétranglée entre les hanches, ou fortement atténuée en avant. Marge antérieure du prothorax largement et profondément échancrée en arc simple, sans lobe médian antérieur distinct.

- 467 (468) Palpes et tarses d'un noir profond et luisant. Tête très large, à peine excavée. Taille plus courte, plus ovale, plus convexe. Prothorax échancré en arc moins large, plus profond. Front beaucoup plus étroit, épistome étroit, cavités antennaires rapprochées. En ovale assez court et large, assez convexe. D'un bronzé brunâtre et assez obscur, luisant. Prothorax atténué assez faiblement en avant en ligne très légèrement arquée, au bord postérieur étroitement relevé. Élytres environ $1\frac{3}{5}$ fois plus longs que larges, parallèles dans la moitié antérieure, atténués en ligne arquée vers le sommet, où ils sont assez étroitement arrondis, ornés de trois bandes flexueuses, larges et fines, composées de poils épars, fins et argentés; parties intermédiaires étant couvertes de pubescence brunâtre semblable et de la même densité. Angle latéropostérieur des hanches postérieures subaigu. Long.: 2.4, lat.: 1.3 mm. Afrique méridionale occidentale. 213. *Trachys* (s. str.) *meridiana* n. sp.

- 468 (467) Tarses et palpes roux ou au moins d'un brun obscur (chez *Tr. ukerewensis* m.). Tête large, plus ou moins fortement excavée. Taille moins convexe. Épistome plus large, cavités antennaires moins rapprochées.

469 (472) D'un bronzé noirâtre ou très obscur. Tête plus profondément déprimée au milieu. Angle latéropostérieur des hanches postérieures arrondi au sommet. Élytres subparallèles antérieurement.

470 (471) Taille ovale, allongée. Tête très large. D'un bronzé brun obscur et assez luisant. Plus parallèle. Marge antérieure du prothorax beaucoup plus largement échancrée; côtés du prothorax, qui est moins court atténués plus faiblement en avant. Élytres $1\frac{2}{3}$ fois plus longs que larges; pilosité générale, qui forme, de même, trois larges et vagues bandes transversales sur les élytres, est d'un jaune pâle, espaces entre les bandes étant couverts de pilosité d'un brun gris; pubescence superficielle assez longue et assez dense. Épistome relativement très large. Pilosité de la tête et du prothorax assez dense, irrégulière. Long.: 2.4, lat.: 1.4 mm. Transvaal.....

.....214. *Trachys* (s. str.) *boera* n. sp.

471 (470) Taille robuste, plus courte, plus large. Tête moins large, plus profondément excavée en avant, épistome beaucoup plus étroit. D'un noir violacé, très luisant. Pubescence de dessus fine, courte, éparse; trois bandes flexueuses et très étroites blanches sur les élytres, trois bandes très étroites longitudinales sur le prothorax, qui est beaucoup plus court et très large, plus fortement atténué en avant en ligne arquée; les bandes sont bordées de pilosité fine et rousse, parties entre les fascies sont à peu près glabres. Élytres environ $1\frac{1}{2}$ fois plus longs que larges, largement arrondis au sommet. Long.: 2.7, lat.: 1.7 mm. Natal.

.....215. *Trachys* (s. str.) *Daphnaea* n. sp.

472 (469) D'un cuivreux pourpré en dessus, les espaces entre les bandes transversales élytrales étant plus foncés. Tête légèrement déprimée au milieu, très large. Angle lateropostérieur des hanches postérieures aigu. Pubescence générale fine et assez dense, d'un roux doré, avec trois bandes très flexueuses, argentées sur les élytres. Épistome très large. Taille allongée, élytres atténués déjà depuis la base, environ $1\frac{2}{3}$ fois plus longs que larges. Prothorax très largement échancré en avant en arc presque régulier, atténué latéralement en avant en ligne droite et oblique, un peu plus étroit que la base des élytres. Élytres à l'apparence bicolore, partie suturale et le fond des fascies étant clair, les espaces intermédiaires beaucoup plus obscurs. Long.: 2.8, lat.: 1.7 mm. Ukerewe.....

.....216. *Trachys* (s. str.) *Ukerewensis* n. sp.

473 (368) Pilosité élytrale d'un jaune combiné avec roux profond ou bien d'un noir ou gris très distinct, combiné avec jaune ou roux.

474 (481) Élytres à pilosité d'un jaune, combiné avec un roux plus ou moins clair.

475 (476) Palpes et pattes d'un noir profond. Taille ovale, un peu allongée.

Angle latéropostérieur des hanches postérieures aigu. Ovale, d'un bronzé cuivreux clair et luisant, uniforme, avec trois fascies transversales jaunes, flexueuses sur les élytres, dont les intervalles sont couverts d'une pilosité rousse. Tête large, légèrement déprimée au milieu, épistome large. Prothorax régulièrement convexe, à l'échancrure antérieure profonde, simple et large, atténué en avant

- en ligne oblique. Élytres un peu plus larges que le prothorax, régulièrement convexes, environ $1\frac{1}{2}$ fois plus longs que larges, à ponctuation irrégulière, assez forte, peu dense, avec entremêlés points microscopiques et distincts. Long.: 2.8, lat.: 1.8 mm. Angola. 217. **Trachys (s. str.) Lakshmi n. sp.**
- 476 (475) Palpes et pattes d'un jaune ocré ou d'un roux clair.
- 477 (480) Angle latéropostérieur des hanches postérieures aigu.
- 478 (479) Marge antérieure du prothorax largement échancrée en arc simple. D'un pourpre doré éclatant, très luisant. Ovalaire, allongé. Tête très large, légèrement déprimée. Epistome assez étroit. Élytres $1\frac{1}{2}$ fois plus longs que larges, subparallèles jusqu' au milieu, finement et éparsément ponctués; pilosité de dessus dorée, courte, éparsée, formant trois vagues bandes flexueuses et transversales sur les élytres, parties intermédiaires à pubescence éparsée, fine, rousse. Long.: 2.1—1.8, lat.: 1.1—1.4 mm. Zouloulund. 218. **Trachys (s. str.) Zulukaffra n. sp.**
- 479 (478) Marge antérieure du prothorax échancrée en ligne nettement bisinuée, avec un lobe médian distinct. D'un bronzé un peu verdâtre, assez obscur et luisant. Tête large, légèrement déprimée au milieu, épistome assez large. Prothorax large, élytres assez longs, atténués depuis la base; pubescence de dessus d'un jaune pâle, assez dense, assez longue, formant, sur les élytres, trois bandes transversales et flexueuses assez denses, les intervalles étant couverts de pubescence rousse, plus courte. Long.: 2.2, lat.: 1.1 mm. Afrique méridionale occidentale. 219. **Trachys (s. str.) Marogis n. sp.**
- 480 (477) Angle latéropotérieur des hanches postérieures arrondi au sommet. Marge antérieure du prothorax échancrée en arc simple, sans lobe median distinct. Ovalaire, allongé, d'un bronzé cuivreux obscur, un peu violacé. Tête très large, déprimée longitudinalement au milieu, épistome assez étroit. Prothorax très large, assez faiblement, obliquement atténué en avant en ligne droite, élytres presque $1\frac{2}{3}$ fois plus longs que larges, subparallèles jusqu' au milieu, avec le sommet étroitement arrondi, à sculpture grossière, mais peu dense des points fovéolés, disposées subsériealement. Pubescence de dessus éparsée, finé, longue, rousse, avec trois bandes transversales flexueuses d'un jaune pâle sur les élytres. Long.: 2.8, lat.: 1.5 mm. Natal. 220. **Trachys (s. str.) natalica n. sp.**
- 481 (474) Élytres à pubescence très distincte grise ou noire, combinée avec pilosité jaune ou rousse.
- 482 (483) Saillie prosternale large, deux fois plus longue que large, parallèle, nullement dilatée au sommet. Angle latéropostérieur des hanches postérieures subaigu. Palpes et tarsi d'un roux très clair. Tête plus large, marge antérieure du prothorax plus largement échancrée en arc subbisinué. D'un bronzé luisant cuivreux, élytres d'un bronzé plus violacé. Pubescence élytrale d'un noir gris, avec deux bandes jaunes transversales et flexueuses préapicales et avec une macule subsuturale, placée antérieurement. Long.: 2.7, lat.: 1.4 mm. Afrique orientale portugaise. 221. **Trachys (s. str.) Lena n. sp.**

- 483 (482) Saillie prosternale étroite, trois fois plus longue que large, parallèle antérieurement dilatée vers le sommet. Palpes et tarses noirs ou d'un brun noir très obscur. Tête moins large, marge antérieure du prothorax moins largement échancrée en arc plus profond et simple. D'un bronzé, brun et obscur. Tête et prothorax à pubescence ocrée grisâtre. Fine et longue, éparsée, condensée sur le prothorax en trois lignes longitudinales, formant, sur les élytres, trois assez vagues bandes flexueuses et transversales, parties intermédiaires à pubescence noire ou grisâtre, plus courte, moins apparente. Long.: 2.5, lat.: 1.5 mm. Haute Uélé.
- **222. Trachys (s. str.) Taxilla n. sp.**
- 484 (367) Pilosité de dessus nettement tricolore: Tête et prothorax à pubescence brune ou dorée, parfois entremêlée de poils blancs, élytres noirs, à pubescence foncière noire, avec bandes flexueuses argentées, partie suturale antérieure et scutellaire à pubescence dorée ou jaune faisant une macule suturale plus ou moins développée. Noir en dessous. Palpes et tarses d'un brun obscur ou d'un roux clair.³⁹⁾
- 485 (488) Plus grand. Pilosité de la tête et du prothorax subuniforme, jaune. D'un noir profond. En ovale assez large et robuste. Saillie prosternale large et subparallèle.
- 486 (487) Plus grand, plus large; angle latéropostérieur des hanches postérieures subarrondi. Palpes et tarses d'un brun ocré et obscur. Long.: 3, lat.: 1.9 mm. Transvaal. Mashonaland.
- **223. Trachys (s. str.) Cassiae n. sp.**
- 487 (486) Plus étroit, moins large, angle latéropostérieur des hanches postérieures subaigu. Palpes et tarses d'un jeune roux très clair. Taille plus ovale, ornementation jaune basale scutellaire moins distincte. Long.: 3, lat.: 1.3 mm. Ukerewe.
- **224. Trachys (s. str.) Garua n. sp.**
- 488 (485) Espèce petite. D'un noir bronzé, légèrement violacé. Saillie prosternale plus étroite. Angle latéropostérieur des hanches postérieures arrondi. Tête très large, largement excavée, épistome assez étroit. Prothorax très largement échancré en avant en arc simple, avec les angles antérieurs aigus et avancés. Élytres allongés. Pubescence de dessus très fine, assez courte, mais assez dense; tête et prothorax avec une pubescence rousse brunâtre, avec quelques poils argentés, formant sur le prothorax trois vagues bandes longitudinales. Élytres avec pubescence grise, couvrant toute la surface, avec trois étroites bandes argentées et avec partie antérieure basale et scutellaire à pubescence dorée. Palpes et tarses d'un jaune roux très clair. Long.: 2.2, lat.: 1.2 mm. Ukerewe.
- **225. Trachys (s. str.) Agatha n. sp.**
- 489 (72) Pubescence du corselet et de la tête entièrement différente de celle des élytres.
- 490 (491) Élytres à pilosité d'un roux doré, avec les bandes flexueuses et transversales blanches. Ovale, épais, un peu atténué en arrière, bronzé violacé pourpré brillant en dessus, couvert de vilosité, peu dense; dessous noir brillant. Tête faiblement excavée, le bord des

³⁹⁾ Voir aussi: 494 (503)!

yeux non caréné, les côtés du pronotum à peine arqués, calus huméral épais. Sommet des élytres un peu relevé en bosse et ensuite déclive. Long.: 2.8, lat.: 1.5 mm. Afrique or. anglaise.

..... 226. **Trachys (s. str.) fidens** Kerr.

491 (490) Élytres à pubescence blanche.

492 (493) Élytres très rugueux, inégalement chagrinés; calus huméral très saillant et surmonté d'une carène courte et dirigée obliquement vers la suture. Entièrement noir, brillant, dessous noir. Tête et pronotum à cilliosité d'un roux doré, élytres ornés de bandes sinueuses grises. Tête largement et peu profondément excavée, le bord des yeux relevé. Long.: 3.2, lat.: 1.8 mm. Afrique orientale anglaise.

..... 227. **Trachys (s. str.) occisa** Kerr.

493 (492) Élytres normales, au calus huméral peu saillant.⁴⁰⁾

494 (503) Saillie prosternale large et subparallèle entre les hanches, stries latérales parallèles. D'un noir plus ou moins profond. Dessous noir.

495 (502) Plus robuste, moins luisant, à pubescence plus longue et plus dense. Tête et prothorax à pubescence très dense dorée, élytres avec fines et étroites, flexueuses bandes transversales argentées.

496 (497) Taille plus robuste, pubescence dorée de la partie basale élytrale formant un angle autour de l'écusson. Voir:

..... 223. **Trachys (s. str.) Cassiae** n. sp.

497 (496) Taille moins robuste, pubescence dorée ou rousse de la partie basale des élytres formant une bordure étroite de la suture, distincte jusqu' au milieu.

498 (501) Tête très large, prothorax très profondément échancré en avant en arc simple. Plus robuste, moins allongé. Angle latéropostérieur des hanches postérieures arrondi.

499 (500) Tête très large, prothorax atténué en avant en ligne plus arquée. Élytres sans pubescence jaune le long de la suture antérieurement. Long.: 3, lat.: 1.9 mm. Natal.

..... 228. **Trachys (s. str.) Althasia** n. sp.

500 (499) Tête moins large, prothorax atténué en avant en ligne presque droite. Élytres dans la moitié antérieure, le long de la suture, avec une bordure jaune rousse de pubescence claire. Tête assez profondément excavée. Long.: 3.2, lat.: 2.1 mm. Afrique or. anglaise.

..... 229. **Trachys (s. str.) cheteniensis** Obenb.

501 (498) Tête large, profondément excavée, marge antérieure du prothorax moins profondément échancrée en arc très légèrement bisinué. Plus allongé, moins robuste. Angle latéropostérieur des hanches postérieures aigu. Prothorax arrondi depuis la base au sommet, à pubescence jaune dorée, élytres allongés, parallèles jusqu' au milieu. Coloration générale du *Tr. cheteniensis* m., qui précède. Long.: 2.8, lat.: 1.3 mm. Uganda.

..... 230. **Trachys (s. str.) ugandica** n. sp.

502 (495) Espèce luisante, tête et prothorax d'un noir violacé, à pubescence éparses et très fine jaunâtre, élytres d'un noir bleuâtre, à pubescence éparses et très fine, peu perceptible grise, avec trois bandes vagues transversales argentées, très peu denses. Tête largement excavée,

⁴⁰⁾ Voir aussi: 484 (367)!

prothorax échancré en avant en ligne bisinuée, élytres $1\frac{2}{3}$ fois plus longs que larges, parallèles jusqu' au milieu. Long.: 2.4, lat.: 1.5 mm. Cameroun. 231. **Trachys (s. str.) marineana** Obenb.

- 503 (494) Saillie prosternale fortement étranglée entre les hanches, stries latérales étant parfois peu distinctes.⁴¹⁾

- 504 (513) Angle latéropostérieur des hanches postérieures arrondi au bout. Tarses noirs, lamelles des tarses et palpes brunâtres.

- 505 (506) Espèce petite et plus étroite. D'un noir un peu violacé sur les élytres, un peu plus bronzé sur la tête et prothorax, qui sont couverts de pubescence fine et régulière jaune rousse, avec une vague ligne blanche et longitudinale au milieu du prothorax. Élytres un peu plus larges que le prothorax, $1\frac{1}{2}$ fois plus longs que larges, parallèles jusqu' au milieu, avec une pubescence noirâtre très régulière et très fine, avec trois bandes peu condensées flexueuses argentées, suture élytrale étant, depuis la base jusqu' au milieu, bordée unisérialement de poils roussâtres. Tête largement excavée, épistome assez étroit. Long.: 2.7, lat.: 1.5 mm. Cameroun.

232. **Trachys (s. str.) pulla** n. sp.

- 506 (505) Espèces plus robustes, à pilosité moins fine.

- 507 (508) Bandes élytrales en nombre de deux, préapicales, formées de poils blancs. Surface élytrale luisante, pubescence foncière élytrale noire peu perceptible, visible seulement des côtés. Échancrure épistomale semicirculaire moins large que la moitié de la largeur antérieure du front, dans la hauteur des cavités antennaires. Dessous et pattes noires. Tête et prothorax à pubescence rousse, tête très largement excavée, prothorax à l'échancrure antérieure très large et profonde. Long.: 4, lat.: 2.3 mm. Kilimandjaro, Congo belge, Haute Uélé.⁴²⁾ 233. **Trachys (s. str.) Sjoestedti** Kerr.

- 508 (507) Bandes élytrales formées de poils jaunes ou ocrés. Pilosité noire élytrale très distincte.

- 509 (510) Plus grand, plus robuste. Marge antérieure du prothorax échancrée en avant en ligne plus bisinuée, cette échancrure un peu moins forte. Lobe médian basal du prothorax plus large, plus faiblement avancé. Côtés du prothorax plus fortement atténués en avant en ligne presque droite, les yeux étant situés dans la même ligne. Tête beaucoup plus large, plus faiblement impressionnée au milieu, front beaucoup plus large, plus faiblement atténué en avant. Épistome beaucoup plus large, échancrure épistomale semicirculaire presque aussi large que la moitié de la largeur du front à l'hauteur des cavités antennaires. Tête et pronotum bronzé clair, élytres noirs. Long.: 4.5, lat.: 2 mm. Congo belge.⁴²⁾

234. **Trachys (s. str.) Alberti** Kerr.

- 510 (509) Plus petit, plus étroit. Marge antérieure du prothorax fortement échancrée en arc simple. Lobe médian basal du prothorax moins large et plus fortement avancé. Côtés du prothorax moins fortement atténués en avant en ligne arrondie, les yeux n'étant pas placés dans la même ligne. Tête beaucoup plus étroite, plus fortement

⁴¹⁾ Voir aussi: 104 *Tr. (s. str.) Dummeri* Théry!

⁴²⁾ J'ai vu le type de cette espèce!

⁴²⁾ J'ai vu le type de cette espèce!

impressionnée du milieu, front beaucoup plus étroit, plus fortement atténué en avant, épistome beaucoup moins large, échancrure épistomale beaucoup plus étroite que la moitié de la largeur du front dans la hauteur des cavités antennaires.

- 511 (512) Pubescence noire des élytres condensée dans la base et avant l'apex dans quelques touffes élevées.⁴²⁾ Voir:
 **30. *Trachys* (s. str.) comitessa Kerr.**
- 512 (511) Pubescence élytrale simple, sans traces de touffes. Tête et prothorax bronzés, élytres d'un bronzé noir, plus bronzé sous la pilosité jaune, faisant les fascies. Long.: 3.7, lat.: 2 mm. Bornou Congo belge.⁴³⁾ **235. *Trachys* (s. str.) Schultzei Kerr**
- 513 (504) Plus petit. Taille peu robuste. Angle latéropostérieur des hanches postérieures acuminé en angle aigu. Bandes élytrales formées de poils fins et blancs, parties obscures à pilosité obscure rare et presque invisible. Marge oculofrontale des yeux subcarénée.
- 514 (515) Tête et prothorax à pilosité subuniforme, d'un jaune clair. Partie scutellaire des élytres sans macule de pilosité jaunâtre. Tarses et palpes d'un brun assez obscur. Tête plus large. Côtés latéraux du prothorax moins fortement atténués en avant. Élytres plus allongés, plus parallèles, front plus court, plus fortement atténué en avant. Plus petit. Tête et pronotum d'un bronzé plus clair, élytres d'un noir légèrement violacé. Long.: 2.3, lat.: 1.3 mm. Congo belge.⁴⁴⁾ **236. *Trachys* (s. str.) Folognei Kerr.**
- 515 (514) Tête à pilosité blanche antérieurement, rousse sur le vertex. Prothorax orné d'agglomérations des poils assez éparses, rousses et blanches, poils roux, de même, derrière la marge antérieure, au milieu, et dans les angles basales. Élytres avec une macule subtriangulaire irrégulière scutellaire, avec bandes blanches plus interrompues et plus étroites. Palpes et tarses d'un jaune clair. Tête un peu moins large, côtés du prothorax plus fortement atténués en avant. Élytres beaucoup plus robustes, plus courts, plus arrondis; front plus large, moins fortement atténué en avant. Taille plus grande. Tête et pronotum d'un bronzé très obscur, presque noirs, élytres noirs. Long.: 3, lat.: 1.6 mm. Congo belge.⁴⁵⁾ **237. *Trachys* (s. str.) Schoutedeni Kerr.**
- 516 (71) Tête et pronotum lisses et brillants, légèrement bronzés, élytres d'un noir intense et très brillant. Ecourté, oblong, très convexe, à peine atténué à l'extrémité. Tête creusée entre les yeux et sillonnée dans toute sa longueur. Marge antérieure du prothorax très profondément échancrée en arc, les côtés obliques et à peine arqués. Élytres rugueux, avec de séries longitudinales de gros points irréguliers.

⁴²⁾ J'ai vu le type de cette espèce. Voir aussi le 35. *Tr. (s. str.) subnodosa* Kerr., dont j'ai vu également le type. Cette espèce ressemble beaucoup 31. *Tr. Masoni* Thér., mais elle est un peu plus lisse, (peut être que le type est un peu frotté), plus luisant, avec les épaules plus élevées.

⁴⁴⁾ J'ai vu le type de cette espèce!

⁴⁵⁾ J'ai vu le type de cette espèce!

gouliers et peu profonds, un peu plus larges que le prothorax à la base, à cause du calus huméral, qui est très saillant. Long.: 2.25, lat.: 1 mm. Zanguebar. (Ex Kerr.)

..... 238. **Trachys (s. str.) zanzibarica** Kerr.

*

Species incertae sedis: 239. **Trachys (s. str.) Duvivieri** Kerr.

..... 240. **Trachys (s. str.) senegalensis** Gory.

..... 241. **Trachys (s. str.) torrida** J. Thoms.

..... 242. **Trachys (s. str.) juvenilis** Kerr.
