

151.

*Doc. Dr. Jan Obenberger:*

## REVISION DES ESPÈCES EXOTIQUES DU GENRE TRACHYS FABR. DU CONTINENT AFRICAÏN.

### PŘEHLED EXOTICKÝCH DRUHŮ RODU TRACHYS AFRICKÉ PEVNINY.

#### II a.

Ve Sborníku Entom. Odd. Národního Musea v Praze, 1937, XV, 147, p. 46—101 podal jsem analytický klíč mně známých druhů rodu *Trachys* z africké pevniny. V této práci zařadil jsem velký počet druhů nových a dosud neznámých, používaje při tom metody dichotomické a tabelární. Jako druhý díl této obsáhlé práce podávám zde nyní první část podrobnějších diagnos jednotlivých druhů a současně i katalogisační údaje o druzích ostatních. Toto vše chtěl jsem učiniti již dříve a obě tyto partie vydati současně, avšak rozsah takové práce byl by nutně překročil normální rozměry Sborníku a tak tato podrobnější popisná část vychází o rok později. Většina popisovaných druhů nachází se v typech nebo kotypech v mé sbírce, tvořící součást zoologických sbírek Národního Musea v Praze.

\*

Dans le travail présent je donne les diagnoses plus détaillées des espèces nouvelles du genre *Trachys* du continent Africain, mentionnées et brièvement décrites par moi dans la première partie de cette publication, parue en 1937, comme 147, XV, 1937 du Sborník. Dans la première partie j'ai mentionné et j'ai introduit dans le grand tableau analytique plusieurs espèces nouvelles. Dans cette deuxième partie je donne leurs diagnoses plus détaillées et plus complétées dans l'ordre systématique et j'ajoute les citations respectives des autres espèces, mentionnées dans le tableau dichotomique.

**1. *Trachys* (Sbg. *Habroloma*) *regia* Kerr. Voy. Alluaud et Jaennel,**  
Afr. or. Ins. Col. VI. Bupr. 1914, p. 238.  
Hab.: Kilimandjaro.

**2. *Trachys* (Sbg. *Habroloma*) *aetatula* n. sp. (Obenb. l. c. p. 47.)**

Long.: 3.5, lat.: 2 mm. Hab.: Cap Bonae Spei.

Taille allongée, assez large. Coloration du dessus d'un bronzé obscur. Coloration du dessous bronzée. Pubescence du dessus subuniforme et dense, d'un gris ocré, formant aux élytres une vague bande préapicale condensée et transversale. Tête très large, excavée largement au milieu. Epistome large, profondément échancré. Le front est concave, très large, atténué en avant; partie interoculaire du front est très large, angles oculofrontaux caréniformes. Antennes assez longues. Prothorax environ  $3\frac{1}{2}$  fois plus large que long, ayant sa plus grande largeur dans la base, atténué subsinueusement en avant, au bord antérieur très largement, simplement échancré, à lobe median antérieur nul; postérieurement largement et profondément déprimé transversalement. Sculpture thoracale est composée d'une ponctuation assez irrégulière. Prothorax orné au milieu d'une agglomération fasciforme des poils dressés; cette touffe

est située au milieu du disque, un peu derrière la marge antérieure et elle est d'une couleur claire, ocrée. Calus huméral très accentué. Ecusson invisible. Les élytres sont environ  $1\frac{2}{3}$  fois aussi longs, que larges à la base, environ  $2\frac{1}{2}$  fois aussi longs que la tête et le prothorax réunis, atténués vers l'apex depuis le tiers apical, ayant la plus grande largeur environ dans la base. Marge latéropostérieure des élytres très finement dentelée. Carène humérale des élytres courte, oblique, aigue, disparaissant d'après le tiers basal, formant une légère courbe vers l'intérieur du disque. Apex élytral largement et conjointement arrondi. Ornementation élytrale est composée de quatre touffes élevés des poils dressés, clairs, situés en carré, plus près de la suture que du bord, les antérieurs vers le quart antérieur, les postérieurs un peu après le milieu. Mentonnière distincte, mais très courte. Saillie prosternale relativement étroite, un peu élargie postérieurement. Le dessous luisant et à pubescence ocrée, assez régulière. Angle latéropostérieur des hanches postérieures subarrondi. Pattes noirâtres. Tarses ocrés en dessous.

**3. *Trachys* (Sbg. *Habroloma*) *Thomasseti* Théry, Bull. Soc. Sc. Nat. Maroc, VIII. 1928, p. 190—191, Textfig.**

Hab.: Natal (Weenen). Cape Province: Sommerset East, 10.—22. XII. 1930. (B. E. Turner — British Museum of Nat. History).

**4. *Trachys* (Sbg. *Habroloma*) *Zaghana* n. sp. (Obenb. l. c. p. 48.)**

Long.: 3, lat.: 1.35 mm. Hab.: Natal.

Taille allongée, subdéprimée, subparallèle. Coloration du dessus d'un bronzé violacé très obscur et luisant. Coloration du dessous noirâtre. Pilosité élytrale d'un brun roussâtre; fine, large, vague bande préapicale élytrale d'un gris ocré. Pubescence de dessus fine et assez régulière, subégale. Tête très large, largement et profondément excavée. Epistome large et profondément échancré. Le front est largement excavé, atténué en avant; partie interoculaire du front est très large, angle oculofrontal caréniforme et très aigu. Antennes assez longues, noires. Prothorax environ trois fois plus large que long, ayant sa plus grande largeur environ dans la base, faiblement atténué en avant, au bord antérieur très largement et profondément échancré; à lobe médian antérieur très peu marqué, mais donc bien sensible. Surface du prothorax presque lisse et imponctuée, milieu du prothorax sans trace de touffe médiane. Ecusson invisible. Les élytres sont environ  $1\frac{2}{3}$  fois aussi longs, que larges à la base, environ  $2\frac{1}{3}$  fois aussi longs que la tête et le prothorax réunis, atténués vers l'apex depuis la tiers apical, ayant la plus grande largeur dans la base. Marge latéropostérieure des élytres sans dentelure distincte. Carène humérale des élytres courte, oblique, disparaissant déjà dans le quart antérieur. Calus huméral très élevé. Apex élytral largement et conjointement arrondi. Ornementation élytrale est composée de pubescence roussâtre et d'une bande très large, très peu dense, située dans le tiers postérieur; elle est de coloration ocrée. Les élytres sont ornés de part et d'autre d'une touffe, située comme chez *Tr. Thomasseti* Théry; ces touffes sont de coloration roussâtre. Mentonnière très courte. Saillie prosternale très étranglée au milieu, relativement étroite, largement et brusquement élargie en avant. Angle latéropostérieur des hanches postérieures subarrondi au bout. Tarses noirâtres.

**5. *Trachys* (Sbg. *Habroloma*) *Ennia* n. sp. (Obenb. l. c. p. 48.)**

Long: 2.8, lat.: 1.4 mm. Hab. Africa mer. or.: East London.

Taille assez robuste, convexe, parallèle, allongée. Coloration du dessus d'un noir mat et profond. Coloration du dessous semblable. Prothorax orné d'une touffe médiane, située antérieurement, les élytres aux quatre touffes, comme chez *Tr. Thomasseti* Théry, mais ces faisceaux sont d'un noir profond. Pubescence du dessus d'un roux très clair et uniforme; pubescence formant des bandes transversales. Tête très large, concave, angles oculofrontaux en carène très aigue. Epistome très large, largement échancré. Le front est fortement atténué en avant en ligne oblique; partie interoculaire du front est large, régulièrement et assez densément pubescente. Antennes noires. Yeux presque invisibles du dessus. Prothorax environ  $3\frac{1}{3}$  fois plus large que long, ayant sa plus grande largeur dans la base, subparallèle jusqu'au tiers antérieur, à bord antérieur très largement et presque simplement échancré à lobe médian antérieur presque insensible; largement et profondément déprimé transversalement avant la base. Sculpture thoracale est indistincte sous la pubescence rousse. Ecusson invisible. Les élytres sont environ  $1\frac{2}{3}$  fois aussi longs, que larges à la base, environ  $2\frac{2}{3}$  fois aussi longs que la tête et le prothorax réunis, atténués vers l'apex depuis les  $\frac{2}{5}$  postérieures, ayant la plus grande largeur dans la base. Marge latéropostérieure des élytres sans denticulation apparente. Surface légèrement déprimée. Carène humérale des élytres courte et oblique, disparaissant dans le tiers basal. Apex élytral arrondi. Ornementation élytrale est composée de vagues et ondulées, étroites bandes préapicales et d'une vague, moins distincte bande antemédiane, dont les intervalles sont couverts de pubescence, semblable, mais un peu irrégulière. Mentonnière présente, mais très courte. Saillie prosternale étroite, subparallèle, brusquement s'élargissant antérieurement. Le dessous noir, à pubescence éparsée rousse. Angle latéropostérieur des hanches postérieures subaigu. Pattes noires. Tarses obscurs.

**Observation:** Une des plus remarquables espèces de ce groupe, bien distincte de *Tr. Thomasseti* par la pubescence rousse et claire, par la tête plus large, coloration des touffes du dessus, forme très différente de la tête et du prothorax etc. etc.

#### 6. *Trachys* (Sbg. *Habroloma*) *gratiosissima* n. sp. (Obenb. l. c. p. 48.)

Long.: 3.6, lat.: 1.7 mm. Hab.: Natal.

Taille assez robuste, subparallèle, un peu subdilataée avant le tiers apical des élytres. Coloration du dessus d'un bronzé violacé noirâtre, avec une macule d'un bleu indigo à côté interne des calus huméraux. Coloration du dessous d'un noir bronzé et luisant. Pubescence du dessus brune, assez longue, peu dense, formant des bandes assez vagues. Tête très grande, d'une largeur extra ordinaire, concave. Epistome très large, profondément échancré. Le front est très large, concave, lisse, à pubescence éparsée; partie interoculaire du front est très large, atténuée en avant en ligne oblique. Antennes grêles et noires, assez courtes. Prothorax environ  $3\frac{1}{2}$  fois plus large que long, ayant sa plus grande largeur dans la base, atténué en avant en ligne sinuée, au bord antérieur très largement et simplement échancré, à lobe médian antérieur nul; couvert d'une irrégulière et éparsée pubescence brune, avec une touffe médiane dressée et longue, aigue des poils bruns, largement et profondément déprimé transversalement avant la base. Ecusson invisible. Les élytres sont environ  $1\frac{2}{3}$  fois aussi longs, que larges à la base, environ  $2\frac{1}{2}$  fois aussi longs que la tête et le prothorax réunis, atténués vers l'apex depuis les deux cinquièmes postérieures, ayant ici la plus grande largeur, subdilataés. Marge latéroposté-

rière des élytres très distinctement crénélée. Les élytres sont légèrement subdilatés et faiblement élargis en ligne droite, puis fortement atténués vers le sommet, qui est assez aigu et séparément arrondi. Suture élevée postérieurement. Carène humérale des élytres aiguë, élevée et courte, oblique, légèrement sinuée, distincte jusqu'au tiers basal, puis disparaissante. Partie la plus large des élytres est légèrement bombée transversalement. Ornementation élytrale est composée de deux bandes brunes étroites, faibles et droites, très obliques, dirigées de l'angle scutellaire vers les côtés en angle de 60°, et de deux vagues bandes, légèrement flexueuses préapicales, dont les poils, situés dans la partie suturale, sont blancs. Parie suturale élytrale à peu près glabre. Mentonnière très courte. Saillie prosternale assez large, atténuée en avant et subétranglée, puis brusquement dilatée. Le dessous est à pubescence brune et éparse. Hanches postérieures aux angles latéropostérieurs arrondis. Pattes noires, tarses d'un roux clair.

**Observation:** C'est une des plus jolies et des plus remarquables espèces du genre, qui exagère en un certain degré les caractères des espèces précédentes. Surtout le dichroisme élytral la fait fort intéressante, de même que la forme, extraordinairement large, de la tête, et une série des caractères précités.

7. **Trachys (H.) discreta** Kerr. in Wytsman, Genera Ins. fasc. XII, 1903, p. 312.

Hab.: Cap Bonae Spei.

8. **Trachys (H.) massaica** Kerr. Sjoestedt Kilim. — Meru Exp. 7, Col. 3, Bupr. 1905—06, pg. 29, T. 1, fig. 7.

Hab.: Kilimandjaro.

9. **Trachys (Sbg. Habroloma) monsticornis** n. sp. (Obenb. l. c. p. 49.)

Long.: 3, lat.: 1.7 mm. Hab.: Fernando Poo.

Taille cunéiforme, déprimée en dessus. Taille de *T. r. amica* Kerr. de Malaisie. Coloration du dessus et du dessous noire, luisante. Pubescence du dessus éparse et grise, formant sur les élytres trois vagues bandes transversales. Tête large, luisante, concave, éparsément pubescente. Epistome très large, profondément échancré. Le front est très large et concave, partie interoculaire du front est atténuée en avant en ligne oblique; marge oculo-frontale en carène aiguë et élevée. Antennes courtes, noires, normales, sauf le premier article, qui est prolongé en corne, en forme bizarre; il est bien visible de dessus. Prothorax environ trois fois plus large que long, ayant sa plus grande largeur dans la base, avec les angles postérieurs prolongés, à bord antérieur profondément simplement échancré en arc, à lobe médian antérieur nul, sans dépression prébasale transversale distincte; luisant, éparsément pubescent. Sculpture thoracale est composée d'une ponctuation vague, distincte dans la partie latérale postérieurement et intérieurement, partie médiane étant presque lisse. Prothorax subparallèle dans la partie basilaire, puis subanguleusement, très largement arrondi et très fortement atténuée en avant en ligne droite. Ecusson relativement assez grand et distinct. Les élytres sont environ 1½ fois aussi longs, que larges à la base, environ trois fois aussi longs que la tête et le prothorax réunis, atténués vers l'apex depuis la base, où ils ont de même, la plus



grande largeur, déprimés sur le dos. Marge latéropostérieure des élytres sans denticulation distincte. Carène humérale des élytres longue, entière, aiguë. Apex élytral conjointement arrondi. Ornementation élytrale est composée de trois bandes vagues, grises et droites, transversales, dont la première est située un peu avant le tiers basal, l'autre dans le tiers apical, troisième avant l'apex. Mentonnière distincte. Saillie prosternale très large, plus large que longue, dilatée postérieurement en ligne droite. Angle latéropostérieur des hanches postérieures aigu. Tarses noirs.

**Observation:** On ne connaît actuellement que deux espèces de ce grand genre, qui ont les antennes ainsi conformées, avec ce bizarre et corniforme article basal: c'est l'espèce présente et *Trachys* (*H.*) *cornuta* Kerr. des îles Philippines.

**10. *Trachys* (Sbg. *Habroloma*) *Raffrayi* Théry, Ann. et Bull. Soc. Ent. Belg. LXVII, 1927, p. 43—45, Textfig.**  
Hab.: Abessynie.

**11. *Trachys* (Sbg. *Habroloma*) *accomodata* n. sp. (Obenb. l. c. p. 49.)**

Long.: 2, lat.: 1.1 mm. Hab.: Cap Bonae Spei.

Taille en ovale parfait, arrondi en avant et atténué en arrière, ayant sa plus grande largeur dans la base du prothorax. Coloration du dessus et du dessous d'un noir profond, assez peu luisant en dessus. Surface entièrement glabre. Pubescence élytrale nulle. Tête très large, courte, yeux convexes. Epistome large, fortement échancré. Le front est large et linéairement imprimé au milieu; partie interoculaire du front est assez large, les yeux sont convexes, la ligne oculofrontale est étroitement déprimée en forme d'un sillon linéaire; le front est un peu bombé de part et d'autre de la ligne médiane. Antennes courtes et noires. Prothorax environ trois fois plus large que long, ayant sa plus grande largeur dans la base, atténué en avant en ligne régulièrement courbée à bord antérieur profondément et simplement échancré, à lobe median antérieur nul, avec une dépression arrondie dans les angles antérieurs. Sculpture thoracale est indistincte. Une dépression linéaire et longitudinale, partant de la fossette des angles antérieurs et dirigée vers la base. Ecusson distinct. Les élytres sont environ  $1\frac{1}{2}$  fois aussi longs, que larges à la base, environ  $2\frac{1}{2}$  fois aussi longs que la tête et le prothorax réunis, atténués vers l'apex depuis la base en ligne arrondie régulière, ayant la plus grande largeur dans la base. Marge latéropostérieure des élytres sans denticulation distincte; surface élytrale à sculpture sériale des points, mais cette sculpture est subéffacée et très peu distincte. Carène humérale des élytres forte, entière, assez éloignée du bord élytral. Mentonnière distincte. Saillie prosternale assez large, dilatée postérieurement en trapèze, ayant les angles arrondis, entièrement rébordée, même antérieurement, plane. Hanches postérieures à l'angle latéropostérieur subarrondi. Tarses noirs.

**12. *Trachys* (Sbg. *Habroloma*) *camerunica* Kerr. Ann. Soc. Entom. Belg. XLIII, 1899, p. 298.**  
Hab.: Cameroun.

**13. *Trachys* (Sbg. *Habroloma*) *cara* Kerr. Rev. Zool. Afr. III. fasc. 2, 1913, p. 363, 364.**  
Hab.: Congo belge.

**14. *Trachys* (Sbg. *Habroloma*) *pondolana* n. sp. (Obenb. l. c. p. 50.)**

Long.: 3.2, lat.: 2.1 mm. Hab.: Pondoland (Africa mer.).

Taille cunéiforme, déprimée vers le sommet. Coloration du dessus d'un bronzé brun luisant. Coloration du dessous d'un bronzé plus profond, luisant. Pubescence de dessus longue, couchée, d'un jaune grisâtre. Tête très large, excavée, angle oculofrontal assez élevé. Epistome large, fortement échancré. Le front est large, à impression linéaire au milieu; partie interoculaire du front est obliquement atténuée en avant en ligne droite. Antennes normales, noires. Prothorax environ trois fois plus large que long, ayant sa plus grande largeur un peu avant la base, plus large que les élytres, à bord antérieur très profondément échancré en arc, à lobe median antérieur nul; angles postérieurs aigus, un peu abaissés sur l'épaule. Une vague large dépression avant la base. Sculpture thoracale peu distincte sous la pubescence irrégulière et relativement assez dense. Ecusson présent. Les élytres sont environ  $1\frac{2}{3}$  fois aussi longs, que larges à la base, environ trois fois aussi longs que la tête et le prothorax réunis, atténués vers l'apex depuis la base en ligne presque droite, ayant la plus grande largeur environ dans la base. Marge latéropostérieure des élytres faiblement dentée. Carène humérale des élytres entière. Apex élytral conjointement arrondi. Ornementation élytrale est composée de trois bandes transversales très flexueuses, une située dans le tiers basal, l'autre au milieu, troisième avant l'apex. Mentonnière distincte. Saillie prosternale très large, en trapèze. Le dessous est luisant. Pattes concolores. Angle latéropostérieur des hanches postérieures arrondi.

Observation: Taille et forme générale de cette espèce est bien voisine à celle des certaines espèces asiatiques, comme par ex. du *Trachys amica* Kerr.

**15. *Trachys* (Sbg. *Habroloma*) *Van Soni* n. sp. (Obenb. l. c. p. 50.)**

Long.: 3.4, lat.: 2 mm. Hab.: Transvaal: Bockenbrout Kloof (Van Son lgt.).

Taille de l'espèce précédente (*Tr. pondolana* m.), un peu plus convexe. Coloration du dessus d'un bronzé doré clair et luisant. Coloration du dessous bronzée. Pubescence d'un jaune grisâtre; assez longue, fine, assez dense. Tête très large, plus large que chez *pondolana* m., de forme semblable. Epistome large, profondément échancré. Le front est large, atténué en avant en ligne droite; partie interoculaire du front est étroitement sillonnée au milieu. Antennes normales, obscures. Prothorax environ  $2\frac{4}{5}$  fois plus large que long, ayant sa plus grande largeur dans la base, fortement arrondi et atténué en avant, à bord antérieur profondément et simplement échancré en arc, à lobe median antérieur nul. Sculpture thoracale est composée d'une fine ponctuation irrégulière dans la partie médiane et des fines mailles ocellées latéralement. Ecusson assez grand. Les élytres sont environ  $1\frac{2}{3}$  fois aussi longs, que larges à la base, environ trois, fois aussi longs que la tête et le prothorax réunis, atténués vers l'apex depuis la base en ligne presque droite, ayant la plus grande largeur environ dans la base. Marge latéropostérieure des élytres finement dentelée. Carène humérale des élytres entière. Apex élytral conjointement arrondi. Ornementation élytrale est composée de trois bandes d'un gris jaunâtre, dont la basale, située dans le tiers antérieur, est le plus souvent indistincte; bande post-médiane large et transversale, bande préapicale onduleuse; ces deux bandes sont

séparées seulement par une pubescence un peu plus brunâtre, semblable à celle de l'apex élytral — alors toute la partie postmédiane est pubescente, tandis que la partie antémédiane est presque glabre. Saillie prosternale en trapèze très large. Le dessous luisant. Angle latéropostérieur des hanches postérieures sub-aigu. Tarses noirs.

**16. *Trachys* (Sbg. *Habroloma*) *Thamentis* nom. n.** (Obenb. l. c. 1937, p. 50.)

Syn.: *Trachys* (*H.*) *senegalensis* Fährus (non Cast. et Gory), Ins. Caffrar. I, fasc. 2, 1851, p. 365—366. Hab.: Limpopo.

**17. *Trachys* (Sbg. *Habroloma*) *pretoriensis* Kerr.** in Wytsman, Genera Ins. fase XII, 1903, p. 308.

Hab.: Transvaal.

**18. *Trachys* (Sbg. *Habroloma*) *allecta* Kerr.** Revue Zool. Afric. III, fasc. 2, 1913, p. 363.

Hab.: Congo belge.

**19. *Trachys* (Sbg. *Habroloma*) *Epimethis* n. sp.** (Obenb. l. c. p. 51.)

Long.: 3, lat.: 1.9 mm. Hab.: Congo belge: Eala.

Taille déprimée, cunéiforme. Coloration du dessus d'un noir un peu bronzé, assez luisant. Coloration du dessous noirâtre. Pubescence du dessus brune, longue, assez dense, avec ornements blancs sur le prothorax et les élytres. Tête très large, profondément enfoncée dans le prothorax. Epistome large, profondément échancré. Le front est large, faiblement atténué en avant; partie interoculaire du front est très large, avec une distincte impression linéaire au milieu, aux angles aculofrontaux en carène aiguë et élevée. Antennes noires. Prothorax environ trois fois plus large que long, ayant sa plus grande largeur un peu avant la base, subparallèle postérieurement, à bord antérieur fortement et simplement échancré, à lobe médian antérieur nul, fortement arrondi, latéralement, avec quelques mailles ombiliquées; partie latérale subdilatée et largement déprimée; une large dépression anguleuse, très distincte, avant la base; pubescence du prothorax brune, avant l'écusson avec trois vagues et petites, arrondies macules blanches. Les élytres sont environ  $1\frac{3}{5}$  fois aussi longs, que larges à la base, environ trois fois aussi longs que la tête et le prothorax réunis. atténués vers l'apex depuis la base en courbe légère, ayant la plus grande largeur environ dans la base. Marge latéropostérieure des élytres est très peu distinctement denticulée. Les élytres sont peu convexes, cunéiformes et un peu moins larges que le prothorax. Carène humérale des élytres entière. Apex élytral conjointement arrondi. Ornementation élytrale est composée de macules blanches isolées et assez vagues, restées des vagues bandes transversales et onduleuses blanches dans le fond de pilosité brune. Mentonnière présente. Saillie prosternale en trapèze, large. Angle latéropostérieur des hanches postérieures subaigu. Tarses noirs.

**20. *Trachys* (Sb.) *Habroloma*) *Davidiana* Obenb.** Časpis Čs. spol. Entom. XXVII, 1930, p. 118.

Hab.: Cameroun.

**21. *Trachys* (Sbg. *Habroloma*) *zuluana* n. sp. (Obenb. l. c. p. 51.)**

Long.: 2.2, lat.: 1.2 mm. Hab.: Zoulouländ.

Taille allongée, ovulaire, assez convexe. Coloration du dessus d'un bronzé brun un peu cuivreux et luisant. Coloration du dessous bronzée. Pubescence disposée en séries distinctes longitudinales des poils assez courts et réguliers, d'un brun roux, avec trois bandes blanchâtres sur les élytres. Tête large, profondément enfoncée dans le prothorax. Epistome large, profondément échancré. Le front est, vu de dessus, bisinué; partie interoculaire du front est assez large, avec une dépression linéaire médiane et une dépression de part et d'autre le long des yeux. Antennes courtes, noirâtres. Prothorax environ trois fois plus large que long, ayant sa plus grande largeur dans la base, atténué en avant en courbe régulière, à bord antérieur profondément et simplement échancré, à lobe médian antérieur nul, à peine déprimé avant la base. Sculpture thoracale est composée de quelques mailles arrondies, situées latéralement. Prothorax à pilosité brune-rousse et concolore. Ecusson présent. Les élytres sont environ  $1\frac{2}{3}$  fois aussi longs, que larges à la base, environ  $3\frac{1}{4}$  fois aussi longs que la tête et le prothorax réunis, atténués vers l'apex depuis la base en courbe faible et régulière, ayant la plus grande largeur environ dans la base. Marge latéropostérieure des élytres inerme. Carène humérale des élytres entière, fine. Apex élytral assez étroitement et conjointement arrondi. Ornementation élytrale est composée de pubescence brune-rousse avec trois bandes transversales et flexueuses, transversales, distinctes bien dans la partie suturale, sub-interrompues latéralement, assez vagues en général. Mentonnière distincte. Saillie prosternale large, en trapèze. Angle latéropostérieur des hanches postérieures subaigu. Pattes noires, de même que les lamelles des tarses.

**22. *Trachys* (Sbg. *Habroloma*) *repetitrix* n. sp. (Obenb. l. c. p. 51.)**

Long.: 2.9, lat.: 1.9 mm. Hab.: Transvaal; Zoutpansberg.

Taille ovulaire, allongée, assez convexe. Coloration du dessus d'un bronzé violacé et luisant. Coloration du dessous bronzée. Pubescence de dessus vague, épars, surtout sur les élytres, où elle forme postérieurement deux bandes. Tête large, assez avancée, légèrement sillonnée au milieu. Epistome large, fortement échancré. Le front est largement et légèrement concave; partie interoculaire du front est atténuée en avant en ligne oblique. Antennes noires. Prothorax environ trois fois plus large que long, ayant sa plus grande largeur dans la base, atténuée en avant en ligne légèrement arquée, à bord antérieur fortement échancré en arc simple, à lobe médian antérieur nul; régulièrement et assez faiblement convexe, sans impressions prébasales. Sculpture thoracale est composée latéralement de mailles arrondies, au milieu d'une ponctuation très fine. Ecusson présent. Les élytres sont environ  $1\frac{3}{5}$  fois aussi longs, que larges à la base, environ  $2\frac{2}{3}$  fois aussi longs que la tête et le prothorax réunis, atténués vers l'apex depuis la base en ligne légèrement courbée, ayant la plus grande largeur dans la base. Marge latéropostérieure des élytres peu distinctement dentelée. Carène humérale des élytres entière et fine. Apex élytral assez largement et conjointement arrondi. Ornementation élytrale est composée de deux bandes vagues et transversales, préapicales. Mentonnière distincte. Saillie large, en trapèze. Angle latéropostérieur des hanches postérieures subarrondi. Tarses noirs.

**23. Trachys (Sbg. Habroloma) Argathra n. sp. (Obenb.) l. c. p. 51.)**

Long.: 3, lat.: 1.7 mm. Hab.: Mashonaland.

Taille ovulaire, assez convexe, allongée. Coloration du dessus d'un violacé obscur et un peu luisant. Coloration du dessous d'un violacé bronzé. Pubescence dense et irrégulière, assez longue et fine. Tête arrondie latéralement, large, peu avancée. Epistome large et profondément échancré. Front à l'impression linéaire fine médiane; partie interoculaire du front est obliquement atténuée en avant. Antennes normales, noirâtres. Prothorax environ trois fois plus large que long, ayant sa plus grande largeur dans la base, assez fortement atténué en avant en ligne presque droite, à bord antérieur fortement et simplement échancré en arc, à lobe median antérieur nul. Pubescence de la tête et du prothorax subuniforme et rousse. Ecusson présent. Les élytres sont environ  $1\frac{2}{3}$  fois aussi longs, que larges à la base, environ trois fois aussi longs que la tête et le prothorax réunis, atténués vers l'apex depuis la base en ligne régulièrement courbée, ayant la plus grande largeur environ dans la base. Marge latéropostérieure des élytres à peine dentelée. Carène humérale des élytres entière et fine. Apex élytral assez largement arrondi. Ornementation élytrale est composée de pubescence prédominante blanche, d'où émergent çà et là quelques poils brunâtres; cette pubescence est régulière et assez dense, subuniforme. Mentonnière présente. Saillie prosternale en trapèze élargi postérieurement; bronzée. Le dessous est assez luisant. Angle latéropostérieur des hanches postérieures subarrondi. Tarses noirs.

**24. Trachys (Sbg. Habroloma) Naghma n. sp. (Obenb. l. c. p. 51.)**

Long.: 2.5, lat.: 1.7 mm. Hab.: Mashonaland; Salisbury: G. A. K. Marshall. (British Museum of Natural History.)

Taille ovulaire, assez peu convexe. Coloration du dessus d'un bronzé noirâtre, un peu violacé et luisant. Coloration du dessous un peu plus obscure. Pubescence du dessus d'un roux-ocré clair, avec un dessin élytral d'un jaune blanchâtre. Tête large, aux bords oculofrontaux arrondis. Epistome large, profondément échancré. Le front est atténué en avant en ligne oblique; partie interoculaire du front est au milieu très finement sillonnée par une ligne enfoncée. Antennes courtes et noires. Prothorax environ  $2\frac{3}{4}$  fois plus large que long, ayant sa plus grande largeur dans la base, atténué en avant en ligne régulièrement arquée, à bord antérieur largement et profondément échancré en arc, à lobe median antérieur nul. Pubescence de la tête et du prothorax subuniforme, rousse-orangée. Ecusson présent. Les élytres sont environ  $1\frac{2}{3}$  fois aussi longs, que larges à la base, environ trois fois aussi longs que la tête et le prothorax réunis, atténués vers l'apex depuis la base en ligne presque droite, ayant la plus grande largeur environ dans la base. Marge latéropostérieure des élytres inerme. Carène humérale des élytres entière et fine. Apex élytral conjointement arrondi. Ornementation élytrale est composée de pubescente brune roussâtre, assez fine et assez éparse, couvrant régulièrement la surface élytrale, avec trois vagues bandes transversales et flexueuses, étroites et peu remarquables, d'un jaune blanchâtre. Mentonnière présente. Saillie prosternale en trapèze, élargie postérieurement. Angle latéropostérieur des hanches postérieures subaigu. Tarses noirs.

**25. Trachys (Sbg. Habroloma) salisburyensis n. sp. (Obenb. l. c. p. 52.)**

Long.: 3.5, lat.: 2.1 mm. Hab.: Mashonaland: Salisbury (G. Lévy).



Taille cunéiforme, déprimée en dessus, assez peu convexe. Coloration du dessus d'un violacé bronzé et obscur, luisant. Coloration du dessous bronzée, luisante. Pubescence de dessus longue, bronzée, dense, couchée. Tête très large, légèrement concave, à peine sillonnée au milieu. Epistome très large, profondément échancré. Le front est large, bords oculofrontaux légèrement caréniformes; partie interoculaire du front est atténué en avant en ligne oblique. Antennes courtes, noires. Prothorax environ trois fois plus large que long, ayant sa plus grande largeur dans la base, fortement atténué en avant en ligne arquée, à bord antérieur à l'échancrure profonde et arquée, à lobe median antérieur nul. Tout le prothorax est couvert de pubescence fine, relativement longue et très dense, couvrant le fond; deux macules brunes au milieu du disque, un peu avant l'écusson, qui est distinct. Les élytres sont environ  $2\frac{1}{2}$  fois aussi longs, que larges à la base, environ trois fois aussi longs que la tête et le prothorax réunis. atténués vers l'apex depuis la base, où ils sont un peu plus étroits que le prothorax, ayant la plus grande largeur dans la base, atténués en ligne presque droite. Marge latéropostérieure des élytres distinctement dentelée. Carène humérale des élytres entière et fine. Apex élytral conjointement arrondi. Ornementation élytrale est composée de large bande, dense et d'un gris ocré, préapicale. Une rectangulaire, allongée partie postscutellaire est à l'apparence glabre. Suture élytrale étroitement bordée de pilosité brune, qui couvre de même les parties latérales antérieures des élytres et l'apex. Mentonnière présente. Saillie prosternale en trapèze élargi postérieurement. Angle latéropostérieur des hanches postérieures arrondi. Tarses noirs.

**26. *Trachys* (Sbg. *Habroloma*) *absterrens* n. sp. (Obenb. l. c. p. 52.)**

Long.: 4.5, lat.: 2 mm. Hab.: Transvaal (Dr. Emil Holub).

Taille cunéiforme, grande, assez déprimée sur le dos. Coloration du dessus d'un bronzé violacé obscur. Coloration du dessous bronzée, plus claire. Pubescence du dessus longue, fine, irrégulière, dense, russe, avec l'ornementation de nuance un peu plus claire. Tête large et plane, aux bords oculofrontaux arrondis. Epistome échancré profondément; large. Le front est atténué en avant, à peine sillonné au milieu; partie interoculaire du front est large. Antennes courtes, normales. Prothorax environ trois fois plus large que long, ayant sa plus grande largeur dans la base, un peu plus large que les élytres, à bord antérieur profondément échancré en arc simple, à lobe median antérieur nul, atténué en avant depuis la base en ligne obliquement arquée, aux angles antérieurs avancés. Ecusson présent. Les élytres sont environ  $1\frac{3}{5}$  fois aussi longs, que larges à la base, environ trois fois aussi longs que la tête et le prothorax réunis, atténués vers l'apex depuis la base et ayant ici la plus grande largeur. Marge latéropostérieure des élytres distinctement dentelée. Carène humérale des élytres étroite, fine et entière. Apex élytral conjointement arrondi. Ornementation élytrale est composée de deux bandes postmédianes très larges, presque réunies en une seule, un peu plus ocrées et plus claires que pilosité rousse foncée; le long de la suture, de part et d'autre, on observe deux macules obscures, d'un brun noirâtre — une derrière la base, l'autre derrière la première, au tiers basal. Mentonnière présente. Saillie prosternale en losange, très large. Angle latéropostérieur des hanches postérieures arrondi. Tarses noirs.

**27. Trachys (Sbg. Habroloma) Gamadega n. sp. (Obenb. l. c. p. 52.)**

Long.: 3, lat.: 1.7 mm. Hab.: Port Saint John (Africa mer.).

Taille cunéiforme, subdéprimée sur le dos. Coloration du dessus d'un bronzé violacé et assez luisant. Coloration du dessous bronzée. Pubescence de dessus assez fine et éparsée, longue, ne couvrant pas entièrement la fond. Tête large, simplement et largement excavée au milieu. Epistome large, profondément échancré. Le front est large, atténué en avant en ligne droite; partie interoculaire du front est large, à sillon médian linéaire et peu distinct, aux bords oculifrontaux en carène. Antennes normales, noires. Prothorax environ  $2\frac{4}{5}$  fois plus large que long, ayant sa plus grande largeur un peu avant la base, fortement arrondi et atténué en arc en avant, à bord antérieur fortement échancré en arc simple, à lobe median antérieur nul, à dépression distincte prébasale et transversale, couvert, comme la tête, de pilosité uniforme, rousse, assez dense, peu régulière. Ecusson présent. Les élytres sont environ  $1\frac{2}{3}$  fois aussi longs, que larges à la base, environ  $3\frac{1}{4}$  fois aussi longs que la tête et le prothorax réunis, atténués vers l'apex depuis la base en ligne légèrement arquée, ayant la plus grande largeur dans la base, où ils sont plus étroits que le prothorax. Marge latéropostérieure des élytres distinctement denticulée. Carène humérale des élytres entière, fine. Apex élytral conjointement arrondi. Ornementation élytrale est composée de trois vagues et très flexueuses bandes transversales de pubescence ocrée-roussâtre, seulement un peu plus claire que l'autre pilosité foncière, couvrante le fond. Mentonnière présente. Saillie prosternale en trapèze, élargi postérieurement. Angle latéropostérieur des hanches postérieures subaigu. Tarses noirs.

**28. Trachys (Sbg. Habroloma) Xamartha n. sp. (Obenb. l. c. p. 52.)**

Long.: 3, lat.: 1.9 mm. Hab.: Mashonaland (G. Lévy).

Taille cunéiforme, assez déprimée en dessus, allongée. Coloration du dessus d'un bronzé violacé obscur. Coloration du dessous d'un bronzé clair. Pubescence de dessus longue, irrégulière et dense. Tête très large, ligne antérieure, vue de dessus, bisinuée. Epistome large, profondément échancré. Le front est silloné au milieu et le long des yeux; partie interoculaire du front est large et atténuée en avant. Antennes noires, normales. Prothorax environ  $3\frac{1}{2}$  fois plus large que long, ayant sa plus grande largeur dans la base, atténué fortement en avant en ligne arquée, à bord antérieur largement et assez profondément échancré, à lobe median antérieur nul. Pubescence de la tête et du prothorax rousse et dense, un peu irrégulière, avec une ligne médiane au milieu du prothorax un peu plus claire, plus ocrée. Angles postérieurs du prothorax, que est un peu plus large que les élytres, abaissés sur les élytres. Ecusson distinct. Les élytres sont environ  $1\frac{2}{3}$  fois aussi longs, que larges à la base, environ  $3\frac{1}{2}$  fois aussi longs que la tête et le prothorax réunis, atténués vers l'apex depuis la base en ligne légèrement courbée, ayant la plus grande largeur dans la base, cunéiformes. Marge latéropostérieure des élytres distinctement denticulée. Carène humérale des élytres fine, entière. Apex élytral conjointement arrondi. Ornementation élytrale est composée de trois bandes très flexueuses, étroites et transversales, composées de pilosité un peu plus claire, en nuance plus ocrée que l'autre pubescence élytrale; la pilosité de ces bandes est, de même, beaucoup plus dense. Mentonnière présente. Saillie prosternale en trapèze, élargie vers le sommet. Angle latéropostérieur des hanches postérieures subaigu. Tarses noirs.

### Subgenus *Trachys* s. str.

29. *Trachys* (s. str.) *obesa* Kerr. Ann. Soc. Entom. Belg. XLIV, 1900, p. 345.

Hab.: Zambesi.

30. *Trachys* (s. str.) *comitessa* Kerr. Rev. Zool. Afric. III. fasc. 2, 1913, p. 363.

Hab.: Congo belge.

31. *Trachys* (s. str.) *Masoni* Théry, Bull. Soc. Sc. Maroc, VIII, 1928, p. 192—193. Textfig. 5.

Hab.: Afrique or. c.

32. *Trachys* (s. str.) *Dughbara* n. sp. (Obenb. l. c. p. 53.)

Long.: 4, lat.: 2 mm. Hab.: Camerun: Duala (Alois David lgt.).

Taillie assez allongée, cunéiforme. Très semblable à *Tr. Masoni* Théry. Peu luisant. Coloration du dessus bicolore: tête et prothorax à coloration d'un bronzé doré et à pubescence uniforme dorée, les élytres sont noirs, à pubescence noire et à dessin jaune ocré. Coloration du dessous d'un noir violacé luisant. Pubescence de dessus très dense, mais courte, très régulière. Tête large, largement excavée, yeux situés obliquement. Epistome large et profondément échancré. Le front est atténué en avant, à pubescence irrégulière; partie interoculaire du front est excavée, bords oculofrontaux subanguleux. Antennes courtes, normales. Prothorax environ trois fois plus large que long, ayant sa plus grande largeur dans la base, atténué en avant en ligne oblique droite, à bord antérieur très largement et simplement échancré, à lobe médian antérieur nul. Prothorax régulièrement convexe, avant la base avec une faible et large dépression transversale. Ecusson présent. Les élytres sont environ  $1\frac{2}{3}$  fois aussi longs, que larges à la base, environ  $2\frac{1}{2}$  fois aussi longs que la tête et le prothorax réunis, atténués vers l'apex depuis la base en ligne légèrement arquée, ayant la plus grande largeur dans la base. Marge latéropostérieure des élytres à peine denticulée. Carène humérale des élytres nulle. Apex élytral conjointement arrondi, couvert de pubescence jaune. Ornementation élytrale est composée de pubescence dense et très courte, noire, qui donne à l'insecte un aspect mat et qui couvre la plupart de la surface, avec de quelques courtes traces de lignes isolées dans la partie basilaire et de trois bandes très flexueuses d'un jaune ocré un peu roussâtre; bande antérieure interrompue et moins distincte, les deux bandes préapicales très nettes et claires. Dans la partie basilaire, près de l'écusson, une courte touffe de poils noirs. Saillie prosternale étroite, étranglée au milieu. Le dessous luisant. Angle latéropostérieur des hanches postérieures arrondi. Pattes et tarses obscurs.

33. *Trachys* (s. str.) *rivularis* n. sp. (Obenb. l. c. p. 54.)

Long.: 3.7, lat.: 1.9 mm. Hab.: Congo belge: Sundi.

Taille allongée et cunéiforme, peu convexe. Coloration du dessus bicolore: tête et prothorax à coloration d'un bronzé doré et à pilosité dorée, élytres d'un bleu luisant, un peu violacé. Coloration du dessous noire. Pubescence des élytres très rare, sauf deux fascies préapicales peu denses, vagues, ocrées. Tête assez large concave. Epistome large, profondément axcavé. Le front est assez large, atténué en avant; partie interoculaire du front est excavée. Palpes ocrés.

Antennes normales, noires. Prothorax environ  $2\frac{2}{3}$  fois plus large que long, ayant sa plus grande largeur dans la base, atténué en avant en ligne oblique, à bord antérieur largement et assez faiblement échancré, à lobe médian antérieur nul. Ecusson très petit, présent. Les élytres sont environ  $1\frac{2}{3}$  fois aussi longs, que larges à la base, environ  $2\frac{3}{4}$  fois aussi longs que la tête et le prothorax réunis, atténués vers l'apex depuis le milieu, ayant la plus grande largeur environ dans les épaules. Marge latéropostérieure des élytres inerme. Elytres subparallèles antérieurement, puis arrondis et atténués en courbe régulière vers l'apex, qui est arrondi conjointement. Ils sont presque lisses et glabres, à peine pubescents au fond. Carène humérale des élytres nulle. Ornementation élytrale est composée de deux bandes ocrées et flexueuses, peu distinctes préapicales. L'espace entre ces bandes est couvert de pilosité peu apparente noire, qui est, extérieurement, dressée en forme d'une touffe, plus visible seulement sur les côtés. Saillie prosternale étroite, fortement étranglée au milieu. Le dessous est noir, comme les pattes et tarses, dont la partie inférieure des lamelles est d'un jaune ocré obscur. Angle latéropostérieur des hanches postérieures subaigu. Tarses noirs, lamelles des tarses d'un jaune ocré obscur.

**34. *Trachys* (s. str.) *crassata* n. sp. (Obenb. l. c. p. 54.)**

Long.: 4.2—4.7, lat.: 2.7—3 mm. Hab.: Transvaal (Dr. E. Holub). Mashonaland: Salisbury (G. A. K. Marshall). (British Museum of Natural History.)

Taille très grande, robuste, convexe, courte et ovale. Coloration du dessus d'un noir violacé, presque entièrement couverte par la pubescence. Coloration du dessous d'un noir un peu irisé. Pubescence du dessus très dense, très courte, très fine, régulière, d'un brun roux, plus roussâtre latéralement. Tête large, courte, vue de dessus plane, avec une impression linéaire au milieu. Epistome très profondément échancré en arc. Le front est atténué en avant en ligne droite; partie interoculaire du front est assez large et assez plane. Antennes courtes, noires. Prothorax environ  $3\frac{1}{2}$  fois plus large que long, ayant sa plus grande largeur dans la base, obliquement atténué en avant en ligne droite, à bord antérieur très largement et simplement échancré, à lobe médian antérieur nul. Surface thoracale convexe, couverte comme la tête par une pubescence courte et rousse, avec entremêlées petites macules de pubescence blanche. Le prothorax est un peu plus étroit que les élytres. Ecusson petit, mais distinct. Les élytres sont environ  $1\frac{1}{2}$  fois aussi longs, que larges à la base, environ deux fois aussi longs que la tête et le prothorax réunis, atténués vers l'apex depuis la base, ayant la plus grande largeur environ dans la partie humérale. Marge latéropostérieure des élytres très finement denticulée. Elytres atténués vers le sommet depuis la base, d'abord presque parallèles, puis atténués en ligne régulièrement arquée. Surface élytrale très convexe, avec les épaules un peu élevées, avec une touffe des poils plus longs roux sur le calus huméral et une touffe semblable dans la base, de part et d'autre de l'écusson. Carène humérale des élytres nulle. Apex élytral conjointement et assez largement arrondi. Ornementation élytrale est composée de trois bandes flexueuses et très étroites blanches et quelques macules semblables dans la partie basilaire, le tout sur un fond brun-roux, plus roussâtre latéralement. Une courte mentonnière est présente. Saillie prosternale large, arrondie au bout, légèrement subdilataée vers le sommet, plane. Le dessous est d'un noir bleuâtre, assez luisant. Angle lateropostérieur des hanches postérieures aigu. Palpes et tarses d'un roux obscur.

**Observation:** La plus robuste espèce africaine connue à moi. J'ai envoyé, il y a quelque temps, quelques exemplaires de cette espèce aux mes correspondants sous le nom, préoccupé déjà, de *Tr. crassula* m. in litt. Cette espèce a une très courte mentonnière, ce que démontre, que ce caractère peut ce trouver même chez un *Trachys* s. str. et que ce caractère n'est pas de validité générique, comme l'a proclamé M. Théry. Un exemplaire du British Museum porte l'étiquette: »salisburyensis B. J. in litt.«

35. *Trachys* (s. str.) *subnodosa* Kerr. Bull. Soc. Ant. Ital. XXXVIII, 1907, p. 103.

Hab.: Erythrée.

36. *Trachys* (s. str.) *lucidula* Fähr. Ins. Caffrar. I, 1851, p. 369.

Hab.: Natal.

37. *Trachys* (s. str.) *incerta* Fähr. l. c. p. 366.

Hab.: Natal.

38. *Trachys* (s. str.) *Mystaxidora* n. sp. (Obenb. l. c. p. 55.)

Long.: 2.7, lat.: 1 mm. Hab.: Africa c.: Momo.

Taille allongée, assez convexe. Coloration du dessus d'un bronzé un peu verdâtre. Coloration du dessous noirâtre. Pubescence du dessus d'un jeune doré, condensée postérieurement sur les élytres en bande préapicale. Tête large, assez plane, sans dépression médiane distincte. Epistome large, fortement échancré. Le front est fortement atténué en avant; partie interoculaire du front large. Antennes normales, courtes. Prothorax environ 3.5 fois plus large que long, ayant sa plus grande largeur dans la base, atténué en avant en ligne oblique, à bord antérieur bisinueusement et largement échancré, à lobe médian antérieur distinct et large. Sculpture thoracale est composée d'une ponctuation fine, plus distincte latéralement. Ecusson visible, petit. Les élytres sont environ  $1\frac{3}{4}$  fois aussi longs, que larges à la base, environ  $2\frac{1}{2}$  fois aussi longs que la tête et le prothorax réunis, atténués vers l'apex depuis les  $\frac{2}{3}$  postérieure des élytres; inerme. Elytres convexes, à sculpture finement apex subcoriacée, luisants. Carène humérale des élytres nulle. Apex élytral conjointement arrondi. Ornementation élytrale est composée de vague bande préapicale, formée de pilosité jaunâtre plus condensée. Mentonnière nulle. Saillie prosternale assez large, un peu dilatée postérieurement. Le dessous tout-à fait glabre, assez luisant. Angle latéropostérieur des hanches postérieures subaigu. Tarses et pattes noirs.

39. *Trachys* (s. str.) *abyssinica* Théry. Ann. et Bull. Soc. Ent. Belg. LXVII, 1927, p. 40—42. Textfig.

Hab.: Abessynie.

40. *Trachys* (s. str.) *assinica* Kerr. in Wystamn, Genera Ins. Fasc. 1903, p. 311.

Hab.: Assinie.

41. *Trachys* (s. str.) *damarigena* n. sp. (Obenb. l. c. p. 56.)

Long.: 2.2—2.7, lat.: 1.15—1.5 mm. Hab.: Africa mer. occ., Damara, Zouloulund.



Taille allongé, ovulaire, convexe. Coloration du dessus d'un bronzé assez luisant. Coloration du dessous semblable à celle du dessus. Pubescence fine et régulière, argentée ou légèrement grisâtre. Tête large, mais pas trop grande, étroitement sillonnée au milieu. Epistome assez large, échancré en avant. Le front est assez fortement atténué en avant; partie interoculaire du front est assez large, à pubescence éparse. Antennes courtes, normales. Prothorax  $3\frac{1}{2}$  fois plus large que long, ayant sa plus grande largeur dans la base, atténué en avant en ligne légèrement arguée, à bord antérieur largement et profondément échancré en arc, à lobe median antérieur indistinct; bord postérieur du prothorax est légèrement relevé. Sculpture thoracale est composée des mailles très fines. Ecusson petit, mais distinct. Les élytres sont environ  $1\frac{2}{3}$  fois aussi long, que larges à la base, environ  $2\frac{1}{2}$  fois aussi longs que la tête et le prothorax réunis, atténués vers l'apex depuis le milieu, convexes, subparallèles, ayant la plus grande largeur environ dans la partie humérale. Marge latéropostérieure des élytres inerme. Ils sont très régulièrement convexes, à ponctuation vague et irrégulière plus fine postérieurement. Carène humérale des élytres nulle. Apex élytral conjointement et assez largement arrondi. Ornementation élytrale est composée de trois vagues et étroites bandes transversales et très flexueuses, sur un fond à pilosité semblable, mais d'une légère nuance un peu plus foncée ou grisâtre; les deux bandes préapicales sont plus distinctes, très claires. Mentonnière absente. Saillie prosternale distinctement dilatée postérieurement. Le dessous est luisant. Angle latéropostérieur des hanches postérieures droit. Tarses obscurs.

42. *Trachys (s. str.) evanescens* Fähr. Ins. Caffrar. I, 1851, p. 369.  
Hab.: Africa mer.

43. *Trachys (s. str.) eurycephala* n. sp. (Obenb. l. c. p. 56.)

Long.: 2.7, lat.: 1.1 mm. Hab.: Transvaal. Africa occ. mer.

Taille allongée, parallèle, longue, assez convexe. Coloration du dessus d'un bronzé luisant et assez obscur. Coloration du dessous d'un bronzé un peu plus clair. Pubescence du dessus grise ou argentée, formant dans la partie postérieure des élytres des bandes transversales. Tête très large, beaucoup plus large que chez les deux espèces précédentes. Epistome assez étroit entre les cavités antennaires. Le front est très large, atténué en avant en ligne droite; partie interoculaire du front est étroitement sillonnée au milieu. Marge oculo-frontale arrondie. Antennes courtes, obscures, normales. Prothorax environ quatre fois plus large que long, ayant sa plus grande largeur dans la base, faiblement atténué en avant en ligne arquée, à bord antérieur très distinctement bisinué, à lobe median antérieur très large, mais très distinct. Sculpture thoracale est composée de fines mailles microscopiques arrondies. Ecusson très petit, ponctiforme. Les élytres sont environ  $1\frac{3}{4}$  fois aussi longs, que larges à la base, environ trois fois aussi longs que la tête et le prothorax réunis, atténués vers l'apex depuis le milieu en ligne longue, arrondie, ayant la plus grande largeur environ dans la partie humérale. Marge latéropostérieure des élytres inerme; ils sont convexes, parallèles dans la moitié antérieure, à ponctuation dense et irrégulière, plus fine postérieurement. Carène humérale des élytres nulle. Apex élytral conjointement et largement arrondi. Ornementation élytrale est composée de pubescence assez régulière, grise, condensée postérieurement en forme de deux vagues bandes transversales et très onduleuses. Mentonnière

absente. Saillie prosternale subparallèle. Angle latéropostérieur des hanches postérieures aigu. Le dessous est luisant. Pattes concolores, tarsi obscurs.

**Observation:** Les trois espèces précitées sont presque toujours mélangées dans les collections. L'espèce présente est très facilement à reconnaître d'après la tête très large, prothorax très court et la marge antérieure du prothorax très nettement échancrée en ligne bisinuée, avec un lobe antérieur médian très large et très distinct.

**44. *Trachys* (s. str.) *parallela* Kerr.** Ann. Mus. Civ. Stor. Nat. Genova (2), XIX (XXXIX), 1899, p. 505.

Hab.: Zouloulund.

**45. *Trachys* (s. str.) *capicola* n. sp.** (Obenb. l. c. p. 56.)

Long.: 2.3—2.8, lat.: 1.1—1.6 mm. Hab.: Cap Bonae Spei. (*Tr. Panthoa* m. in litt.)

Taille allongée, subparallèle, convexe. Coloration du dessus d'un bronzé assez obscur, peu luisant. Coloration du dessous un peu plus claire, bronzée. Pubescence de dessus uniforme, régulière et assez dense. Tête large, vue de dessus plane, avec une ligne médiane enfoncée. Epistome très large, profondément échancré. Le front est assez large, éparsément pubescent; partie interoculaire du front est atténuée en avant en ligne droite. Antennes courtes, normales. Prothorax environ  $3\frac{1}{3}$  fois plus large que long, ayant sa plus grande largeur environ dans la base, atténué assez faiblement en avant en ligne oblique, à bord antérieur simplement échancré en arc peu profond, à lobe médian antérieur nul. Ecusson très petit. Les élytres sont environ  $1\frac{2}{3}$  fois aussi longs, que larges à la base, environ  $2\frac{2}{3}$  fois aussi longs que la tête et le prothorax réunis, atténués vers l'apex depuis le milieu, convexes, ayant la plus grande largeur environ dans la partie humérale. Marge latéropostérieure des élytres inerme. Ils sont parallèles dans la moitié antérieure, très régulièrement convexes et à ponctuation fine et dense. Carène humérale des élytres nulle. Apex élytral assez largement arrondi. Mentonnière absente. Saillie prosternale étroite et parallèle. Angle latéropostérieur des hanches postérieures aigu. Pattes concolores, tarsi obscurs.

**46. *Trachys* (s. str.) *tenuis* n. sp.** (Obenb. l. c. p. 57.)

Long.: 2.2—2.8, lat.: 0.95—1.4 mm. Hab.: Pondoland; Ukerewe (Benignsen); Transvaal.

Taille allongée, parallèle, convexe. Coloration du dessus d'un bronzé assez luisant et obscur. Coloration du dessous plus claire, bronzé. Pubescence de dessus uniforme, longue, fine et éparse, grise. Tête très large, à peine sillonnée au milieu. Epistome très large et très profondément échancré. Le front est atténué en avant en ligne droite et oblique; partie interoculaire du front est assez large, avec une ligne fine médiane enfoncée. Antennes courtes, normales. Prothorax environ quatre fois plus large que long, ayant sa plus grande largeur dans la base, très faiblement atténué en avant, à bord antérieur très distinctement échancré en ligne bisinuée, à lobe médian antérieur très large et distinct. Ecusson minuscule. Les élytres sont environ  $1\frac{3}{4}$  fois aussi longs, que larges à la base, environ  $2\frac{3}{4}$  fois aussi longs que la tête et le prothorax réunis, atténués vers l'apex depuis le milieu, ayant la plus grande largeur environ dans la partie humérale. Marge latéropostérieure des élytres inerme. Surface élytrale à ponctuation irrégulière, assez dense et assez fine. Carène humé-

rale des élytres nulle. Apex élytral assez étroitement et conjointement arrondi. Mentonnière absente. Saillie prosternale parallèle. Angle latéropostérieur des hanches postérieures subaigu. Tarses obscurs.

**47. *Trachys* (s. str.) *prolongatula* n. sp. (Obenb. l. c. p. 57.)**

Long.: 2.2, lat.: 1 mm. Hab.: Zanzibar. Ukerewe. (Eichelbaum).

Taille allongée, parallèle, assez convexe. Coloration du dessus d'un bronzé assez clair et assez luisant. Coloration du dessous bronzée. Pubescence du dessus uniforme, assez longue, assez fine, assez dense. Tête assez large, distinctement déprimée au milieu. Epistome assez large, assez profondément échancré. Le front est distinctement déprimé au milieu; partie interoculaire du front est atténuée en avant en ligne oblique. Antennes normales, courtes. Prothorax environ  $3\frac{1}{3}$  fois plus large que long, ayant sa plus grande largeur environ dans la base, obliquement, mais assez faiblement atténué en avant en ligne presque droite, à bord antérieur très distinctement bisinué, à lobe median antérieur distinct. Ecusson petit. Les élytres sont environ  $1\frac{2}{3}$  fois aussi longs, que larges à la base, environ  $2\frac{1}{3}$  fois aussi longs que la tête et le prothorax réunis. atténués vers l'apex depuis le milieu, ayant la plus grande largeur environ dans la partie humérale. Marge latéropostérieure des élytres inerme. Ponctuation élytrale irrégulière, assez dense et assez grossière. Carène humérale des élytres nulle. Mentonnière absente. Saillie prosternale subparallèle. Angle latéropostérieur des hanches postérieures subarrondi. Tarses noirs.

Observation: Epistome chez cette espèce est beaucoup moins large que chez *Tr. tenuis* m. et, de même, moins profondément échancré en avant.

**48. *Trachys* (s. str.) *circumdata* Kerr. in Sjoestedt, Kilimandjaro-Meru Exped. 7, Col. 3, Bupr. 1905—06, p. 29—30, t. 1, fig. 8.**

Hab.: Kilimandjaro.

**49. *Trachys* (s. str.) *fenestrella* n. sp. (Obenb. l. c. p. 57.)**

Long.: 2.5, lat.: 1.2 mm. Hab.: Congo belge: Vista. Ukerewe (Bennigsen).

Taille assez cunéiforme, assez faiblement convexe, atténuée en arrière. Coloration du dessus d'un bronzé très obscur et luisant. Pubescence jaune élytrale laissant un espace allongé et ovale, situé derrière l'écusson et prolongé le long de la suture, jusque dans les  $\frac{3}{5}$  postérieures de la longueur élytrale, glabre. Pubescence de dessus unicolore, jaune, très régulière, fine et assez dense, celle du dessous semblable, rare. Tête faiblement déprimée au milieu. Bord des yeux non caréné. Epistome large, échancré en avant. Le front est en trapèze, élargi vers la vertex; partie interoculaire du front est déprimée au milieu. Antennes noires. Prothorax environ trois fois plus large que long, ayant sa plus grande largeur à la base, un peu plus étroit que les élytres, à bord antérieur échancré en ligne régulièrement arquée, à lobe median antérieur très peu perceptible. Sculpture thoracale composée des mailles très fines, très peu distinctes sous la pilosité jaune superficielle. Ecusson très petit, mais distinct. Les élytres sont environ  $1\frac{3}{5}$  fois aussi longs, que larges à la base, environ  $3\frac{1}{4}$  fois aussi longs que la tête et le prothorax réunis, atténués vers l'apex depuis les épaules, qui sont assez élevées; ayant la plus grande largeur environ dans les épaules; assez peu convexes. Marge latéropostérieure des élytres inerme. Elytres à convexité normale. Carène humérale des élytres nulle. Apex élytral

conjointement et assez étroitement arrondi. Ornementation élytrale est composée de ponctuation fine et superficielle, irrégulière, sur le fond luisant. Hanches postérieures à l'angle latéropostérieur aigu. Pattes noirs, lamelles des tarses et les palpes d'un jaune ocré. Ongles des tarses et les derniers articles des tarses noirs.

**Observation:** Une espèce bien remarquable à cause d'une ornementation spéciale péculière et bien distincte.

**50. *Trachys* (s. str.) *maligna* n. sp. (Obenb. l. c. p. 57.)**

Long.: 2.8, lat.: 1.8 mm. Hab.: Congo belge.

Taille assez allongée, assez parallèle, peu large. Coloration du dessus d'un bronzé violacé et obscur, luisant. Coloration du dessous d'un noir profond. Pubescence de dessus unicolore, d'un blanc grisâtre, sans nuance jaune. Tête largement creusée, très large, peu avancée. Epistome large. Le front est en trapèze, fortement atténué en avant; partie interoculaire du front est assez large, à dépression linéaire au milieu. Antennes noires. Prothorax  $2\frac{3}{4}$  fois plus large que long, ayant sa plus grande largeur dans la base, atténué en avant en ligne arquée, à bord antérieur échancré en arc distinctement bisinué, à lobe médian antérieur peu avancé, mais distinct et très large; largement et peu profondément déprimé latéralement. Sculpture thoracale est composée des mailles très fines et peu serrées, très peu distinctes sous la pilosité. Prothorax un peu plus étroit que les élytres. Ecusson très petit, mais bien distinct. Les élytres sont environ  $1\frac{2}{3}$  fois aussi longs, que larges à la base, environ  $2\frac{2}{3}$  fois aussi longs que la tête et le prothorax réunis. atténués vers l'apex depuis le milieu de la longueur élytrale, ayant la plus grande largeur environ dans les épaules, qui sont légèrement élevées. Marge latéropostérieure des élytres inerme. Les élytres sont subparallèles dans la moitié antérieure, plus atténués en ligne courbée vers le sommet, où ils sont assez étroitement et conjointement arrondis. Carène humérale des élytres nulle. Apex élytral assez étroitement arrondi. Ornementation élytrale est composée de pubescence d'un blanc grisâtre, qui laisse un espace allongé et ovalaire, se prolongeant depuis la base jusqu'au tiers postérieur et couvert d'une pubescence peu aperceptible, plus obscure, grisâtre et invisible sous un certain angle. Hanches postérieurs à l'angle latéropostérieur aigu. Pattes noires, lamelles des tarses et les palpes d'un jaune brunâtre. Ongles des tarses et les derniers articles des tarses noirs.

**Observations:** Bien semblable au précédent (*fenestrella* m.), avec lequel il forme un groupe à part.

**51. *Trachys* (s. str.) *levipennis* Kerr. in Wytsman, Genera Ins. fasc. XII, 1903, p. 311.**

Hab.: Afr. or. angl.

**52. *Trachys* (s. str.) *somala* Gestro. Ann. Mus. Civ. Stor. Genova (2), XV (XXXV), 1895, p. 349.**

Hab.: Somalie.

**53. *Trachys* (s. str.) *Simoni* Kerr. in Wytsman, Genera Ins. fasc. XII, 1903, p. 310.**

Hab.: Capland.

**54. *Trachys* (s. str.) *Kijabensis* Obenb. Sborník Entom. Odd. Nár. Mus. Praha, VI, 49, 1928, p. 24, T. 1, fig. 19.**

Hab.: Kenya Colony.

**55. *Trachys* (s. str.) *Hessei* n. sp. (Obenb. l. c. p. 58.)**

Long.: 2.9, lat.: 1.8 mm. Hab.: Cap Bonae Spei: Cape Town.

Taille assez robuste, assez parallèle, très régulièrement convexe. Une espèce mate. Coloration du dessus d'un bronzé cuivreux assez clair; chagriné et coriacé sur toute la surface; cette chagrination microscopique et très régulière est distincte sur le prothorax, plus coriacée sur les élytres. Coloration du dessous d'un bronzé cuivreux plus luisant. Pubescence de dessus unicolore, grise, sans bandes transversales sur les élytres, très fine et régulière. Tête très large, vue de dessus plane, finement sillonnée en avant, peu avancée. Epistome très large, faiblement échancré en avant. Le front est très large, faiblement atténué en avant; partie interoculaire du front est large, avec une impression fine et linéaire au milieu. Antennes noires. Prothorax environ trois fois plus large que long, ayant sa plus grande largeur environ dans la base, très régulièrement convexe, à bord antérieur profondément échancré en arc simple et profond, à lobe médian antérieur nul. Sculpture thoracale est composée d'une ponctuation très fine et éparse, peu perceptible sur le fond chagriné et régulièrement pubescent. Saille prosternale parallèle. Convexité du prothorax très régulière, sans dépressions latérales; les côtés sont atténués en ligne légèrement arquée depuis la base vers le sommet. Ecuillon indistinct. Les élytres sont environ  $1\frac{2}{5}$  fois aussi longs, que larges à la base, environ trois fois aussi longs que la tête et le prothorax réunis, atténués vers l'apex depuis le milieu de la longueur élytrale, ayant la plus grande largeur environ dans la base, avec les épaules peu élevées. Marge latéropostérieure des élytres inerme. Les élytres sont parallèles jusqu'au milieu, puis atténués vers le sommet en ligne régulièrement arquée. Pilosité élytrale dense et courte, régulière; surface élytrale très régulièrement convexe, assez peu luisante, très finement coriacée, à ponctuation irrégulière, très fine et peu dense, à pubescence grise très fine, mais dense et très régulière. Carène humérale des élytres nulle. Apex élytral assez largement et conjointement arrondi. Ornementation élytrale spéciale nulle. Hanches postérieures à l'angle latéropostérieur subarrondi au sommet, qui est assez aigu. Pattes et palpes obscurs. Ongles des tarses et les derniers articles des tarses noirs.

Observation: Cette espèce est bien remarquable à cause de pubescence du dessus, qui est très dense, très fine, mais très régulière sur toute la surface.

**56. *Trachys* (s. str.) *tiwiana* Obenb. Sborník Entom. Odd. Nár. Mus. Praha, VI, 49, 1928, p. 26, t. 1, fig. 1.**

Syn.: *lucidula* Kerr. (non Fähr.) Voy. Alluaud et Jeannel Afr. or. Ins., Col. VI. Bupr. 1914, p. 244.

Hab.: Afrique or. angl.

**57. *Trachys* (s. str.) *ovis* Kerr. in Sjoestedt, Kilimandjaro-Meru Exp. 7, Col. 3, Bupr. 1905—1906, p. 30—31, t. 1, fig. 9.**

Hab.: Somalie.

**58. *Trachys* (s. str.) *Zambesica* n. sp. (Obenb. l. c. p. 59.)**

Long.: 2.6, lat.: 1.5 mm. Hab.: Zambesi.

Taille ovale, assez convexe, assez courte et assez robuste. Coloration du dessus d'un bleu clair et très luisant, avec quelques reflets violacés. Colora-



tion du dessous d'un bronzé violacé. Pubescence de dessus unicolore, d'un blanc jaunâtre, formant sur les élytres bandes transversales onduleuses et vagues. Tête très large, peu avancée, angle oculofrontal largement arrondi. Epistome assez large. Le front est violet, avec une impression linéaire au milieu; partie interoculaire du front est atténuée en avant. Une assez grande partie des yeux est visible de dessus. Antennes noires. Prothorax environ trois fois plus large que long, ayant sa plus grande largeur environ dans la base, assez fortement atténué en avant en ligne presque droite, à bord antérieur profondément et largement échancré en arc simple, à lobe médian antérieur nul. Sculpture thoracale est composée de quelques mailles fines, distinctes seulement latéralement, la majeure, partie du prothorax étant glabre et très luisante. Saillie prosternale large, courte et parallèle, à peine atténuée en avant. Ecusson très petit. Les élytres sont environ  $1\frac{1}{2}$  fois aussi longs, que larges à la base, environ  $2\frac{1}{2}$  fois aussi longs que la tête et le prothorax réunis, atténués vers l'apex depuis la base, à marge basale normale, ayant la plus grande largeur environ dans la base. Marge latéropostérieure des élytres inerme. Sculpture élytrale est composée d'une ponctuation grossière, mais peu serrée et peu profonde, qui donne à l'insecte une apparence spéciale. Carène humérale des élytres nulle. Apex élytral assez étroitement et conjointement arrondi. Ornementation élytrale est composée de deux bandes transversales et onduleuses, vagues, formées de pilosité d'un blanc clair; cette pilosité est dense; l'autre surface élytrale est presque glabre et très luisante. Hanches postérieures à l'angle latéropostérieur subarrondi. Pattes d'un jaune ocré obscur. Ongles des tarses et les derniers articles des tarses noirs.

**Observation:** Une espèce bien remarquable à cause de coloration d'un bleu très clair et très luisant et à cause de ponctuation élytrale, qui est très grossière et peu dense.

#### 59. *Trachys* (s. str.) *eucyanea* n. sp. (Obenb. l. c. p. 59.)

Long.: 2.4, lat.: 1.6 mm. Hab.: Zululand.

Taille assez déprimée et assez parallèle, subcunéiforme. Luisant. Coloration du dessus d'un bleu un peu violacé sur les élytres, tête et prothorax d'un bleu noirâtre. Coloration du dessous noire. Pubescence de dessus unicolore grise. Tête très large, très courte, très peu avancée, peu déprimée, peu concave. Epistome large et échancré. Le front est large, en trapèze, à dépression linéaire au milieu; partie interoculaire du front est assez large. Seulement un très étroit espace des yeux visible de dessus. Antennes noires. Prothorax environ trois fois plus large que long, ayant sa plus grande largeur dans la base, atténué en avant en ligne droite, à bord antérieur largement échancré en arc bisiné, à lobe médian antérieur faible, mais distinct; une dépression large et transversale avant la marge basale du prothorax. Sculpture thoracale est composée des mailles très fines, peu perceptibles et plus distinctes seulement latéralement. Saillie prosternale subparallèle. Bord basal du prothorax étroitement, mais très distinctement relevé en carène. Ecusson très petit et noir. Les élytres sont environ  $1\frac{1}{2}$  fois aussi longs, que larges à la base, environ  $3\frac{1}{3}$  fois aussi longs que la tête et le prothorax réunis, atténués vers l'apex depuis la moitié basale, subparallèles, ayant la plus grande largeur environ dans la base, avec les épaules un peu élevées. Marge latéropostérieure des élytres inerme. Sculpture élytrale formée d'une ponctuation fovéolée, assez vague, peu profonde, mais grossière, peu serrée. Elytres subparallèles jusqu'au milieu, atténués vers le sommet en ligne arquée. Carène humérale des élytres nulle.

Apex élytral conjointement et assez largement arrondi. Ornementation élytrale est composée de trois bandes onduleuses transversales et claires, argentées et très distinctes, dont la première est incomplète. Hanches postérieures à l'angle latéropostérieur arrondi. Pattes et palpes d'un jaune orangé très clair.

**60. *Trachys* (s. str.) *timida* Fahr. Ins. Caffrar. I, 1851, p. 368.**

Hab.: Gariep.

**61. *Trachys* (s. str.) *Cythaeris* n. sp. (Obenb. l. c. p. 60.)**

Long.: 3, lat.: 1.8 mm. Hab.: Sierra Leone.

Taille peu convexe, subparallèle, assez déprimée. Assez peu luisant. Coloration du dessus d'un bleu violacé un peu noirâtre, à pubescence grise condensée dans une bande postmédiane transverse et une vague bande préapicale, l'autre surface couverte d'une pilosité fine et éparsée, très peu perceptible et noirâtre, obscure. Prothorax noir. Pubescence de dessus unicolore, grise; les espaces à l'apparence glabre couverts d'une pubescence peu visible, obscure, noirâtre. Tête assez large, assez avancée, excavée au milieu. Epistome large, échancré en avant. Le front est en trapèze, avec une ligne impressionnée au milieu; partie interoculaire du front est assez large, atténuée en avant. Antennes noires. Prothorax environ trois fois plus large que long, ayant sa plus grande largeur dans la base, atténué en avant en ligne droite, à bord antérieur profondément échancré en arc simple et profond, à lobe médian antérieur nul. Sculpture thoracale est composée des mailles très fines et très peu distinctes sous la pubescence du fond. Bord postérieur du prothorax distinctement relevé en carène. Ecusson très petit et noir. Les élytres sont environ  $1\frac{3}{5}$  fois aussi longs, que larges à la base, environ trois fois aussi longs que la tête et le prothorax réunis, atténués vers l'apex depuis le milieu, subparallèles, ayant la plus grande largeur environ dans la base, peu convexes. Marge latéropostérieure des élytres inerme. Sculpture élytrale composée d'une ponctuation fovéolée dense et très fine, peu distincte sous la pubescence obscure. Carène humérale des élytres nulle. Apex élytral conjointement et assez largement arrondi. Ornementation élytrale est composée de deux bandes transversales préapicales et flexueuses, formées de pubescence d'un gris jaunâtre; ces bandes sont peu denses et, en général, peu remarquables. Hanches postérieures à l'angle latéropostérieur subaigu. Pattes et palpes d'un jaune ocré clair. Ongles des tarses et les derniers articles des tarses noirs.

**62. *Trachys* (s. str.) *africana* Kerr. in Wytzman, Genera Ins. fasc. XII, 1903, p. 310.**

Hab.: Afrique or. angl.

**63. *Trachys* (s. str.) *Kraatzi* Kerr. Ann. Soc. Entom. Belg. XLIII, 1899, p. 297.**

Hab.: Afrique occ.

**64. *Trachys* (s. str.) *coracina* Fahr. Ins. Caffr. I, 1851, p. 366.**

Hab.: Afrique mer. et or.

**65. *Trachys* (s. str.) *Racilia* n. sp. (Obenb. l. c. p. 60.)**

Long.: 2.1, alt.: 1.3 mm. Hab.: Cap Bonae Spei.

Taille convexe et ovoïde, convexe. Coloration du dessus d'un noir profond et uniforme, assez faiblement luisant. Coloration du dessous noire. Pubescence de dessus unicolore, grise, rare, fine et espacée, formant des ondulations sur

les élytres. Tête très large et plane, sans impression médiane distincte, quand on l'observe l'insecte de dessus. Epistome assez large et court, échancré en avant. Le front est assez large, avec une impression linéaire fine; partie interoculaire du front est assez large, atténuée en avant en ligne droite. Ligne latérale de la tête, vue de dessus, fait le prolongement simple de la courbure des côtés du prothorax. Antennes noires. Prothorax environ  $3\frac{1}{2}$  fois plus large que long, ayant sa plus grande largeur environ dans la base, atténué en avant en ligne régulièrement arquée, à bord antérieur largement et profondément échancré en arc simple, à lobe médian antérieur nul. Bord postérieur légèrement relevé en carène, avec une dépression prébasale transversale vague. Sculpture thoracale est composée de mailles très peu sensibles sous la pubescence, qui est éparsée, rare, mais bien régulière. Ecusson très petit. Les élytres sont environ  $1\frac{1}{2}$  fois aussi longs, que larges à la base, environ  $3\frac{1}{4}$  fois aussi longs que la tête et le prothorax réunis, atténués vers l'apex depuis le milieu de la longueur, subparallèles, ayant la plus grande largeur environ dans les épaules, très régulièrement convexes. Marge latéropostérieure des élytres inermes. Sculpture élytrale est formée d'une ponctuation superficielle et fine, espacée, peu distincte sous la pubescence rare élytrale. Carène humérale des élytres nulle. Apex élytral assez largement et conjointement arrondi. Ornementation élytrale est composée de trois bandes flexueuses et transversales, formées de pilosité rare et argentée, très régulière, mais peu dense. Hanches postérieures à l'angle latéropostérieur subaigu. Pattes et palpes obscurs.

66. *Trachys* (s. str.) *Tschoffeni* Kerr. Ann. Soc. Entom. Belg. XL, 1896, p. 314.

Hab.: Congo.

67. *Trachys* (s. str.) *dasytricha* n. sp. (Obenb. l. c. p. 61.)

Long.: 2,8, lat.: 1,6 mm. Hab.: Mashonaland.

Taille ovale, assez allongée, subparallèle, assez peu convexe. Assez peu luisant. Coloration du dessus d'un noir profond et uniforme. Coloration du dessous noire. Pubescence de dessus unicolore, argentée et assez dense, formant des ondulations sur les élytres. Tête très large, déprimée au milieu, assez avancée. Epistome large et échancré en avant. Le front est déprimé, le long des yeux et au milieu; partie interoculaire du front est assez large, atténuée en avant, bords oculo-frontaux légèrement caréniformes. Antennes noires. Prothorax environ quatre fois plus large que long, ayant sa plus grande largeur environ dans la base, faiblement atténué en avant, à bord antérieur échancré en arc bisinué et très large, à lobe médian antérieur bien distinct et large. Sculpture thoracale est composée de mailles très fines, presque indistinctes sous la pubescence. Saillie prosternale assez large, un peu sinueusement atténuée en avant. Bord latéropostérieur du prothorax légèrement relevé en carène. Ecusson ponctiforme. Les élytres sont environ  $1\frac{3}{5}$  fois aussi longs, que larges à la base, environ  $2\frac{2}{3}$  fois aussi longs que la tête et le prothorax réunis, atténués vers l'apex depuis le milieu de la longueur, ayant la plus grande largeur environ dans la base, parallèles et longs. Marge latéropostérieure des élytres inermes. Sculpture élytrale fine et bien peu distincte sous la pubescence élytrale. Pilosité élytrale relativement dense, formée des poils fins et courbés, argentés et clairs sur les ornements, obscurs, noirâtres et peu visibles sur les parties à l'apparence glabre. Carène humérale des élytres nulle. Apex élytral assez

étroitement et conjointement arrondi. Ornementation élytrale est composée de fascies blanches onduleuses et transversales, simples, sans points semblables isolés préapicaux; ces bandes sont assez larges et elles imitent assez bien les bandes du *Trachys minuta* L., espèce bien connue de l'Europe. Hanches postérieures à l'angle latéropostérieur arrondi. Pattes et palpes obscurs.

**68. *Trachys* (s. str.) *Psecas* n. sp. (Obenb. l. c. p. 61.)**

Taille allongée, étroite, subparallèle et peu convexe. Luisant. Coloration du dessous noire. Pubescence de dessus unicolore, blanche, assez longue et assez dense, très distincte sur la tête et le prothorax. Tête peu large, creusée au milieu. Yeux peu convexes, obliques. Epistome assez étroit. Le front est obliquement atténué en avant, concave; partie interoculaire du front est en trapèze, avec une ligne fine médiane impressionnée au milieu. Antennes noires. Prothorax environ trois fois plus large que long, ayant sa plus grande largeur environ dans la base, atténué en avant en ligne droite, à bord antérieur profondément échancré en arc bisinuée, à lobe médian antérieur assez distinct. Bord postérieur finement relevé en carène. Sculpture thoracale est peu distincte; surface thoracale très luisante, pubescence rare et extrêmement fine. Saillie prosternale assez large et subparallèle. Ecusson très petit. Les élytres sont environ  $1\frac{2}{3}$  fois aussi longs, que larges à la base, environ  $2\frac{2}{3}$  fois aussi longs que la tête et le prothorax réunis, atténués vers l'apex depuis le milieu, subparallèles, ayant la plus grande largeur environ dans la base, avec les épaules un peu élevées; étroits. Marge latéropostérieure des élytres inerme. Sculpture élytrale formée d'une ponctuation très fine et peu dense, superficielle, peu remarquable. Surface élytrale luisante, pubescence rare. Carène humérale des élytres nulle. Apex élytral assez largement et conjointement arrondi. Ornementation élytrale est composée de fascies transversales blanches et onduleuses, simples, sans points isolés préapicaux. Hanches postérieures à l'angle latéropostérieur des hanches postérieures peu aigu, subarrondi. Pattes et palpes jaunâtres, étroits. Ongles des tarses et les derniers articles noirs.

**68. *Trachys* (s. str.) *Dictynna* n. sp. (Obenb. l. c. p. 61.)**

Long.: 2.4, lat.: 1.4 mm. Hab.: Africa c. or.: Kondu, Bumbuli.

Taille assez ovalaire, assez peu convexe. Très luisant. Coloration du dessus d'un noir luisant. Coloration du dessous noire. Pubescence de dessus très fine, grise; celle de la tête et du prothorax brunâtre, très peu distincte, courte. Pilosité des espaces élytraux entre les bandes d'un noir brunâtre et très peu distinct. Tête assez large, largement excavée au milieu. Epistome large et court. Le front est profondément excavé au milieu, peu large; partie interoculaire du front est en trapèze, avec une ligne médiane impressionnée assez profonde. Antennes noires. Prothorax environ trois fois plus large que long, ayant sa plus grande largeur dans la base, atténué en avant en ligne légèrement arquée, à bord antérieur profondément échancré en arc simple, à lobe médian antérieur nul; bords latéraux étroitement et légèrement défléchis, bord postérieur élevé en carène étroite. Sculpture thoracale est composée de mailles fines et peu serrées, peu remarquables et plus distinctes seulement vers les côtés. Une dépression transversale prébasale, suivant la marge basale du prothorax. Saillie prosternale assez large et subparallèle. Ecusson très petit. Les élytres sont environ  $1\frac{3}{4}$  fois aussi longs, que larges à la base, environ trois fois aussi longs que la tête et le prothorax réunis, atténués vers l'apex depuis le milieu de la

largeur élytrale, ayant la plus grande largeur environ dans la base, puis subsinués. Marge latéropostérieure des élytres inerme. Les élytres sont un peu plus larges que le prothorax, légèrement subdilates dans les épaules, qui sont légèrement élevés, puis subsinués, subparallèles jusqu'au milieu, puis atténués en ligne courbée vers le sommet, qui est assez largement arrondi; ils sont assez peu convexes, subdéprimés, luisants, à sculpture très effacée, superficielle; peu dense et peu remarquable, à pilosité très fine. Carène humérale des élytres nulle. Ornementation élytrale est composée de fascies transversales et onduleuses, simples, sans points isolés, préapicaux; ces fascies sont formées de pubescence rare et très fine et elles sont, en général, peu distinctes; parties entre les bandes sont convertes d'une pilosité grise brunâtre et très peu distincte. Hanches postérieures à l'angle latéropostérieur aigu. Pattes et palpes d'un jaune testacé.

Observation: Un type de cette espèce se trouve dans le Musée de Congo Belge.

**69. Trachys (s. str.) Philomela n. sp. (Obenb. l. c. p. 61.)**

Long.: 2.9, lat.: 1.35 mm. Hab.: Uéllé.

Taille assez large, subcunéiforme, ressemblant un peu à l'espèce *Tr. minuta* L. de l'Europe, peu convexe. Coloration du dessus d'un noir luisant, très légèrement bronzé violacé. Coloration du dessous noire. Pubescence de dessus unicolore, grise, formant sur les élytres un dessin onduleux. Tête profondément excavée et concave. Epistome assez large et court. Le front est assez profondément impressionné au milieu, plus bronzé que l'autre surface. Antennes noires. Prothorax environ trois fois plus large que long, ayant sa plus grande largeur dans la base, atténué en avant en ligne presque droite, à bord antérieur profondément échancré en arc simple, à lobe médian antérieur nul; angles antérieurs du prothorax très aigus, échancrure antérieure très large et profonde. Sculpture thoracale est composée des mailles minuscules et granuliformes peu distinctes et rares. Bord basal étroitement relevé en carène avant une dépression onduleuse transversale, suivant la base. Saillie prosternale assez étroite, étranglée au milieu et dilatée, arrondie au sommet. Ecusson très petit et noir. Les élytres sont environ  $1\frac{2}{3}$  fois aussi longs, que larges à la base, environ  $3\frac{1}{4}$  fois aussi longs que la tête et le prothorax réunis. atténués vers l'apex depuis le milieu, subsinués latéralement, ayant la plus grande largeur environ dans les épaules, qui sont assez élevées. Marge latéropostérieure des élytres inerme. Sculpture élytrale subeffacée sous la pubescence rare; cette pilosité est fine et courte; les élytres sont subparallèles dans la moitié antérieure, assez largement arrondis vers le sommet, qui est assez large. Carène humérale des élytres nulle. Apex élytral assez largement et conjointement arrondi. Ornementation élytrale est composée de fascies transversales blanches simples, sans points isolés semblables préapicaux; ces bandes ne sont pas plus denses que l'autre pubescence élytrale, qui est en général, fine et courte, dense et régulière sur la surface luisante. Hanches postérieures à l'angle latéropostérieur aigu. Pattes et tarses jaunâtres. Ongles des tarses et les derniers articles des tarses noirs.

Observation: Sur la surface on observe chez cette espèce çà et là quelques poils isolés jaunes, mais ils sont tellement rares et sporadiques, qu'on les peut apercevoir qu'avec un aggrondissement très grand et ils disparaissent dans la pilosité des espaces entre les bandes, qui sont couverts de pubescence obscure et peu apparente.



**70. *Trachys* (s. str.) *Mundama* n. sp. (Obenb. l. c. p. 61.)**

Long.: 2, Lat.: 1.1 mm. Hab.: Cameroun: Kamerunberg.

Taille assez allongée, assez peu convexe, subparallèle. Luisant. Coloration du dessus d'un noir très légèrement verdâtre et violacé. Coloration du dessous noire. Pubescence de dessus unicolore, grise, rare, formant sur élytres des bandes vagues. Tête assez large, à l'excavation frontale assez marquée. Epistome assez large. Le front est assez étroit, avec ligne médiane profondément impressionnée; partie interoculaire du front est assez étroite. Une assez grande partie des yeux est visible de dessus. Antennes noires, normales. Prothorax subdéprimé avant l'écusson, au bord postérieur légèrement élevé en carène. Prothorax environ 2.8 fois plus large que long, ayant sa plus grande largeur dans la base, atténué en avant en ligne légèrement arquée, à bord antérieur légèrement échancré en arc simple, à lobe médian antérieur nul, aux angles antérieurs courts et assez peu aigus. Sculpture thoracale est composée des mailles très fines et très peu perceptibles seulement sur les côtés. Saillie prosternale assez étroite, étranglée au milieu et dilatée, arrondie au sommet. Ecusson très petit. Les élytres sont environ  $1\frac{3}{4}$  fois aussi longs, que larges à la base, environ  $2\frac{1}{2}$  fois aussi longs que la tête et le prothorax réunis, atténués vers l'apex depuis le milieu de la longueur élytrale, ayant la plus grande largeur environ dans les épaules, qui sont légèrement élevées. Marge latéropostérieure des élytres inerme. Elytres subparallèles jusqu'au milieu, puis atténués en ligne régulièrement courbée vers l'apex, qui est assez largement arrondi. Sculpture élytrale subéffacée, très fine, peu distincte, peu dense; surface élytrale luisante. Carène humérale des élytres nulle. Ornementation élytrale est composée de trois bandes transversales, vagues mais distinctées, grises, sans points isolés préapicaux; elles sont formées des poils fins, rares et peu denses; les espaces entre les bandes sont couverts d'une pubescence semblable, mais noire et peu perceptible. Hanches postérieures à l'angle latéropostérieur aigu. Pattes et palpes jaunâtres. Ongles des tarses et les derniers articles des tarses noirs.

**71. *Trachys* (s. str.) *Sabirra* n. sp. (Obenb. l. c. p. 61.)**

Long.: 2, lat.: 1 mm. Hab.: Ukerewe. (Legit P. A. Conrads de la Société des Pères Blancs.)

Taille assez allongée, faiblement, mais régulièrement convexe, subparallèle. Coloration du dessus d'un noir luisant un peu violacé. Coloration du dessous noire. Pubescence de dessus unicolore, grise, peu remarquable, fine, celle des espaces entre les bandes élytrales noire. Tête assez large, à l'excavation frontale bien faible. Epistome assez étroit. Le front est assez étroit, subviolacé; partie interoculaire du front est peu large, atténuée en avant, au milieu avec une ligne médiane profondément impressionnée. Seulement une étroite partie des yeux visible de dessus. Antennes noires et normales. Prothorax environ trois fois plus large que long, ayant a plus grande largeur dans la base, atténué en avant en ligne courbée, à bord antérieur légèrement et simplement échancré, à lobe médian antérieur nul, aux angles antérieurs courts et peu aigus; base légèrement relevée en carène. Sculpture thoracale est très peu distincte et subéffacée sous la pilosité rare. Saillie prosternale assez étroite, étranglée au milieu et dilatée, arrondie au sommet. Ecusson ponctiforme. Les élytres sont environ  $1\frac{2}{3}$  fois aussi longs, que larges à la base, environ  $3\frac{1}{2}$  fois aussi longs que la tête et le prothorax réunis, atténués vers l'apex depuis le milieu de la longueur élytrale, ayant la plus grande largeur environ dans les épaules, qui

sont légèrement élevées. Marge latéropostérieure des élytres inerme. Les élytres sont subparallèles jusqu'au milieu, puis arrondis et atténués vers l'apex, qui est assez large. Sculpture élytrale est formée d'une ponctuation irrégulière, médiocre, mais très superficielle. Carène humérale des élytres nulle. Ornementation élytrale est composée d'une bande préapicale flexueuse et d'une bande prémédiane, parfois incomplète; pas de points isolés blancs préapicaux; ces bandes, dont l'antérieure n'est pas distincte que sur le disque, sont formées d'une pubescence rare et fine, argentée, peu condensée. Hanches postérieures à l'angle latéropostérieur aigu. Pattes et palpes jaunâtres. Ongles des tarses et les derniers articles des tarses noirs.

72. *Trachys (s. str.) latifrons* Kerr. Bull. Soc. Entom. Ital. XXXVIII, 1907, p. 104.

Hab.: Erythrée.

73. *Trachys (s. str.) evanescens* Fähr. Ins. Caffr. I, 1851, p. 369.

Hab.: Afrique mér.

74. *Trachys (s. str.) argenteosparsa* Théry. Ann. Soc. Ent. Fr. LXVI, 1897, p. 367.

Hab.: Sierra Leone.

75. *Trachys (s. str.) Jacobi* Théry. Ann. et Bull. Soc. Ent. Belg. LXVII, 1927, p. 42—43, Textfig. 3.

Hab.: Abessynie.

76. *Trachys (s. str.) Bedfordi* Théry. Bull. Soc. Ent. Egypte, 1929, p. 143.

Hab.: Sudan.

77. *Trachys (s. str.) Patrizziana* Théry. Ann. Mus. Civ. Stor. Nat. Genova, LII, 1927, p. 243—244, Textfig.

Hab.: Somalie Ital.

79. *Trachys (s. str.) proflata* n. sp. (Obenb. l. c. p. 63.)

Long.: 2.5, lat.: 1.5 mm. Hab.: Transvaal.

Taille très régulièrement convexe, en ovale allongé; très luisant. Coloration du dessus d'un bronzé cuivreux très clair. Coloration du dessous d'un bronzé cuivreux. Pubescence de dessus unicolore, grise, peu dense, assez longue, un peu laineuse et régulière. Tête vue de dessus presque sans excavation perceptible, subplane. Epistome court et large, chagriné. Le front est large, avec une ligne enfoncée médiane; partie interoculaire du front est large, en trapèze atténué en avant; le fond du front et très luisant et presque sans sculpture perceptible, à pubescence fine et argentée, espacée. Antennes très courtes et noires. Prothorax  $3\frac{1}{2}$  fois plus large que long, ayant sa plus grande largeur dans la base, atténué en avant en ligne droite, à bord antérieur échancré en arc large et simple, à lobe médian antérieur nul; côtés du prothorax assez faiblement atténués en avant. Sculpture thoracale est subéffacée et le prothorax est, ainsi que la tête, très luisant, à pubescence fine et éparse. Bord posté-

rieur est peu sensiblement relevé, la surface thoracale est très régulièrement convexe. Saillie prosternale large et subparallèle, presque aussi large en avant qu'en arrière, fortement arrondie au bout, stries prosternales droites, parallèles. Ecusson très petit et noir. Les élytres sont environ  $1\frac{2}{3}$  fois aussi longs, que larges à la base, environ  $2\frac{1}{2}$  fois aussi longs que la tête et le prothorax réunis, atténués vers l'apex depuis le milieu de la longueur élytrale, ayant la plus grande largeur environ dans les épaules, qui sont peu convexes. Marge latéropostérieure des élytres inerme. Les élytres sont parallèles dans la moitié antérieure, puis atténués vers le sommet, qui est assez large, très régulièrement arrondis latéralement, sans sinuosité posthumérale. Sculpture élytrale est formée d'une ponctuation irrégulière et fine, subéffacée et superficielle. Carène humérale des élytres nulle. Ornementation élytrale est composée de pubescence, formante un dessin assez clair et assez distinct, les ondulations transversales et onduleuses étant un peu plus denses que la pilosité semblable argentée des espaces intermédiaires. Hanches postérieures à l'angle latéropostérieur subarrondi au sommet. Pattes noirâtres. Ongles des tarses et les derniers articles des tarses noirs.

Observation: Une espèce facile à reconnaître à cause de coloration très gaie et forme très régulièrement ovale.

**79. Trachys (s. str.) Arxa n. sp. (Obenb. l. c. p. 64.)**

Long.: 2.5, lat.: 1.5 mm. Hab.: Natal.

Taille assez large, assez déprimée, cunéiforme. Coloration du dessus d'un bronzé violacé très obscur, un peu brunâtre, assez luisant. Coloration du dessous noire. Pubescence de dessus unicolore, grise, assez courte, légèrement jaunâtre, formant sur les élytres un dessin onduleux. Tête assez peu large, profondément excavée et impressionnée. Epistome large et court, finement chagriné. Le front est en trapèze, avec une impression profonde linéaire; partie interoculaire du front est assez large, les bords oculofrontaux sont subcarénés. Yeux peu convexes et assez aplanis. Antennes noires, courtes, normales. Prothorax environ quatre fois plus large que long, ayant sa plus grande largeur dans la base, très court, atténué en avant en ligne courbée, à bord antérieur échancré en arc presque simple, à lobe médian antérieur peu distinct, assez fortement atténué en avant, légèrement défléchi latéralement. Sculpture thoracale est composée des mailles fines et larges presque effacées. Bord postérieur à peine relevé en carène. Saillie prosternale avec les lignes latérales droites, distinctement convergeantes en avant, assez peu large. Ecusson très petit et noir. Les élytres sont environ  $1\frac{1}{2}$  fois aussi longs, que larges à la base, environ  $3\frac{1}{2}$  fois aussi longs que la tête et le prothorax réunis, atténués vers l'apex depuis le milieu de la longueur élytrale, ayant la plus grande largeur environ dans les épaules, qui sont assez élevées. Marge latéropostérieure des élytres inerme. Sculpture élytrale est formée de ponctuation assez dense et assez forte, mais superficielle. Carène humérale des élytres nulle. Apex élytral assez largement arrondi. Ornementation élytrale est composée de trois bandes très flexueuses et assez distinctes, les espaces entre les bandes à l'apparence glabre. Hanches postérieures à l'angle latéropostérieur subarrondi. Pattes et palpes d'un jaune ocré et très clair. Ongles des tarses et les derniers articles des tarses noirs.

**80. Trachys (s. str.) Procris n. sp. (Obenb. l. c. p. 64.)**

Long.: 2.6, lat.: 1.4 mm. Hab.: Uellé.

Taille assez étroite, peu convexe. Assez luisant. Coloration du dessus d'un bronzé violacé très obscur. Coloration du dessous noire. Pubescence de dessus unicolore, grise, assez longue, assez obscure, formant sur les élytres un dessin ondulaux. Tête assez large, excavée antérieurement. Epistome assez large. Le front est relativement, avec une ligne médian enfoncée; partie interoculaire du front est en trapèze; bords oculofrontaux arrondis. Antennes noires et courtes, normales. Prothorax environ  $3\frac{1}{2}$  fois plus large que long, ayant sa plus grande largeur dans la base, atténués en avant en ligne légèrement courbée, à bord antérieur nettement et distinctement échancré en arc profond, large et simple; à lobe médian antérieur nul. Latéralement assez peu atténué en avant, avec les angles antérieurs avancés. Sculpture thoracale est subéffacée, peu distincte. Saillie prosternale assez large, assez fortement arrondie au sommet; les lignes latérales étant droites, distinctement convergeantes en avant. Bords latéraux du prothorax sont légèrement et étroitement défléchis, bord basal est distinctement relevé en carène. Ecusson petit, noir. Les élytres sont environ  $1\frac{3}{5}$  fois aussi longs, que larges à la base, environ trois fois aussi longs que la tête et le prothorax réunis, atténués vers l'apex depuis le milieu de la longueur élytrale, ayant la plus grande largeur environ dans les épaules, qui sont assez élevées. Marge latéropostérieure des élytres inerme. Sculpture élytrale est formée d'une ponctuation irrégulière et assez dense, mais fine et subéffacée. Carène humérale des élytres nulle. Apex élytral assez largement arrondi. Ornementation élytrale est composée de trois bandes flexueuses assez peu distinctes. Hanches postérieures à l'angle latéropostérieur subarrondi. Pattes et palpes d'un noir un peu brunâtre, très obscurs. Ongles des tarses et les derniers articles des tarses noirs.

**81. *Trachys* (s. str.) *argyroneta* Obenb.** Časopis Čs. Spol. Entom. XXVII, 1930, p. 118.

Hab.: Cameroun.

**82. *Trachys* (s. str.) *Paphne* n. sp. (Obenb. l. c. p. 64.)**

Long.: 2.5, lat.: 1.3 mm. Hab.: Zululand.

Taille assez petite, ovulaire. Coloration du dessus d'un bronzé obscur et luisant. Coloration du dessous noirâtre. Pubescence de dessus unicolore, grise et peu régulière, assez dense, fine. Tête assez peu large, assez faiblement excavée. Epistome assez large et chagriné. Le front est en trapèze, avec une ligne enfoncée médiane; partie interoculaire du front est relativement assez peu large. Antennes noires et normales. Prothorax de la même largeur que les élytres, régulièrement convexe, avec les angles antérieurs courts, environ  $3\frac{1}{2}$  fois plus large que long, ayant sa plus grande largeur dans la base, atténué en avant en ligne légèrement arquée, au bord antérieur échancré en ligne nettement bisinuée, à lobe médian antérieur peu distinct. Sculpture thoracale est composée de mailles fines et peu distinctes. Base du prothorax étroitement relevée en carène, surtout avant l'écusson. Saillie prosternale avec les stries latérales parallèles; assez large. Ecusson très petit et noir. Les élytres sont parallèles jusqu'au milieu, puis atténués en ligne régulièrement arquée; ils sont environ  $1\frac{3}{5}$  fois aussi longs, que larges à la base, environ  $3\frac{2}{3}$  fois aussi longs que la tête et le prothorax réunis, atténués vers l'apex depuis le milieu de la longueur élytrale, ayant la plus grande largeur environ dans les épaules, qui

sont élevées. Marge latéropostérieure des élytres inerme. Sculpture élytrale formée d'une ponctuation assez fine et irrégulière, mais superficielle et assez effacée. Carène humérale des élytres nulle. Apex élytral assez largement arrondi. Ornementation élytrale est composée de trois bandes flexueuses et transversales, formées de pubescence fine et assez peu dense, les espaces intermédiaires étant de l'apparence glabre. Hanches postérieures à l'angle latéropostérieur subarrondi au sommet. Pattes et palpes d'un jaune roux et très clair. Ongles des tarses et les derniers articles des tarses noirs.

**83. *Trachys* (s. str.) *Lavinia* n. sp. (Obenb. l. c. p. 64.)**

Long.: 2.5, lat.: 1.5 mm. Hab.: Congo belge: Cap Plate.

Taille ovale, allongée et relativement étroite, régulièrement, mais pas trop convexe. Coloration du dessus d'un bronzé assez obscur, mais luisant. Coloration du dessous noirâtre. Pubescence de dessus unicolore, grise, condensée sur les élytres en un dessin onduleux et étroit. Tête assez distinctement et largement excavée, très large. Epistome large et court, chagriné. Le front est large, avec une ligne médiane impressionnée; partie interoculaire du front est en trapèze assez fortement atténué en avant. Marge oculofrontale légèrement subcarénée. Antennes noires et normales. Prothorax  $3\frac{1}{2}$  fois plus large que long, ayant sa plus grande largeur dans la base, atténué en avant en ligne presque droite, à bord antérieur nettement bisinué et largement échancré, à lobe médian antérieur peu distinct; avec une dépression large transversale antébasale. Sculpture thoracale est composée de mailles arrondies très fines, peu distinctes. Bord postérieur du prothorax nettement relevé. Stries latérales de la saillie prosternale parallèles. Saillie prosternale assez large. Ecusson très petit, noir. Les élytres sont environ  $1\frac{2}{3}$  fois aussi longs, que larges à la base, environ  $3\frac{1}{2}$  fois aussi longs que la tête et le prothorax réunis, atténués vers l'apex depuis la base, assez convexes, ayant la plus grande largeur environ dans les épaules, qui sont peu élevées. Marge latéropostérieure des élytres inerme. Moitié basale des élytres subparallèle. Sculpture élytrale formée d'une ponctuation assez dense et fine, mais superficielle. Carène humérale des élytres nulle. Apex élytral assez étroitement et conjointement arrondi. Ornementation élytrale est composée de trois bandes flexueuses grises, toute la surface élytrale couverte de pubescence semblable, un peu plus obscure et moins claire, beaucoup plus espacée, mais très régulière. Hanches postérieures à l'angle latéropostérieur arrondi au sommet. Pattes et palpes noirs. Ongles des tarses noirs.

**84. *Trachys* (s. str.) *Xanthe* n. sp. (Obenb. l. c. p. 65.)**

Long.: 2.5, lat.: 1.4 mm. Hab.: Natal.

Taille assez allongée, ovale, assez convexe. Coloration du dessus d'un noir violacé et luisant. Coloration de dessous semblable. Pubescence de dessus unicolore, argentée, formant sur les élytres un dessin argenté. Tête subplane, large, assez avancée. Epistome large et transverse, chagriné. Le front est assez large, avec une ligne médiane enfoncée; partie interoculaire du front est en trapèze assez fortement atténuée en avant. Marge oculofrontale arrondie. Antennes noires, normales. Prothorax environ  $3\frac{1}{2}$  fois plus large que long, ayant sa plus grande largeur dans la base, atténué en avant en ligne droite, à bord antérieur assez nettement bisinué et échancré, à lobe médian antérieur assez peu distinct. Angles antérieurs du prothorax très aigus et un peu avancés.



Sculpture thoracale est composée de mailles arrondies et peu sensibles. Bord postérieur du prothorax légèrement et étroitement relevé. Stries latérales de la saillie prosternale parallèles. Saillie prosternale assez large. Ecusson petit et noir. Les élytres sont environ  $1\frac{2}{3}$  fois aussi longs, que larges à la base, environ  $2\frac{2}{3}$  fois aussi longs que la tête et le prothorax réunis, atténués vers l'apex depuis le milieu de la longueur, assez peu convexes, ayant la plus grande largeur environ dans les épaules, qui sont peu élevées. Marge latéropostérieure des élytres inerme. Elytres parallèles jusqu'au milieu, puis arrondis vers le sommet, qui est assez large. Carène humérale des élytres nulle. Apex élytral assez large. Ornementation élytrale est composée de trois bandes flexueuses et transversales argentées, l'autre surface élytrale presque glabre. Hanches postérieures à l'angle latéropostérieur subarrondi au sommet. Pattes et palpes noirs.

**85. *Trachys* (s. str.) *credula* Kerr.** Voy. Alluaud et Jeannel, Afr. or. Ins. Col. VI, Bupr. 1914, p. 242.

Hab.: Kilimandjaro.

**86. *Trachys* (s. str.) *Pyrameis* n. sp.** (Obenb. l. c. p. 65.)

Long.: 2.6, lat.: 1.2 mm. Hab.: Boma Gombe; Katona. (Afr. oc. c.)

Taille allongée, ovulaire. Coloration du dessus d'un bronzé assez clair et luisant, à sculpture subéffacée. Coloration du dessous bronzée. Pubescence de dessus unicolore, grise, éparse, assez longue. Tête à peine déprimée, très large. Epistome assez court. Le front est légèrement déprimé au milieu; partie interoculaire du front est en trapèze; partie extrême antérieure du front est séparée des cavités antennaires et de l'épistome par un rebord relevé en carène fine, formant un »V« très large. Antennes normales, noires. Prothorax environ  $3\frac{1}{2}$  fois plus large que long, ayant sa plus grande largeur dans la base, atténué en avant en ligne droite, à bord antérieur nettement échancré en ligne bisinuée, à lobe médian antérieur bien distinct et large; angles antérieurs du prothorax avancés et aigus. Sculpture thoracale est composée de mailles très régulières, mais subéffacées. Saillie prosternale assez peu large, stries convergeantes en avant en ligne droite. Ecusson très petit, bronzé. Les élytres sont environ  $1\frac{3}{4}$  fois aussi longs, que larges à la base, environ  $2\frac{1}{2}$  fois aussi longs que la tête et le prothorax réunis, atténués vers l'apex depuis le milieu de la longueur, ayant la plus grande largeur environ dans les épaules, qui sont légèrement élevées. Marge latéropostérieure des élytres inerme. Les élytres sont parallèles dans la moitié antérieure, puis assez fortement atténués vers l'apex en ligne légèrement courbée et conjointement et relativement étroitement arrondis au sommet. Carène humérale des élytres nulle. Ornementation élytrale est composée de trois bandes transversales de pubescence éparse et grise. Hanches postérieures à l'angle latéropostérieur arrondi. Pattes et palpes noirâtres, très obscurs.

**87. *Trachys* (s. str.) *Van den Plasi* n. sp.** (Obenb. l. c. p. 65.)

Long.: 2.2, lat.: 1.2 mm. Hab.: Congo belge.

Taille ovulaire et assez large, assez convexe. Coloration du dessus d'un bronzé assez obscur, presque noir et luisant. Coloration du dessous d'un bronzé noirâtre. Pubescence de dessus unicolore, grise, assez rare et assez peu distincte,

assez peu régulière. Tête large et fortement excavée au milieu. Epistome large et chagriné. Le front est au milieu impressionné longitudinalement; partie interoculaire du front est en trapèze assez étroit. Antennes noires et normales. Prothorax environ trois fois plus large que long, ayant sa plus grande largeur dans la base, atténué en avant en ligne arquée, au bord antérieur largement échancré en arc très légèrement bisinué, à lobe médian antérieur peu distinct. Sculpture thoracale est composée de mailles très peu distinctes arrondies. Marge basale du prothorax légèrement relevée en carène; base thoracale déprimée transversalement. Saillie prosternale assez peu large, stries prosternales convergeantes en avant en ligne droite. Ecusson très petit, noir. Les élytres sont environ  $1\frac{2}{3}$  fois aussi longs, que larges à la base, environ  $2\frac{2}{3}$  fois aussi longs que la tête et le prothorax réunis, atténués vers l'apex depuis le milieu de la longueur élytrale, ayant la plus grande largeur environ dans les épaules, qui sont assez élevées. Marge latéropostérieure des élytres inerme. Les élytres sont subparallèles jusqu'au milieu, puis arrondis et atténués vers le sommet, qui est assez étroit. Sculpture élytrale est formée d'une ponctuation grossière et dense, mais superficielle. Carène humérale des élytres nulle. Ornementation élytrale est composée d'un dessin onduleux et vague, formé de trois bandes flexueuses et étroites blanches, peu denses et en général, peu remarquables, dont les espaces intermédiaires sont couverts d'une pubescence obscure, peu distincte et peu visible, un peu brunâtre. Hanches postérieures à l'angle latéropostérieur arrondi. Pattes et palpes d'un jaune clair. Ongles des tarses et les derniers articles des tarses noirs.

Observation: Un type de cette espèce se trouve dans la collection du Musée de Congo belge.

**88. *Trachys* (s. str.) *Marshalli* Théry.** Bull. Soc. Sc. Nat. Maroc. VIII, 1928, p. 192—293, Textfig. 5.

Hab.: Afrique or. anglaise. Ukerewe. (Trouvé par M. P. Conrads, Société des Pères Blancs.)

**89. *Trachys* (s. str.) *Staudingeri* Théry.** Bull. Soc. Sc. Nat. Maroc, XI, 1931, p. 174—175.

Hab.: Afrique or. anglaise.

**90. *Trachys* (s. str.) *argentipilis* Obenb.** Časopis Čs. Spol. Ent. XXVII, 1930, p. 117.

Hab.: Cameroun.

**91. *Trachys* (s. str.) *Sphaxa* n. sp.** (Obenb. l. c. p. 66.)

Long.: 2.8, lat.: 1.75 mm. Hab.: Uganda.

Taille ovale, assez peu convexe. Coloration du dessus d'un bronzé assez obscur et assez luisant. Coloration du dessous d'un noir bronzé. Pubescence de dessus unicolore, grise, fine, assez éparse, formant sur les élytres un dessin onduleux. Tête assez large, assez avancée, peu profondément excavée. Epistome large et chagriné. Le front est assez large, avec une ligne médiane enfoncée; partie interoculaire du front est en trapèze, assez fortement atténuée en

avant; bords oculofrontaux sont nettement, mais légèrement relevés en carène. Antennes noires et normales. Prothorax environ  $3\frac{1}{2}$  fois plus large que long, très large, ayant sa plus grande largeur dans la base, atténué en avant en ligne droite, au bord antérieur très largement échancré en arc simple, à lobe médian antérieur nul. Sculpture thoracale est composée de mailles très fines et peu distinctes; pilosité du prothorax assez inégale, condensée sur le disque en forme de trois bandes longitudinales, étroites et droites. Marge basale du prothorax étroitement marginée, étant légèrement relevée en carène. Saillie prosternale étroite et assez petite, subétranglée entre les hanches; fines stries de cette saillie subsinueuses et convergeantes en avant en ligne sinueuse, rapprochées au milieu. Ecusson très petit, noir. Les élytres sont environ  $2\frac{2}{3}$  fois aussi longs, que larges à la base, environ trois fois aussi longs que la tête et le prothorax réunis, atténués vers l'apex depuis le milieu de la longueur élytrale, ayant la plus grande largeur environ dans les épaules, qui sont un peu élevées. Marge latéropostérieure des élytres inerme. Les élytres sont parallèles jusqu'au milieu, puis largement arrondis vers le sommet, qui est assez étroit. Sculpture élytrale est formée d'une ponctuation assez dense et assez forte, mais irrégulière et subéffacée. Carène humérale des élytres nulle. Ornementation élytrale est composée de trois vagues bandes assez étroites et très onduleuses, formées de pubescence grise, les espaces entre ces bandes étant couverts d'une pubescence semblable, mais noirâtre et peu visible, éparses, mais très régulière. Hanches postérieures à l'angle latéropostérieur arrondi. Pattes et palpes noirs.

**92. *Trachys* (s. str.) *Artaoxa* n. sp. (Obenb. l. c. p. 66.)**

Long.: 2, lat.: 1.1 mm. Hab.: Cap Bonae Spei.

Taille en oval très régulier, plus atténué postérieurement, convexe. Coloration du dessus d'un bronzé cuivreux et assez luisant. Coloration du dessous d'un bronzé cuivreux un peu violacé. Pubescence de dessus unicolore, grise, assez régulière, formant sur les élytres un dessin onduleux très vague. Tête médiocre, à peine déprimée, avancée et assez large. Epistome étroit, plus long que large, chagriné. Le front est étroit, avec une ligne médiane légèrement enfoncée, partie interoculaire du front est en trapèze peu atténué en avant. Antennes noires et normales. Prothorax environ  $3\frac{1}{2}$  fois plus large que long, ayant sa plus grande largeur dans la base, atténué en avant en ligne arquée, à bord antérieur échancré en arc simple et peu profond, à lobe médian antérieur nul; très régulièrement convexe, au bord postérieur nullement relevé en carène. Sculpture thoracale est composée. Marge basale du prothorax non marginée. Saillie prosternale étroite et assez petite, subétranglée entre les hanches, fines stries marginales de cette saillie assez rapprochées, surtout au milieu, où elles sont subsinueuses, convergeantes en avant en ligne sinueuse. Tête et prothorax très régulièrement couverts par une pilosité fine, rare, mais distincte. Ecusson petit, bronzé. Les élytres sont environ  $1\frac{3}{5}$  fois aussi longs, que larges à la base, environ  $2\frac{1}{2}$  fois aussi longs que la tête et le prothorax réunis, atténués vers l'apex depuis le milieu de la longueur élytrale, ayant la plus grande largeur environ dans les épaules, qui sont assez élevées. Marge latéropostérieure des élytres inerme. Les élytres sont très régulièrement convexes, subparallèles jusqu'au milieu, puis atténués en ligne arquée vers le sommet, qui est assez peu large. Carène humérale des élytres nulle. Ornementation élytrale est composée de trois bandes transversales et onduleuses; ces bandes sont peu distinctes et elles sont formées de la même pilosité régulière, fine

et argentée, qui couvre toute la surface élytrale, seulement elle est, sur les bandes élytrales, un peu plus condensée. Hanches postérieures à l'angle latéro-postérieur arrondi. Pattes et palpes noirs.

**93. *Trachys* (s. str.) *Livia* n. sp. (Obenb. l. c. p. 66.)**

Long.: 2.5, lat.: 1.2 mm. Hab.: Usambara.

Taille assez allongée, assez peu convexe, assez acuminée postérieurement, assez peu convexe. Coloration du dessus d'un bronzé doré un peu verdâtre et très luisant. Coloration du dessous d'un bronzé un peu plus obscur. Pubescence de dessus unicolore, grise, riche, formant, sur les élytres, un dessin très vague onduleux. Tête assez large, assez petite, largement excavée au milieu. Epistome large et chagriné. Le front est luisant et verdâtre, avec une ligne médiane enfoncée; partie interoculaire du front est en trapèze. Antennes normales, noires. Prothorax environ trois fois plus large que long, ayant sa plus grande largeur dans la base, atténué en avant en ligne droite, à bord antérieur simplement échancré en arc simple, à lobe médian antérieur nul. Sculpture thoracale est composée de mailles très fines et peu distinctes. Marge basale du prothorax étroitement relevée en carène, ce qu'est bien visible en observant l'insecte sous un certain angle. Saillie prosternale étroite et petite, subétranglée entre les hanches, fines stries marginales de cette saillie rapprochées au milieu, où elles sont subsinueuses, convergeantes en avant en ligne sinueuse. Ecusson minuscule et bronzé. Les élytres sont environ  $1\frac{2}{3}$  fois aussi longs, que larges à la base, environ trois fois aussi longs que la tête et le prothorax réunis, atténués vers l'apex depuis la base, ayant la plus grande largeur environ dans les épaules, qui sont un peu élevées. Marge latéropostérieure des élytres inermes. Sculpture élytrale est formée d'une ponctuation irrégulière et assez dense, mais suboblitérée. Carène humérale des élytrales nulle. Apex élytral assez étroit. Ornementation élytrale est composée de pubescence riche, condensée en deux très vagues et larges bandes transversales, peu flexueuses et, en général, peu distinctement délimitées. Hanches postérieures à l'angle latéropostérieur aigu. Pattes et palpes noirs.

**94. *Trachys* (s. str.) *Zaghra* n. sp. (Obenb. l. c. p. 66.)**

Long.: 2.1, lat.: 1.4 mm. Hab.: Zoululand.

Taille en ovale court et assez convexe, assez atténué postérieurement. Coloration du dessus d'un bronzé cuivreux et assez obscur, luisant. Coloration du dessous d'un bronzé cuivreux un peu plus obscur. Pubescence de dessus unicolore, grise, formant sur les élytres un vague dessin onduleux. Tête large, assez avancée, peu excavée. Epistome large et chagriné. Le front est bronzé clair et luisant, assez étroit; partie interoculaire du front est en trapèze; une ligne assez enfoncée et longitudinale au milieu. Antennes noires et normales. Prothorax environ  $3\frac{1}{2}$  fois plus large que long, ayant sa plus grande largeur dans la base, atténué en avant en ligne, arquée, à bord antérieur échancré en arc presque simple, à lobe médian antérieur très peu marqué; très régulièrement convexe, à pubescence éparse, mais régulière. Sculpture thoracale est composée de mailles très fines, peu marquées. Marge basale du prothorax étroitement relevée en carène. Saillie prosternale étroite et assez petite, subétranglée entre les hanches, fines stries marginales de cette saillie rapprochées au milieu, où elles sont subsinueuses et convergeantes en avant en ligne sinueuse. Ecusson très petit, bronzé. Les élytres sont environ  $2\frac{2}{3}$  fois aussi

longs, que larges à la base, environ  $2\frac{1}{2}$  fois aussi longs que la tête et le prothorax réunis, atténués vers l'apex depuis le milieu de la longueur élytrale, ayant la plus grande largeur environ dans les épaules, qui sont légèrement élevées. Marge latéropostérieure des élytres inerme. Sculpture élytrale assez forte, mais irrégulière et effacée, superficielle, peu marquée. Carène humérale des élytres nulle. Apex élytral assez large. Ornementation élytrale est composée de trois vagues abndes flexueuses et blanches, formées des poils fins et argentés, assez longs, les espaces entre les bandes étant couverts d'une pubescence obscure et peu visible. Hanches postérieures à l'angle latéropostérieur aigu. Pattes et palpes noirs.

**95. *Trachys* (s. str.) *Namithra* n. sp. (Obenb. l. c. p. 66.)**

Long.: 2.2, lat.: 1.5 mm. Hab.: Mashonaland.

Taille ovale, assez peu convexe. Coloration du dessus d'un bronzé brun et obscur, assez luisant. Coloration du dessous d'un noir un peu bronzé. Pubescence de dessus unicolore, blanche, vague. Tête assez large, à peine déprimée (vue de dessus), assez avancée. Epistome étroit, aussi long que large. Le front est orné au milieu d'une dépression linéaire; partie interoculaire du front est en trapèze large et assez fortement atténué en avant. Antennes noires et normales. Prothorax environ  $2\frac{7}{8}$  fois plus large que long, ayant sa plus grande largeur dans la base, atténué la avant en ligne arrondie, à bord antérieur échancré en arc simple, peu profond, à lobe médian antérieur indistinct. Sculpture thoracale est composée de mailles fines et assez larges, mais très peu distinctes. Marge basale du prothorax nullement relevée en carène, alors presque sans bordure marginale. Prothorax atténué en avant en ligne légèrement arquée. Saillie prosternale étroite et petite, subétranglée entre les hanches; fines stries marginales étant assez rapprochées, surtout au milieu, où elles sont subsinueuses, convergeantes en avant en ligne sinueuse. Ecusson très petit, bronzé. Les élytres sont environ  $1\frac{2}{3}$  fois aussi longs, que larges à la base, environ  $2\frac{2}{3}$  fois aussi longs que la tête et le prothorax réunis, atténués vers l'apex depuis le milieu de la longueur élytrale, ayant la plus grande largeur environ dans les épaules, qui sont légèrement élevées. Marge latéropostérieure des élytres inerme. Sculpture des élytres, qui sont assez peu convexes, subparallèles jusqu'au milieu et largement atténués et arrondis vers le sommet, est composée d'une ponctuation grossière, mais assez irrégulière peu profonde, assez dense. Carène humérale des élytres nulle. Apex élytral assez large. Ornementation élytrale est composée de quelques bandes flexueuses, transversales très vagues et peu distinctes, formées de pilosité assez longue et grise, argentée et éparse, mais régulière, les espaces entre les bandes étant couverts d'une pubescence semblable, mais obscure et peu perceptible. Hanches postérieures à l'angle latéropostérieur aigu. Pattes et palpes noirs.

**97. *Trachys* (s. str.) *Lesnei* Théry. Mem. e Est. Mus. Zool. Univ. Coimbra 1934, Ser. I, Nro 77, p. 29—30. Textfig. 15.**

Hab.: Zambesi.

**97. *Trachys* (s. str.) *Porcia* n. sp. (Obenb. l. c. p. 67.)**

Long.: 2, lat.: 1.1 mm. Hab.: Cap Bonae Spei.

Taille en ovale régulier et convexe, allongé et subacuminé postérieurement. Coloration du dessus d'un violacé bronzé, assez luisant. Coloration du



dessous d'un noir un peu bronzé. Pubescence de dessus unicolore, argentée, formant sur les élytres un vague dessin argenté. Tête très large, à dépression linéaire au milieu, subplane. Epistome très large, chagriné. Le front est large; partie interoculaire du front est en trapèze. Antennes noires, normales. Prothorax environ trois fois plus large que long, ayant sa plus grande largeur dans la base, atténué en avant en ligne presque droite, à bord antérieur très faiblement, largement et peu sensiblement échancré en arc bisinué, à lobe médian antérieur assez peu distinct, légèrement avancé et large; angles antérieurs peu avancés. Sculpture thoracale est composée de mailles arrondies peu distinctes. Prothorax convexe, assez large; saillie prosternale étroite et assez petite, subétranglée entre les hanches; fines stries marginales de cette saillie assez rapprochées, surtout au milieu, où elles sont subsinueuses, convergentes en avant en ligne sinueuse. Bord postérieur du prothorax nullement élevé en carène, convexité du prothorax étant très régulière. Ecusson presque invisible, très petit. Les élytres sont environ  $1\frac{2}{3}$  fois aussi longs, que larges à la base, environ  $2\frac{1}{2}$  fois aussi longs que la tête et le prothorax réunis, atténués vers l'apex depuis la base, mais presque parallèles jusqu'au milieu, ayant la plus grande largeur environ dans les épaules, qui sont peu élevées. Marge latéropostérieure des élytres inerme. Sculpture élytrale est formée d'une ponctuation grossière, irrégulière, mais assez dense et superficielle, subeffacée. Carène humérale des élytres nulle. Apex élytral assez étroitement arrondi. Ornementation élytrale est composée de trois bandes vagues, flexueuses et transversales, argentées. Sculpture élytrale subsériale, assez grossière, mais superficielle et vague. Hanches postérieures à l'angle latéropostérieur aigu. Pattes et palpes d'un noir uniforme et profond.

98. *Trachys* (s. str.) *chembana* Théry. Mem. e Estudios Mus. Zool. Univ. Coimbra 1934, Ser. I, Nro 97, p. 30—32, Textfig. 16.

Hab.: Zambesi.

99. *Trachys* (s. str.) *Swiertsrae* n. sp. (Obenb. l. c. p. 67.)

Long.: 2.5, lat.: 1.5 mm. Hab.: Transvaal, Mashonaland. (Salisbury, G. A. K. Marshall — British Museum of Natural History.)

Taille assez robuste, assez trapue, subparallèle et ovale. Coloration du dessus d'un bronzé très obscur, noirâtre, luisant, sans reflets violacés. Coloration du dessous noire. Pubescence de dessus unicolore, grise, assez dense, formant sur les élytres un vague dessin onduleux. Tête assez peu large, vue de dessus presque plane. Epistome peu large, chagriné. Le front est assez étroit, avec une ligne fine médiane enfacée; partie interoculaire du front est en trapèze. Antennes noires. Prothorax environ  $3\frac{1}{2}$  fois plus large que long, ayant sa plus grande largeur dans la base, atténué en avant en ligne presque droite, à bord antérieur échancré en ligne bisinuée, à lobe médian antérieur distinct. Sculpture thoracale est composée de mailles arrondies et très fines. Prothorax atténué en avant en ligne très légèrement arquée, assez court et large. Marge basale du prothorax très étroitement relevée en carène. Saillie prosternale étroite et petite, subétranglée entre les hanches, fines stries marginales de cette saillie assez rapprochées, surtout au milieu, où elles sont subsinueuses, convergentes en avant en ligne sinueuse. Ecusson très petit, bronzé. Les élytres sont environ  $1\frac{1}{2}$  fois aussi longs, que larges à la base, environ  $2\frac{2}{3}$  fois aussi longs que la tête et le prothorax réunis, atténués vers

l'apex depuis le milieu de la longueur élytrale, ayant la plus grande largeur environ dans les épaules, qui sont peu élevées. Marge latéropostérieure des élytres inerme. Les élytres sont larges et faiblement, mais régulièrement convexes, parallèles jusqu'au milieu, puis arrondis et assez fortement atténués vers l'apex, qui est étroit. Sculpture élytrale est formée d'une ponctuation dense et assez fine, irrégulière et superficielle. Carène humérale des élytres nulle. Ornementation élytrale est composée de trois bandes vagues et fleuveuses, formées de pubescence argentée peu condensée, les espaces entre ces bandes étant couverts par une pubescence de la densité semblable, mais obscure et peu perceptible. Hanches postérieures à l'angle latéropostérieur subarrondi. Pattes et palpes d'un noir uniforme et profond.

**100. *Trachys* (s. str.) *Darnotha* n. sp. (Obenb. l. c. p. 67.)**

Long.: 2.5, lat.: 1.1 mm. Hab.: Cap Bonae Spei.

Taille d'un ovale assez large et régulier; forme assez robuste et assez trapue. Coloration du dessus d'un bronzé clair et luisant, sans reflets violacés. Coloration du dessous d'un bronzé obscur. Pubescence de dessus unicolore, grisse, assez peu dense, formant, sur les élytres, un vague dessin onduleux. Tête large, assez plane (vue de dessus). Epistome assez étroit et chagriné. Le front est marqué d'une impression linéaire; partie interoculaire du front est assez étroite, en trapèze. Antennes noires, normales. Prothorax environ quatre fois plus large que long, ayant sa plus grande largeur dans la base, à bord antérieur échancré en ligne légèrement bisinuée, à lobe médian antérieur assez peu distinctement accentué. Sculpture thoracale est composée de mailles très peu distinctes, oblitérées. Prothorax atténué en avant en ligne légèrement arquée, presque droite. Marge basale du prothorax très étroitement relevée en carène. Saillie prosternale étroite et assez petite, subétranglée entre les hanches, fines stries marginales de cette saillie assez rapprochées, surtout au milieu, où elles sont subsinueuses, convergeantes en avant en ligne sinueuse. Tête et prothorax à pubescence très fine, mais éparse et espacée, blanche. Ecusson très petit, bronzé. Les élytres sont environ  $1\frac{2}{3}$  fois aussi longs, que larges à la base, environ trois fois aussi longs que la tête et le prothorax réunis, atténués vers l'apex depuis le milieu de la longueur élytrale, ayant la plus grande largeur environ dans les épaules, qui sont peu élevées. Marge latéropostérieure des élytres inerme. Les élytres sont parallèles jusqu'au milieu, puis arrondis et atténués vers le sommet, qui est assez étroit; sculpture élytrale est formée d'une ponctuation irrégulière et assez grossière, assez dense, mais superficielle et subéffacée. Carène humérale des élytres nulle. Apex élytral assez étroit. Ornementation élytrale est composée de trois bandes, blanches, très onduleuses et vagues, transversales, formées de poils rares et assez courts argentés; les espaces entre ces bandes sont presque glabres ou couverts d'une pubescence obscure et peu visible. Hanches postérieures à l'angle latéropostérieur subarrondi. Pattes et palpes d'un noir uniforme et profond.

**101. *Trachys* (s. str.) *micans* n. sp. (Obenb. l. c. p. 67.)**

Long.: 1.6—2.1, lat.: 0.8—1.2 mm. Hab.: Congo belge.

Taille petite, assez convexe, en ovale allongé, subacuminé postérieurement. Coloration du dessus d'un bronzé cuivreux clair et très luisant. Coloration du dessous d'un bronzé plus obscur. Pubescence de dessus unicolore, argentée, formant sur les élytres un dessin onduleux. Tête large et, vue de

dessus, presque plane, assez avancée. Epistome large et chagriné. Le front est marqué au milieu d'une impression linéaire; partie interoculaire du front est en trapèze assez large et assez fortement atténué en avant. Antennes noires et normales. Prothorax environ trois fois plus large que long, ayant sa plus grande largeur dans la base, atténué en avant en ligne oblique droite, à bord antérieur distinctement échancré en arc bisinué, à lobe médian antérieur bien distinct, au rebord basal nullement relevé en carène. Sculpture thoracale est composée de mailles très fines et peu distinctes. Saillie prosternale parallèle et étroite. Ecusson petit, cuivreux. Les élytres sont environ  $1\frac{3}{5}$  fois aussi longs, que larges à la base, environ  $2\frac{1}{2}$  fois aussi longs que la tête et le prothorax réunis, atténués vers l'apex depuis la base, ayant la plus grande largeur environ dans les épaules, qui sont légèrement élevées. Marge latéropostérieure des élytres inerme. Sculpture élytrale est formée d'une ponctuation irrégulière et assez dense, suboblitérée. Carène humérale des élytres nulle. Apex élytral assez étroit. Ornementation élytrale est composée de trois vagues bandes larges et onduleuses, formées de pubescence argentée assez longue et éparses. Hanches postérieures à l'angle latéropostérieur arrondi. Pattes et palpes noires.

**102. *Trachys* (s. str.) *percauta* Kerr.** in Wytsman, Genera Ins. fasc. XII, 1903, p. 310.

Hab.: Afr. or. angl.

**103. *Trachys* (s. str.) *Dummeri* Théry.** Bull. Soc. Sc. Nat. Maroc, VIII, 1928, p. 193—194, Textfig. VI.

Hab.: Kenya Colony.

**104. *Trachys* (s. str.) *ioccosula* n. sp.** (Obenb. l. c. p. 68.)

Long.: 2.6, lat.: 1.6 mm. Hab.: Congo belge: Albertville.

Taille convexe, ovulaire; atténué vers le sommet depuis la base élytrale. Coloration du dessus d'un bleu clair et très luisant, à majeure partie de la surface glabre. Coloration du dessous d'un bronzé violacé, avec les hanches postérieures bleues latéralement. Pubescence de dessus unicolore, blanche, formant un ornement spécial sur les élytres; l'autre surface glabre. Tête légèrement déprimée au milieu, large, peu avancée. Epistome large et chagriné. Le front est marqué d'une ligne longitudinale enfoncée; partie interoculaire du front est en trapèze, assez atténuée en avant. Antennes noires. Prothorax environ trois fois plus large que long, ayant sa plus grande largeur dans la base, à bord antérieur échancré en arc simple, à lobe médian antérieur nul. Bord postérieur du prothorax à peine relevé. Sculpture thoracale peu distincte. Prothorax atténué en avant en ligne régulièrement courbée; saillie prosternale assez large, stries latérales légèrement rapprochées au milieu. Ecusson minuscule, noir. Les élytres ont environ  $1\frac{2}{3}$  fois aussi longs, que larges à la base, environ trois fois aussi longs que la tête et le prothorax réunis, atténués vers l'apex depuis la base, ayant la plus grande largeur environ dans les épaules, qui sont élevées un peu. Marge latéropostérieure des élytres inerme. Sculpture élytrale formée d'une ponctuation assez fine, irrégulière et médiocre. Les élytres sont atténués depuis la base jusque vers le sommet, qui est assez étroit. Carène humérale des élytres nulle. Ornementation élytrale est toute spéciale:

une bande étroite et longitudinale, située de part et d'autre de la suture, courbée dans le tiers apical en angle droit et prolongée vers les côtés en forme d'une bande transversale et droite; une bande préapicale droite semblable entre cette bande postmédiane et l'apex. Surface (à l'exception des bandes précitées) glabre. Hanches postérieures à l'angle latéropostérieur subarrondi. Pattes et palpes noirs.

**Observation:** Un type de cette espèce se trouve dans la collection du Musée de Congo belge, l'autre dans la mienne. Cette espèce est facilement à reconnaître à cause de coloration bleu claire, tout-à-fait exceptionnelle chez les *Trachys* de l'Afrique.

#### 105. *Trachys* (s. str.) *solivaga* n. sp. (Obenb. l. c. p. 68.)

Lon.: 3, lat.: 1.7 mm. Hab.: Abessynia: Dire Dawa.

Taille grande, assez convexe, élytres subparallèles dans la moitié basale. Coloration du dessus d'un bronzé brun assez luisant. Coloration du dessous d'un bronzé assez obscur. Pubescence de dessus unicolore, très dense, longue, jaune, uniforme. Tête très large, aussi large, que les  $\frac{2}{3}$  de la largeur basale du prothorax. Epistome large et court, chagriné. Le front est largement et profondément excavé; partie interoculaire du front est en trapèze, marquée au milieu d'une ligne longitudinale enfoncée. Antennes noires et normales. Prothorax environ trois fois plus large que long, ayant sa plus grande largeur dans la base, atténué en avant en ligne presque droite, à bord antérieur largement échancré en ligne bisinuée, à lobe médian antérieur distinct, large et peu avancé; les côtés sont très étroitement défléchis. Sculpture thoracale est composée de mailles rondes et assez bien distinctes sur la majeure partie de la surface. Marge basale du prothorax relevée en carène. Saillie prosternale assez large, atténuée en avant en ligne droite. Ecusson petit, bronzé. Les élytres sont environ  $1\frac{2}{3}$  fois aussi longs, que larges à la base, environ  $3\frac{1}{2}$  fois aussi longs que la tête et le prothorax réunis, atténués vers l'apex depuis le milieu de la longueur élytrale, ayant la plus grande largeur environ dans les épaules, qui sont un peu élevées. Marge latéropostérieure des élytres inermes. Les élytres sont régulièrement convexes; la sculpture est formée de ponctuation fine et irrégulière, suboblitérée; ils sont couverts de pubescence très régulière, longue et fine, dense; elle est jaune, mais çà et là on observe des poils isolés brunâtres. Un dessin onduleux n'est pas distinct. Les élytres sont parallèles jusqu'au milieu et puis atténués et arrondis en ligne arquée très régulière. Carène humérale des élytres nulle. Apex élytral largement arrondi. Hanches postérieures à l'angle latéropostérieur aigu. Pattes et palpes d'un jaune ocré clair. Ongles des tarses et les derniers articles des tarses noirs.

#### 106. *Trachys* (s. str.) *Epischia* n. sp.

Long.: 2, lat.: 1.1 mm. Hab.: Rhodesia occ. bor.

Taille petite, ovale, convexe, assez atténuée postérieurement. Coloration du dessus d'un noir un peu bronzé et luisant. Coloration du dessous d'un bronzé noir. Pubescence de dessus unicolore, très égale, fine et jaunâtre, éparse, mais régulière. Tête, vue de dessus, distinctement sillonnée au milieu, très large. Epistome large et chagriné. Le front est sillonné au milieu, à pubescence éparse; partie interoculaire du front est assez large. Antennes noires et normales. Prothorax environ  $3\frac{1}{2}$  fois plus large que long, ayant sa plus grande largeur dans la base, atténué en avant en ligne arquée, à bord antérieur

échancré en ligne bisinuée, à lobe médian antérieur large et distinct, au rebord postérieur légèrement et très étroitement relevé en carène. Sculpture thoracale est composée de mailles très fines et arrondies, mais subéffacées sur le fond très luisant et éparsément pubescent. Saillie prosternale atténuée en avant en ligne droite. Ecusson très petit, bronzé. Les élytres sont environ  $1\frac{1}{2}$  fois aussi longs, qu larges à la base, environ  $2\frac{1}{2}$  fois aussi longs que la tête et le prothorax réunis, atténués vers l'apex depuis la base en ligne régulièrement arquée, ayant la plus grande largeur environ dans la base, subparallèles dans la moitié basale. Marge latéropostérieure des élytres inerme. Sculpture élytrale assez grossière, mais superficielle, irrégulière et subéffacée. Carène humérale des élytres nulle. Apex élytral assez étroitement arrondi. Elytres à sculpture assez grossière et régulière. Ornementation élytrale est composée de pubescence subuniforme et subégale, fine, sans bandes transversales onduleuses. Hanches postérieures à l'angle latéropostérieur subarrondi. Pattes et palpes noirs.

**107. *Trachys* (s. str.) *abietis* Kerr. in Wytsman, Genera Ins. fasc. XII, 1903, p. 310.**

Hab.: Stanley Falls.

Je ne sais pas, comment Keremans soit arrivé à ce nom malheureux: pas une seule *Trachys* vit dans les Conifères et on sait donc depuis longtemps, que les larves de tous les Trachydini vivent dans le parenchyme des feuilles.

**108. *Trachys* (s. str.) *Anthraora* n. sp. (Obenb. l. c. p. 69.)**

Long.: 2.3, lat.: 1.5 mm. Hab.: Pondoland.

Taille assez large, assez cunéiforme, assez atténuée en arrière. Coloration du dessus bleue, celle de la tête et prothorax semblable à celle des élytres. Apex élytral plus violacé; parties couvertes de pilosité jaune sont plus violacées sur le fond. Luisant. Coloration du dessous noire. Pubescence élytrale nulle, sauf les bandes élytrales préapicales jaunes. Tête très largement et distinctement excavée au milieu, avec un sillon médian. Epistome large et chagriné. Le front est assez large, à pubescence jaune rousse; partie interoculaire du front est en trapèze. Antennes noires et normales. Prothorax couvert antérieurement d'une pubescence jaune-rousse, qui forme, de même, trois lignes étroites et longitudinales, distinctes jusque vers la base; moitié basale du prothorax à peu près glabre. Prothorax environ  $3\frac{1}{2}$  fois plus large que long, ayant sa plus grande largeur dans la base, atténué en avant en ligne arquée, à bord antérieur largement échancré en arc légèrement bisiné, à lobe médian antérieur faible, mais distinct; bord postérieur légèrement relevé en carène. Sculpture thoracale est composée de mailles arrondies et suboblitérées. Une dépression transversale suivant la ligne basilaire. Saillie prosternale subparallèle. Ecusson petit, noir. Les élytres sont environ  $1\frac{2}{3}$  fois aussi longs, que larges à la base, environ trois fois aussi longs que la tête et le prothorax réunis, atténués vers l'apex depuis les épaules, qui sont un peu élevées, ayant la plus grande largeur environ dans la base. Marge latéropostérieure des élytres inerme. Sculpture élytrale est formée d'une ponctuation assez forte et irrégulière, peu profonde. Carène humérale des élytres nulle. Apex élytral assez large. Ornementation élytrale est composée de deux bandes dorées très fléxueuses préapicales, dont le fond est d'un violacé vif; l'autre surface élytrale



est à l'apparence glabre, bleue et luisante. Hanches postérieures à l'angle latéropostérieur subaigu. Pattes et palpes noirâtres.

**Observation:** Une espèce très facile à reconnaître à cause de coloration et ornementation élytrale spéciale.

**109. *Trachys* (s. str.) *Sibylla* n. sp. (Obenb. l. c. p. 70.)**

Long.: 2.3, lat.: 1.2 mm. Hab.: Kirumbo (Africa or. c.)

Taille assez ovale, assez large et convexe, assez atténué postérieurement. Coloration du dessus bicolore: tête et pronotum violacés, élytres d'un bleu obscur à l'apex violacé. Luisant. Coloration du dessous d'un noir un peu violacé. Pubescence de dessus unicolore et jaunâtre, formant sur les élytres un dessin onduleux. Tête subplane, large, sillonnée au milieu. Epistome large et chagriné. Le front est en trapèze; partie interoculaire du front est assez large. Antennes noires et normales. Prothorax environ trois fois plus large que long, ayant sa plus grande largeur dans la base, atténué en avant en ligne droite oblique, à bord antérieur échancré profondément en arc presque simple, à lobe médian antérieur indistinct; surface très régulièrement convexe; rebord basal légèrement relevé en carène. Sculpture thoracale est composée de mailles peu distinctes et suboblitérées. Saillie prosternale subparallèle. Ecusson petit, noir. Les élytres sont environ  $1\frac{2}{3}$  fois aussi longs, que larges à la base, environ trois fois aussi longs que la tête et le prothorax réunis, atténués vers l'apex depuis le milieu de la longueur, ayant la plus grande largeur environ dans les épaules, qui sont un peu élevées. Marge latéropostérieure des élytres inerme. Sculpture élytrale formée d'une ponctuation fine et éparse, irrégulière et suboblitérée. Carène humérale des élytres nulle. Apex élytral assez étroitement arrondi. Ornementation élytrale est composée d'une fascie vague et transversale dans le tiers basal des élytres et de deux bandes dorées très flexueuses préapicales; ces bandes sont jaunâtres, sur les parties à l'apparence glabre avec quelques poils jaunâtres. Mentonnière nulle. Hanches postérieures à l'angle latéropostérieur subaigu. Pattes et palpes noirs.

**Observation:** Ressemble beaucoup à l'espèce précédente (*Anthraora* m.), dont il s'éloigne par la forme du prothorax, taille généralement plus convexe, les élytres moins cunéiformes etc. etc.

**110. *Trachys* (s. str.) *Sempronina* n. sp. (Obenb. l. c. p. 70.)**

Long.: 2.8, lat.: 1.5 mm. Hab.: Congo belge.

Taille allongée, élytres parallèles dans la moitié basale; assez peu convexe. Coloration du dessus bicolore: tête et prothorax violacés, élytres d'un bleu assez clair; luisant. Coloration du dessous noire. Pubescence de dessus unicolore, jaunâtre, éparse, formant sur les élytres un vague dessin transversal. Tête très large, largement excavée au milieu. Epistome large et court, chagriné. Le front est marqué d'une ligne enfoncée linéaire; partie interoculaire du front est en trapèze large. Antennes courtes et normales, noires. Prothorax environ trois fois plus large que long, ayant sa plus grande largeur dans la base, atténué en avant en ligne légèrement arquée, à bord antérieur assez faiblement échancré en arc presque simple, à lobe médian antérieur indistinct. Une dépression transversale le long de la base, rebord basal étant légèrement relevé en carène. Sculpture thoracale est composée de mailles arrondies et fines, peu distinctes et suboblitérées. Saillie prosternale distinctement convergeante en avant. Ecusson petit, noir. Les élytres sont environ  $1\frac{3}{4}$

fois aussi longs, qu larges à la base, environ trois fois aussi longs que la tête et le prothorax réunis, atténués vers l'apex depuis les  $\frac{2}{3}$  postérieures, subparallèles, ayant la plus grande largeur environ dans les épaules, qui sont assez élevées. Marge latéropostérieure des élytres inerme. Ponctuation élytrale irrégulière, vague, superficielle, assez grossière. Carène humérale des élytres nulle. Apex élytral assez largement arrondi. Ornementation élytrale est composée d'une seule fascie préapicale plus distincte, une fascie postmédiane oblique n'étant que peu distinctement indiquée. Ces fascies sont formées d'une pubescence jaunâtre et éparsée, fine et assez peu distincte, les espaces à l'apparence glabre étant couverts d'une pubescence grise noirâtre, très peu distincte et visible seulement sous un aggrondissement fort. Hanches postérieures à l'angle postérieur subaigu. Pattes et palpes roux. Ongles des tarses et les derniers articles des tarses noirs.

**111. *Trachys* (s. str.) *Salpia* n. sp. (Obenb. l. c. p. 70.)**

Long.: 2.5, lat.: 1.5 mm. Hab.: Haute Uellé.

Taille assez peu convexe, ovalaire, allongée, assez atténuée postérieurement. Très convexe. Coloration du dessus bicolore: tête et prothorax d'un violacé très obscur, élytres d'un bleu noir très obscur et luisant. Coloration du dessous noire. Pubescence de dessus unicolore, très fine, noire, peu visible, une bande très vague élytrale grise. Tête d'un violacé très obscur; assez étroite, excavée. Epistome large et transversal. Le front est marqué d'une ligne médiane enfoncée; partie interoculaire du front est en trapèze assez atténué en avant. Antennes noires et normales. Prothorax environ trois fois plus large que long, ayant sa plus grande largeur dans la base, atténué en avant en ligne droite, à bord antérieur assez profondément échancré en ligne un peu bisinuée, à lobe médian antérieur peu distinct. Echancrure antérieure thoracique assez étroite. Angles antérieurs aigus. Sculpture thoracale est composée de mailles arrondies fines. Bord basal étroitement relevé en carène; partie basale largement déprimée transversalement. Saillie prosternale distinctement convergeante en avant. Ecusson noir, petit. Les élytres sont environ  $2\frac{2}{3}$  fois aussi longs, que larges à la base, environ trois fois aussi longs que la tête et le prothorax réunis, atténués vers l'apex depuis le milieu, subsinués antérieurement, ayant la plus grande largeur environ dans les épaules, qui sont assez élevées. Marge latéropostérieure des élytres inerme. Carène humérale des élytres nulle. Apex élytral assez étroit. Ponctuation élytrale relativement assez fine, assez forte, très régulière, mais superficielle. Ornementation élytrale est composée d'une seule fascie préapicale. Hanches postérieures à l'angle latéropostérieur subaigu. Pattes et palpes roux. Ongles des tarses et les derniers articles des tarses noirs.

**112. *Trachys* (s. str.) *Pomona* n. sp. (Obenb. l. c. p. 70.)**

Long.: 2.8, lat.: 1.8 mm. Hab.: Congo belge: Albertville.

Taille grande, assez robuste, peu convexe, moitié antérieure des élytres subparallèle. Luisant. Coloration du dessus d'un noir légèrement bronzé, unicolore. Coloration du dessous noire. Pubescence de dessus unicolore, longue, très fine, jaune, formant sur les élytres un dessin onduleux. Tête faiblement subdéprimée, à pilosité jaune, ainsi que le prothorax. Epistome large, transversale, chagriné. Le front est large, marqué d'une ligne médiane enfoncée; partie interoculaire du front est en trapèze, assez fortement atténué en avant. Antennes noires, normales. Prothorax environ  $3\frac{1}{2}$  fois plus large que long,

ayant sa plus grande largeur dans la base, atténué en avant en ligne oblique et droite, à bord antérieur fortement échancé en arc simple et profond, à lobe médian antérieur nul, aux angles antérieurs aigus et avancés, au bord postérieur légèrement relevé en carène. Sculpture thoracale est composée de mailles très fines, oblitérées. Saillie prosternale subétranglée entre les hanches et à côtés convergeants en avant et l'espace compris entre eux étroit, partie apicale de la saillie prosternale subdilataée. Écusson petit, noir. Les élytres sont environ  $1\frac{3}{5}$  fois aussi longs, que larges à la base, environ  $2\frac{2}{3}$  fois aussi longs qu la tête et le prothorax réunis, atténués vers l'apex depuis le milieu, subparallèles dans la partie basale, ayant la plus grande largeur environ dans les épaules, qui sont assez élevées. Marge latéropostérieure des élytres inerme. Ils sont luisants, à ponctuation grossière, irrégulière, assez dense, mais superficielle. Carène humérale des élytres nulle. Ornementation élytrale est composée de trois bandes flexueuses d'un jaune grisâtre, l'autre surface à pubescence semblable, mais peu perceptible, noirâtre. Hanches postérieures à l'angle latéropostérieur assez largement arrondi. Pattes et palpes obscurs.

**Observation:** Les types de cette espèce se trouvent dans la collection du Musée de Congo Bolge et dans la mienne.

### 113. *Trachys* (s. str.) *Solaria* n. sp. (Obenb. l. c. p. 71.)

Long.: 3, lat.: 1.8 mm. Hab.: Africa mer. occ.

Taille ovale, assez peu convexe. Luisant. Coloration du dessus d'un bronzé assez clair et luisant. Coloration du dessous d'un bronzé un peu plus obscur. Pubescence de dessus unicolore, assez dense, d'un jaune doré, par places un peu brunâtre. Tête vue de dessus subplane, assez grande, à pubescence régulière, rare. Epistome très large, court, chagriné. Le front à l'impression médiane étroite et superficielle; partie interoculaire du front est en trapèze assez fortement atténué en avant. Antennes noires et normales. Prothorax environ trois fois plus large que long, ayant sa plus grande largeur dans la base, atténué en avant en ligne presque droite, à bord antérieur échancré en arc subsinué, à lobe médian antérieur distinct, mais peu marqué et large, bord postérieur légèrement relevé en carène. Sculpture thoracale est composée de mailles larges, arrondies et très fines, peu marquées sous la pubescence régulière. Prothorax régulièrement convexe, atténué en avant en ligne droite. Saillie prosternale subétranglée entre les hanches et à côtés convergeants en avant, l'espace entre eux étant étroit et partie apicale de la saillie prosternale subdilataée, cette saillie en général assez grande et relativement large. Écusson très petit, noir. Les élytres sont environ  $1\frac{2}{3}$  fois aussi longs, que larges à la base, environ  $2\frac{1}{2}$  fois aussi longs que la tête et le prothorax réunis, atténués vers l'apex depuis le milieu de la longueur, subparallèles antérieurement, ayant la plus grande largeur environ dans les épaules, qui sont légèrement élevées. Marge latéropostérieure des élytres inerme. Ponctuation élytrale grossière et régulière, mais peu dense et peu profonde, subéffacée. Carène humérale des élytres nulle. Apex élytral assez largement arrondi. Ornementation élytrale est composée de bandes flexueuses et transversales, assez distinctes. Élytres convexes, en ovale allongé. Espaces entre les bandes élytrales couverts d'une pubescence jaune d'une nuance un peu plus obscure que celle des bandes transversales. Hanches postérieures à l'angle latéropostérieur arrondi. Pattes et palpes d'un brun noirâtre, obscurs. Ongles des tarses et les derniers articles des tarses noirs.

**114. *Trachys* (s. str.) *capicola* n. sp. (Obenb. l. c. p. 71.)**

Long.: 2, lat.: 1.2 mm. Hab.: Cap Bonae Spei.

Taille petite, en ovale régulier et convexe; luisant. Coloration du dessus d'un bronzé noirâtre et luisant. Coloration du dessous d'un bronzé un peu plus obscur. Pubescence de dessus unicolore, assez dense, d'un jaune doré, formant, sur les élytres, un dessin onduleux. Tête petite, subplane, à l'impression médiane étroite et superficielle. Epistome large et transversal, chagriné. Le front est assez large, marqué d'une ligne enfoncée médiane; partie interoculaire du front est en trapèze assez atténué en avant. Tête et prothorax à pubescence jaune assez dense, un peu irrégulière et fine. Antennes noires, normales. Prothorax atténué latéralement en avant en ligne droite, très régulièrement convexe, luisant. Prothorax environ trois fois plus large que long, ayant sa plus grande largeur environ dans la base, atténué en avant, à bord antérieur faiblement échancré en ligne fortement bisinuée, à lobe médian antérieur distinct, mais large et court. Rebord basal nullement relevé en carène. Sculpture thoracale est composée de mailles très peu sensibles, oblitérées. Saillie prosternale subétranglée entre les hanches et à côtés convergents en avant, l'espace entre eux étant étroit et partie apicale de cette saillie étant subdilatée, étroite et fortement atténuée en avant. Ecusson petit et noir. Les élytres sont environ  $1\frac{1}{2}$  fois aussi longs, que larges à la base, environ  $2\frac{2}{3}$  fois aussi longs que la tête et le prothorax réunis, atténués vers l'apex depuis le milieu, subparallèles antérieurement, ayant la plus grande largeur environ dans les épaules, qui sont un peu élevées. Marge latéropostérieure des élytres inerme. Elytres à ponctuation assez fine, assez éparses et irrégulières. Carène humérale des élytres nulle. Apex élytral assez étroitement arrondi. Ornementation élytrale est composée de bandes flexueuses et transversales, assez distinctes. Hanches postérieures à l'angle latéropostérieur arrondi. Pattes et palpes obscurs. Ongles des tarses et les derniers articles des tarses noirs.

**115. *Trachys* (s. str.) *Baumiella* n. sp. (Obenb. l. c. p. 71.)**

Long.: 1.9, lat.: 1.1 mm. Hab.: Senegal (Dr. Jiří Baum lgt.): Dakkar,

Taille ovale, assez convexe, allongée. Coloration du dessus d'un bronzé cuivré obscur et luisant. Coloration du dessous d'un bronzé obscur. Pubescence de dessus unicolore, espacée, d'un jaune pâle; longue, fine, assez irrégulière. Tête, vue de dessus, fortement impressionnée au milieu. Epistome large et court, chagriné. Front à dépression médiane profonde; partie interoculaire du front est en trapèze atténué en avant. Antennes noires et normales. Prothorax environ trois fois plus large que long, ayant sa plus grande largeur dans la base, atténué en avant en ligne légèrement arquée, à bord antérieur faiblement échancré en arc bisiné, à lobe médian antérieur net et bien distinct; rebord basal très légèrement relevé en carène. Sculpture thoracale est composée de mailles arrondies peu distinctes et oblitérées. Saillie prosternale subétranglée entre les hanches et à côtés convergents en avant, l'espace entre eux étant étroit et partie apicale de cette saillie étant subdilatée. Ecusson très petit, noir. Les élytres sont environ  $1\frac{2}{3}$  fois aussi longs, que larges à la base, environ  $2\frac{2}{3}$  fois aussi longs que la tête et le prothorax réunis, atténués vers l'apex depuis le milieu, subparallèles antérieurement, ayant la plus grande largeur environ dans les épaules, qui sont légèrement élevées. Marge

latéropostérieure des élytres inerme. Elytres atténués en arrière en ligne régulièrement arquée. Ponctuation élytrale assez dense, mais grossière et superficielle. Carène humérale des élytres nulle. Apex élytral relativement étroit. Ornementation élytrale est composée de bandes flexueuses transversales, peu distinctes. Hanches postérieures à l'angle latéropostérieur arrondi. Pattes et palpes obscurs.

**Observation:** Dédié à mon collègue et excellent ami, M. le Dr. Jiří Baum de Prague, qui a trouvé cette espèce pendant son séjour à Sénégal en 1928.

**116. *Trachys* (s. str.) *Tethis* n. sp. (Obenb. l. c. p. 71.)**

Long.: 2.6, lat.: 1.7 mm. Hab.: Congo belge: Mongende; Congo du Lemba.

Taille un peu allongée, assez peu convexe, un peu cunéiforme. Coloration du dessus d'un bronzé obscur et luisant. Coloration du dessous noirâtre. Pubescence de dessus unicolore, assez longue, d'un jaune grisâtre. Tête très large, vue de dessus presque plane, légèrement excavée. Epistome large et court, chagriné. Le front est marqué d'une ligne médiane assez faible; partie interoculaire du front est en trapèze assez atténué en avant. Antennes noires et normales. Prothorax environ trois fois plus large que long, ayant sa plus grande largeur dans la base, atténué en avant en ligne presque droite, à bord antérieur très nettement bisinué, à lobe médian antérieur distinct. Bord postérieur nettement relevé en carène. Sculpture thoracale est composée de mailles très peu distinctes et oblitérées. Saillie prosternale subétranglée entre les hanches et à côtés convergeants en avant, l'espace entre eux étant étroit et partie apicale de cette saillie étant subdilataée. Écusson très petit. Les élytres sont environ  $1\frac{3}{4}$  fois aussi longs, que larges à la base, environ trois fois aussi longs que la tête et le prothorax réunis, atténués vers l'apex depuis le milieu, subparallèles antérieurement, ayant la plus grande largeur environ dans les épaules, qui sont légèrement élevées. Marge latéropostérieure des élytres inerme. Sculpture des élytres oblitérée, formée de ponctuation irrégulière, fine et superficielle. Carène humérale des élytres nulle. Apex élytral assez largement arrondi. Ornementation élytrale est composée de trois bandes flexueuses et transversales jaunes et vagues, les espaces entre les bandes étant couverts d'une pubescence semblable, mais un peu plus brunâtre et plus obscure. Hanches postérieures à l'angle latéropostérieur arrondi. Pattes et palpes d'un brun ocré très clair. Ongles des tarses et les derniers articles des tarses noirs.

**Observation:** Un type de cette espèce se trouve dans la collection du Musée de Congo Belge, l'autre dans la mienne.

**117. *Trachys* (s. str.) *Praocris* n. sp. (Obenb. l. c. p. 71.)**

Long.: 2.5, lat.: 1.5 mm. Hab.: Angola: Ukerewe. (Legit P. A. Conrad de la Société des Pères Blancs.)

Taille ovale, un peu allongée, peu convexe. Coloration du dessus d'un bronzé assez obscur et luisant. Coloration du dessous plus obscure. Pubescence de dessus unicolore, courte, assez dense, d'un gris jaunâtre. Tête large, largement et peu profondément excavée antérieurement. Epistome large et court, chagriné. Le front est marqué au milieu d'une ligne enfoncée longitudinale; partie interoculaire du front est en trapèze, atténué en avant. Antennes noires, courtes normales. Prothorax environ trois fois plus large que long, ayant sa



plus grande largeur dans la base, atténué en avant en ligne légèrement arquée, à bord antérieur échancré en arc presque simple, à lobe médian antérieur à peine indiqué, aux angles antérieurs aigus. Rebord basal légèrement relevé en carène. Sculpture thoracale est composée de mailles très fines et peu distinctes, oblitérées. Saillie prosternale subétranglée entre les hanches et à côtés convergents en avant, l'espace entre eux étant étroit et partie apicale de cette saillie subdilaté. Ecusson très petit, bronzé. Les élytres sont environ  $1\frac{2}{3}$  fois aussi longs, que larges à la base, environ  $2\frac{2}{3}$  fois aussi longs que la tête et le prothorax réunis, atténués vers l'apex depuis le milieu, subparallèles antérieurement, ayant la plus grande largeur environ dans les épaules, qui sont un peu élevées. Marge latéropostérieure des élytres inerme. Ponctuation élytrale dense, irrégulière, grossière, mais assez superficielle. Carène humérale des élytres nulle. Apex élytral assez large. Ornementation élytrale est composée de trois bandes transversales et très flexueuses, les espaces entre ces bandes étant couverts d'une pubescence noirâtre peu visible. Hanches postérieures à l'angle latéropostérieur arrondi. Pattes d'un brun assez obscur, palpes d'un jaune clair. Ongles des tarses et l'article dernier noirs.

**118. *Trachys* (s. str.) *Gérardi* n. sp. (Obenb. l. c. p. 71.)**

Long.: 4, lat.: 1.8 mm. Hab.: Elisabethville (Congo belge).

Taille en ovale assez allongé et assez peu convexe. Coloration du dessus d'un bronzé un peu obscur et luisant. Coloration du dessous bronzé. Pubescence de dessus unicolore, très dense, d'un jaune clair. Tête très large, vue de dessus à peine déprimée. Epistome très large, au moins deux fois aussi large que long. Le front est marqué d'une impression linéaire nette; partie interoculaire du front est en trapèze assez atténué en avant. Antennes noires et normales. Prothorax fortement atténué en avant en ligne presque droite. Prothorax environ  $3\frac{1}{2}$  fois plus large que long, ayant sa plus grande largeur dans la base, atténué en avant en ligne presque droite, à bord antérieur fortement et largement échancré en arc simple, à lobe médian antérieur indistinct. Rebord basal très légèrement relevé en carène. Sculpture thoracale est composée de mailles arrondies et fines, d'ailleurs peu visible sous la pubescence du prothorax. Saillie prosternale subétranglée entre les hanches et à côtés convergents en avant, l'espace entre eux étant étroit et partie apicale de cette saillie subdilaté. Ecusson très petit, bronzé. Les élytres sont environ  $1\frac{2}{3}$  fois aussi longs, que larges à la base, environ  $2\frac{2}{3}$  fois aussi longs que la tête et le prothorax réunis, atténués vers l'apex depuis le milieu, subparallèles antérieurement, ayant la plus grande largeur environ dans les épaules, qui sont assez élevées. Marge latéropostérieure des élytres inerme. Elytres à ponctuation assez dense, fine et irrégulière. Carène humérale des élytres nulle. Apex élytral assez largement arrondi. Ornementation élytrale est composée de vagues bandes flexueuses, se fondant presque entièrement dans l'autre pubescence élytrale, qui est un peu plus obscure, mais de la même consistance et densité. Dans quelques individus les élytres semblent être presque uniformément pubescents, sans dessin distinct, tandis que, chez les autres le dessin onduleux est plus marqué, mais là ce sont seulement les différences faibles de pubescence plus dorée et plus obscure, qui le font un peu plus marqué. Hanches postérieures à l'angle latéropostérieur aigu. Pattes et palpes obscurs. Ongles des tarses noirs.

**Observation:** Les types de cette espèce se trouvent dans la collection du Musée de Congo belge et dans la mienne.

**119. *Trachys* (s. str.) *Kikuyina* Obenb.** Sborník Entom. Odd. Nár. Mus. Praha, VI, 49, 1928, p. 24, T. 1, fig. 12.

Syn.: *Ovis* Kerr. Voz. Alluaud et Jeannel, Afr. or. Col. VI, Bupr. 1914, p. 241.

Hab.: Kenya Colony.

**120. *Trachys* (s. str.) *Ariaxis* n. sp. (Obenb. l. c. p. 72.)**

Long.: 2, lat.: 1.1 mm. Hab.: Zululand.

Taille en ovale régulier, convexe. Coloration du dessus d'un noir un peu bronzé et luisant. Coloration du dessous noire. Pubescence de dessus unicolore, d'un jaune doré clair. Tête assez large, fortement déprimée au milieu. Epistome environ  $1\frac{1}{2}$  fois plus large que long. Le front est marqué au milieu d'une ligne enfoncée longitudinale; partie interoculaire du front est en trapèze atténué en avant. Une assez grande partie des yeux est visible de dessus. Antennes noires, normales. Prothorax très régulièrement convexe, sans dépression oblique latérale, dirigée vers la partie discale. Prothorax environ trois fois plus large que long, ayant sa plus grande largeur dans la base, atténué en avant en ligne presque droite, à bord antérieur distinctement échancré en ligne bisinuée, à lobe médian antérieur très distinct. Sculpture thoracale est composée des mailles arrondies très fines, plus distinctes seulement latéralement. Marge basale du prothorax seulement très étroitement relevée en carène mince. Saillie prosternale subétranglée entre les hanches et à côtés convergeants en avant, l'espace entre eux étant étroit et partie apicale de cette saillie subdilaté. Ecusson très petit, noir. Les élytres sont environ  $1\frac{2}{3}$  fois aussi longs, que larges à la base, environ  $2\frac{2}{3}$  fois aussi longs que la tête et le prothorax réunis, atténués vers l'apex depuis le milieu, subparallèles antérieurement, ayant la plus grande largeur environ dans les épaules, qui sont faiblement convexes. Marge latéropostérieure des élytres inerme. Elytres assez courts, convexes, à ponctuation assez grossière, mais peu profonde. Carène humérale des élytres nulle. Apex élytral régulièrement arrondi. Ornementation élytrale est composée de trois bandes transversales et vagues, dorées. Hanches postérieures à l'angle latéropostérieur droit et très légèrement subarrondi au sommet. Pattes et palpes d'un noir profond. Ongles des tarses et derniers articles des tarses noirs.

**121. *Trachys* (s. str.) *Misanthra* n. sp. (Obenb. l. c. p. 72.)**

Long.: 2.1, lat.: 1 mm. Hab.: Mashonaland.

Taille en ovale allongé, assez convexe. Coloration du dessus d'un noir brun, un peu bronzé, luisant. Coloration du dessous d'un bronzé noirâtre et luisant. Pubescence de dessus unicolore, à rare et jaune. Tête très large, aux bords oculofrontaux légèrement subcarénés. Epistome environ  $1\frac{1}{2}$  fois plus large que long. Le front est fortement déprimé au milieu; partie interoculaire du front est en trapèze, assez atténué en avant. Seulement une très étroite partie des yeux visible de dessus. Antennes noires, normales. Prothorax assez large, avec une dépression oblique latérale, convexe, aux angles antérieurs peu saillants. Prothorax environ  $3\frac{1}{4}$  fois plus large que long, ayant sa plus grande largeur dans la base, atténué en avant en ligne légèrement arquée, à bord antérieur très distinctement échancré en arc très légèrement bisinuée, à lobe médian antérieur très peu distinct. Sculpture thoracale est composée de mailles rondes peu distinctes. Marge basale du prothorax assez largement et

distinctement relevée en carène. Saillie prosternale subétranglée entre les hanches et à côtés convergeants en avant, l'espace entre eux étant étroit et partie apicale de cette saillie subdilatée. Ecusson petit et noir. Les élytres sont environ  $1\frac{2}{3}$  fois aussi longs, que larges à la base, environ  $2\frac{2}{3}$  fois aussi longs que la tête et le prothorax réunis, atténués vers l'apex depuis le milieu, subparallèles antérieurement, ayant la plus grande largeur environ dans les épaules, qui sont légèrement élevées. Marge latéropostérieure des élytres inerme. Sculpture élytrale formée d'une ponctuation irrégulière, assez grossière, mais vague et superficielle et subéffacée. Elytres assez longs et assez parallèles. Carène humérale des élytres nulle. Apex élytral assez étroitement arrondi. Ornementation élytrale est composée de trois vagues et très peu distinctes bandes transversales d'un jaune assez claire, qui émerge de pubescence foncière, qui est rare et jaune. Hanches postérieures à l'angle latéropostérieur droit et peu sensiblement subarrondi au sommet. Pattes et palpes d'un brun ocré noirâtre. Ongles des tarses et les derniers articles noirs.

### 122. *Trachys* (s. str.) *Polyxena* n. sp. (Obenb. l. c. p. 72.)

Long.: 2.1, lat.: 1.2 mm. Hab.: Transvaal.

Taille assez large, convexe, ovulaire, assez trapue. Coloration du dessus d'un bronzé brillant et obscur. Coloration du dessous d'un bronzé obscur et luisant. Pubescence de dessus unicolore, dorée, assez dense. Tête plane, grande, à dépression linéaire au milieu. Epistome assez étroit, subquadratique. Le front est large, marqué d'une ligne longitudinale enfoncée; partie interoculaire du front est en trapèze, assez atténué en avant. Antennes noires, normales. Prothorax assez long, aux angles antérieurs courts, très régulièrement convexe. Prothorax environ trois fois plus large que long, ayant sa plus grande largeur dans la base, atténué en avant en ligne légèrement arquée, à bord antérieur faiblement arqué et très distinctement bisinué, à lobe médian antérieur distinct et assez fortement avancé. Sculpture thoracale est composée de mailles arrondies peu distinctes et très fines. Marge basale du prothorax est très légèrement étroitement relevée. Saillie prosternale subétranglée entre les hanches et à côtés convergeants en avant, l'espace entre eux étant étroit et partie apicale de cette saillie subdilatée; elle est atténuée en avant en ligne courbée et la dilatation apicale est assez faible. Ecusson petit et noir. Les élytres sont environ  $1\frac{3}{5}$  fois aussi longs, que larges à la base, environ trois fois aussi longs que la tête et le prothorax réunis, atténués vers l'apex depuis le milieu, subparallèles, antérieurement, ayant la plus grande largeur environ dans les épaules, qui sont assez élevées. Marge latéropostérieure des élytres inerme. Sculpture élytrale formée d'une ponctuation assez fine, irrégulière et superficielle. Elytres convexes, assez courts assez robustes, luisants. Carène humérale des élytres nulle. Apex élytral assez largement arrondi. Ornementation élytrale est composée de trois bandes flexueuses vagues et transversales d'une nuance légèrement plus claire que celle de l'autre surface élytrale. Hanches postérieures à l'angle latéropostérieur aigu. Pattes et palpes obscurs. Ongles des tarses et les derniers articles noirs.

### 123. *Trachys* (s. str.) *eliminata* n. sp. (Obenb. l. c. p. 73.)

Long.: 2.5, lat.: 1.4 mm. Hab.: Congo belge: Kassai. Haute Uéllé.

Taille assez convexe. Assez luisant. Coloration du dessus d'un bronzé noirâtre et brun très foncé et assez luisant. Coloration du dessous d'un noir

bronzé. Pubescence de dessus unicolore, fine, sur tout celle des élytres, courte, d'un jaune assez obscur, assez dense. Tête assez peu large, presque plane, peu avancée. Epistome assez étroit, subquadratique. Le front est marqué d'une fine ligne longitudinale enfoncée; partie interoculaire du front est en trapèze assez atténué en avant. Antennes noires, normales. Prothorax assez large, convexe, au bord postérieur à peine relevé en carène, court. Prothorax environ trois fois plus large que long, ayant sa plus grande largeur dans la base, atténué en avant en ligne très légèrement arquée, à bord antérieur faiblement arqué, distinctement bisiné, à lobe médian antérieur assez peu distinct. Rebord basal très étroitement élevé en carène. Sculpture thoracale est composée de mailles arrondies extrêmement fines et peu distinctes. Les angles antérieurs du prothorax assez longs et assez aigus; les côtés atténués en avant en ligne presque droite. Saillie prosternale subétranglée entre les hanches et à côtés convergents en avant, l'espace entre eux étant étroit et partie apicale de cette saillie fortement dilatée, atténué en avant en ligne droite. Ecusson très petit, minuscule. Les élytres sont environ  $1\frac{2}{3}$  fois aussi longs, que larges à la base, environ trois fois aussi longs que la tête et le prothorax réunis, atténués vers l'apex depuis le milieu, subparallèles antérieurement, ayant la plus grande largeur environ dans les épaules, qui sont assez élevées. Marge latéropostérieure des élytres inerme. Ponctuation élytrale fine, subeffacée, irrégulière, superficielle. Elytres assez peu convexes, assez courts. Carène humérale des élytres nulle. Apex élytral assez largement arrondi. Ornementation élytrale est composée de trois fascies transversales, flexueuses et très vagues entre l'autre pubescence élytrale, qui est bien régulière et couvre toute la surface élytrale. Hanches postérieures à l'angle latéropostérieur subarrondi. Pattes et palpes d'un noir profond.

Observation: Les types de cette espèce remarquable se trouvent dans la collection du Musée de Congo belge et dans la mienne.

#### 124. *Trachys* (s. str.) *Gabbala* n. sp. (Obenb. l. c. p. 73.)

Long.: 2.1, lat.: 1.5 mm. Hab.: Ukerewe. (Eichelbaum.)

Taille assez déprimée, assez allongée, ovale. Coloration du dessus d'un bronzé assez clair, assez peu luisant. Coloration du dessous d'un bronzé un peu plus obscur. Pubescence de dessus unicolore, d'un jaune pâle et clair, assez longue et assez dense. Tête assez large, presque plane, peu avancée. Epistome assez étroit, subquadratique. Le front est marqué d'une ligne médiane superficielle; partie interoculaire du front est en trapèze assez atténué en avant. Antennes noires, normales. Prothorax atténué en avant en ligne oblique presque droite, aux angles antérieurs assez longs et assez aigus. Prothorax environ  $3\frac{1}{2}$  fois plus large que long, ayant sa plus grande largeur dans la base, assez convexe, court et large, à bord antérieur faiblement arqué, distinctement bisiné, à lobe médian antérieur assez peu distinct; rebord basal distinctement relevé en carène fine. Sculpture thoracale est composée de mailles arrondies extrêmement fines et très peu distinctes sous la pubescence. Marge basale du prothorax très distinctement relevée en carène. Saillie prosternale subétranglée entre les hanches et à côtés convergents en avant, l'espace entre eux étant étroit et partie apicale de cette saillie fortement dilatée, atténuée en avant en ligne droite. Ecusson minuscule et noirâtre. Les élytres sont environ  $1\frac{2}{3}$  fois aussi longs, que larges à la base, environ trois fois aussi longs que la tête et le prothorax réunis, atténués vers l'apex depuis la base,

assez convexes, ayant la plus grande largeur environ dans la base, plus fortement atténués depuis le milieu de la longueur. Marge latérostérieure des élytres inerme. Sculpture élytrale formée d'une ponctuation superficielle, irrégulière, mais relativement assez forte. Elytres assez peu convexes, assez courts. Carène humérale des élytres nulle. Apex élytral assez étroit. Ornementation élytrale est composée de trois vagues bandes flexueuses et transversales, émergeantes de l'autre pubescence élytrale, qui est assez régulièrement disposée sur toute la surface. Hanches postérieures à l'angle latéropostérieur aigu. Pattes et tarses d'un brun ocré très obscur. Ongles des tarses et les derniers articles des tarses noirs.

**125. *Trachys* (s. str.) *Miarga* n. sp. (Obenb. l. c. p. 73.)**

Long.: 2.2, lat.: 1.6 mm. Hab.: Zouloulouland.

Taille assez allongée, ovulaire, assez large, assez trapue, assez peu convexe. Coloration du dessus d'un bronzé cuivreux clair et luisant. Coloration du dessous cuivreuse. Pubescence de dessus unicolore, d'un jaune doré clair, formant, sur les élytres, un dessin onduleux. Tête assez large, fortement impressionnée au milieu. Epistome étroit, au plus  $1\frac{1}{2}$  fois plus large que long. Le front est marqué au milieu d'une ligne longitudinale enfoncée; partie interoculaire du front est assez large, en trapèze assez atténué en avant. Yeux peu convexes, bords oculofrontaux arrondis. Antennes noires, normales. Prothorax aux angles antérieurs un peu saillants, large, régulièrement convexe, légèrement relevé en carène au bord postérieur, atténué en avant en arc régulier, aux angles antérieurs assez aigus. Prothorax environ  $3\frac{1}{4}$  fois plus large que long, ayant sa plus grande largeur dans la base, à bord antérieur fortement échancré en arc presque simple, à lobe médian antérieur à peine sensible. Sculpture thoracale est composée de mailles fines arrondies, très peu marquées et peu distinctes sous la pubescence thoracale. Saillie prosternale subétranglée entre les hanches et à côtés convergeants en avant, l'espace entre eux étant étroit et partie apicale de cette saillie subdilataée. Ecusson médiocre et bronzé. Les élytres sont environ  $1\frac{3}{5}$  fois aussi longs, que larges à la base, environ  $3\frac{3}{4}$  fois aussi longs que la tête et le prothorax réunis, atténués vers l'apex depuis le milieu de la longueur, parallèles antérieurement, ayant la plus grande largeur environ dans les épaules, qui sont un peu élevées. Marge latéropostérieure des élytres inerme. Elytres assez courts et assez trapus, assez peu convexes, à ponctuation fine, peu dense, mais suboblitérée et peu distincte sous la pubescence jaune. Carène humérale des élytres nulle. Apex élytral assez largement arrondi. Ornementation élytrale est composée de trois bandes jaunâtres transversales et flexueuses, assez vagues. Hanches postérieures à l'angle latéropostérieur aigu. Pattes et palpes obscurs. Ongles des tarses et les derniers articles des tarses noirs.

**126. *Trachys* (s. str.) *Leuctria* n. sp. (Obenb. l. c. p. 73.)**

Long.: 2.7, lat.: 1.3 mm. Hab.: Zouloulouland.

Taille convexe, ovulaire, subparallèle dans la moitié antérieure des élytres. Coloration du dessus bronzé verdâtre et luisant. Coloration du dessous bronzée. Pubescence de dessus unicolore, éparse et longue, vague, irrégulière, d'un gris jaunâtre. Tête très large, assez avancée, à peine excavée antérieurement. Epistome petit, étroit, au plus  $1\frac{1}{2}$  fois plus large que long. Le front est fortement impressionné au milieu; partie interoculaire du front est en trapèze assez fortement atténué en avant. Yeux situés latéralement, peu obliques,



aux bords latéraux arrondis. Antennes noires, normales. Prothorax atténué en avant en ligne arquée presque droite, au bord postérieur légèrement relevé en carène. Prothorax environ trois fois plus large que long, ayant sa plus grande largeur dans la base, convexe et luisant, à bord antérieur assez profondément échancré en arc presque simple, à lobe médian antérieur indistinct; avec une dépression transversale suivant la ligne basale du prothorax. Sculpture thoracale est composée de mailles arrondies très fines, mais peu visibles. Saillie prosternale subétranglée entre les hanches et à côtés convergeants en avant, l'espace entre eux étant étroit et partie apicale de cette saillie subdilataée. Ecusson médiocre, bronzé. Les élytres sont environ  $1\frac{2}{3}$  fois aussi longs, que larges à la base, environ  $3\frac{1}{2}$  fois aussi longs que la tête et le prothorax réunis, atténués vers l'apex depuis le milieu, subparallèles antérieurement, ayant la plus grande largeur environ dans les épaules, qui sont un peu élevées. Marge latéropostérieure des élytres inerme. Ponctuation élytrale subéffacée, médiocre, irrégulière, superficielle. Carène humérale des élytres nulle. Apex élytral assez étroitement arrondi. Ornementation élytrale est composée de vagues bandes flexueuses et transversales. Hanches postérieures à l'angle latéropostérieur aigu. Pattes et palpes noirs.

**127. *Trachys* (s. str.) *barbatula* n. sp. (Obenb. l. c. p. 73.)**

Long.: 2.2—2.8, lat.: 1—1.5 mm. Hab.: Congo belge.

Taille assez grande, assez déprimée et cunéiforme. Coloration du dessus d'un bronzé noirâtre et obscur; unicolore. Luisant. Coloration du dessous d'un bronzé noir. Pubescence de dessus unicolore, d'un jaune doré; formant, sur les élytres, un dessin onduleux. Tête largement excavée en avant en angle obtus. Epistome étroit, au plus  $1\frac{1}{2}$  fois plus large que long. Le front est marqué d'une ligne longitudinale enfoncée; partie interoculaire du front est en trapèze, assez atténuée en avant. Yeux situés assez obliquement; bords oculofrontaux arrondis. Antennes noires, normales, courtes. Prothorax large, atténué en avant en ligne presque droite, au bord basal assez fortement et distinctement relevé en carène, aux bords antérieurs saillants. Prothorax environ  $3\frac{1}{2}$  fois plus large que long, ayant sa plus grande largeur dans la base, atténué en avant en ligne presque droite, à bord antérieur assez fortement échancré en arc simple, à lobe médian antérieur indistinct. Sculpture thoracale est composée de mailles arrondies très peu distinctes sous la pilosité thoracale, qui est assez dense. Bord basal du prothorax légèrement relevé en carène. Saillie prosternale subétriangle entre les hanches et à côtés convergeants, l'espace entre eux étant étroit et partie apicale de cette saillie subdilataée. Ecusson très petit, bronzé. Les élytres sont environ  $1\frac{2}{3}$  fois aussi longs, que larges à la base, environ trois fois aussi longs que la tête et le prothorax réunis, atténués vers l'apex depuis le milieu, subparallèles antérieurement, ayant la plus grande largeur environ dans les épaules, qui sont assez élevées. Marge latéropostérieure des élytres inerme. Elytres à ponctuation médiocre, subsériale, bien distincte. Carène humérale des élytres nulle. Apex élytral assez étroitement arrondi. Ornementation élytrale est composée de trois vagues bandes transversales et un peu obliques, larges, formées de pubescence éparsée, mais très régulière et dorée. Les espaces entre ces bandes sont formées de pubescence semblable, de la même densité, mais d'une teinte plus obscure. Les parties basales des élytres sont pubescentes de jaune — alors toute la surface élytrale est régulièrement pubescente. Hanches postérieures à l'angle latéropostérieur aigu. Pattes et palpes obscurs. Fémurs assez longs et dépassant distinctement le contour du corps.

**127. a. *Trachys barbatula* var. *dolosa* n. var.**

Hab.: Congo belge.

D'un bronzé verdâtre très clair et uniforme.

**127. b. *Trachys barbatula* var. *Kličkana* n. var.**

Hab.: Congo belge.

Prothorax et tête d'un bronzé verdâtre très clair, élytres d'un noir profond. Nommé à l'honneur de l'entomologiste bien connu tchèque, *M. le Dr. Ladislav Klička*.

**128. *Trachys* (s. str.) *Exmiiaris* n. sp. (Obenb. l. c. p. 74.)**

Long.: 2, lat.: 1.1 mm. Hab.: Cameroun: Kamerunberg.

Taille assez trapue, convexe, ovulaire. Coloration du dessus d'un bronzé obscur un peu cuivreux et luisant. Coloration du dessous d'un bronzé plus obscur. Pubescence de dessus unicolore celle du prothorax et de la tête épars, jaune, mais très régulière. Tête relativement très étroite, assez avancée, peu excavée antérieurement. Epistome étroit, un peu plus large que long. Le front est très faiblement déprimé au milieu; partie interoculaire du front est en trapèze, atténuée en avant. Antennes noires, normales. Prothorax très court, convexe, bord postérieur très distinctement élevé en carène. Prothorax environ  $3\frac{1}{2}$  fois plus large que long, ayant sa plus grande largeur dans la base, atténué en avant en ligne légèrement arquée, à bord antérieur échancré en arc simple et peu profond, à lobe médian antérieur indistinct. Sculpture thoracale est composée des mailles larges et arrondis, très peu sensibles sous la pubescence et comme effacées. Saillie prosternale subétranglée entre les hanches et à côtés convergeants en avant, l'espace entre eux étant étroit et partie apicale de cette saillie subdilataée; elle est relativement assez large, presque droite latéralement. Ecusson médiocre et bronzé. Les élytres sont environ  $1\frac{2}{3}$  fois aussi longs, que larges à la base, environ  $3\frac{1}{3}$  fois aussi longs que la tête et le prothorax réunis, atténués vers l'apex depuis le milieu, subparallèles antérieurement, ayant la plus grande largeur environ dans les épaules, qui sont assez élevées. Marge latéropostérieure des élytres inerme. Elytres étroits, à ponctuation subeffacée, très peu sensible. Carène humérale des élytres nulle. Apex élytral assez étroitement arrondi. Ornementation élytrale est composée de fascies transversales et onduleuses, formées de poils épars, de la même densité que l'autre pubescence élytrale, qui est obscure et peu visible. Hanches postérieures à l'angle latéropostérieur aigu. Pattes et palpes d'un brun ocré très obscur. Ongles des tarses et derniers articles des tarses noirs.

**129. *Trachys* (s. str.) *Dolomedea* n. sp. (Obenb. l. c. p. 74.)**

Long.: 2.2, lat.: 1.4 mm. Hab.: Natal.

Taille assez trapue, ovulaire, convexe. Coloration du dessus d'un bronzé brunâtre et très luisant. Coloration du dessous d'un bronzé un peu plus obscur. Pubescence de dessus unicolore, celle de la tête et du prothorax assez longue, épars, assez irrégulière. Tête large, à peine impressionnée au milieu. Epistome étroit. Le front est marqué d'une ligne médiane enfoncée; partie interoculaire du front est en trapèze atténué en avant. Antennes noires et courtes, normales. Prothorax relativement assez long, plus long que celui de *Fr. Exmiiaris* m. Prothorax environ trois fois plus large que long, ayant sa plus grande largeur dans la base, atténué en avant en ligne arquée, à bord antérieur assez étroitement échancré en arc simple, à lobe médian antérieur indistinct.

Bord postérieur distinctement élevé en carène. Sculpture thoracale est composée de mailles très fines et peu visibles, plus distinctes seulement latéralement. Saillie prosternale subétranglée entre les hanches et à côtés convergeants en avant, l'espace entre eux étant étroit et partie apicale de cette saillie subdilataée; elle est assez large, droite latéralement. Ecusson petit et bronzé. Les élytres sont environ  $1\frac{3}{5}$  fois aussi longs, que larges à la base, environ  $2\frac{1}{2}$  fois aussi longs que la tête et le prothorax réunis, atténués vers l'apex depuis le milieu, subparallèles antérieurement, ayant la plus grande largeur environ dans les épaules, qui sont un peu élevées. Marge latéropostérieure des élytres inerme. Elytres très larges, à ponctuation distincte et assez grossière, vague, superficielle. Carène humérale des élytres nulle. Apex élytral assez étroitement arrondi. Ornementation élytrale est composée de fascies transversales flexueuses, composées de pubescence d'un jaune clair, condensée et différente alors de pilosité de l'autre surface, qui est, dans les autres parties élytrales, jaunâtre et d'une teinte un peu plus obscure. Hanches postérieures à l'angle latéropostérieur aigu. Pattes et palpes d'un brun ocré très obscur. Ongles des tarses et les derniers articles des tarses noirs.

**130. *Trachys* (s. str.) *Xampethis* n. sp.**

Long.: 2.2, lat.: 1.1 mm. Hab.: Natal.

Taille en ovale allongé, assez acuminé postérieurement, assez trapu. Coloration du dessus d'un bronzé noir assez luisant. Coloration du dessous noire. Pubescence de dessus unicolore, assez longue et fine, d'un gris jaunâtre. Tête médiocre, les yeux sont situés obliquement. Epistome étroit et un peu plus large que long. Le front est marqué d'une impression linéaire; partie interoculaire du front est en trapèze assez atténué en avant. Antennes noires et normales. Prothorax court, au bord postérieur à peine relevé en carène. Prothorax environ  $3\frac{1}{2}$  fois plus large que long, ayant sa plus grande largeur dans la base, atténué en avant en ligne arquée, à bord antérieur échancré en arc simple, assez profond, à lobe médian antérieur indistinct. Bord postérieur à peine relevé en carène. Sculpture thoracale est composée de mailles très fines, mais très peu distinctes, même latéralement. Saillie prosternale subétranglée entre les hanches et à côtés convergeants en avant, l'espace entre eux étant étroit et partie apicale, de cette saillie subdilataée; celle-ci assez large, aux bords latéraux presque droits. Ecusson petit, bronzé. Les élytres sont environ  $1\frac{2}{3}$  fois aussi longs, que larges à la base, environ  $3\frac{1}{2}$  fois aussi longs que la tête et le prothorax réunis, atténués vers l'apex depuis la base, ayant la plus grande largeur environ dans les épaules, qui sont assez élevées. Marge latéropostérieure des élytres inerme. Elytres à ponctuation médiocre. Carène humérale des élytres nulle. Apex élytral assez étroitement arrondi. Ornementation élytrale est composée de trois bandes flexueuses transversales, peu condensées entre la pilosité du fond, qui est longue et fine. Hanches postérieures à l'angle latéropostérieur aigu. Pattes et palpes d'un noir profond.

**131. *Trachys* (s. str.) *Mixiora* n. sp. (Obenb. l. c. p. 75.)**

Long.: 2.1, lat.: 1.2 mm. Hab.: Cap Bonae Spei.

Taille ovulaire, élytres parallèles dans la moitié antérieure, assez convexes. Luisant. Coloration du dessus d'un bronzé brun un peu métallique, olivâtre. Coloration du dessous d'un bronzé noir. Pubescence de dessus unicolore, subégale, fine, grise, peu dense, courte. Tête assez large, assez plane antérieurement. Epistome étroit et chagriné. Le front est marqué d'une ligne allongée enfoncée; partie interoculaire du front est en trapèze assez atténué

en avant. Les yeux sont placés assez obliquement. Antennes noires et normales. Prothorax très régulièrement convexe, sans dépression fine le long de la marge basale, sans rebord relevé. Prothorax environ trois fois plus large que long, ayant sa plus grande largeur dans la base, atténué en avant en ligne arquée, à bord antérieur échancré en ligne distinctement bisinuée, à lobe médian antérieur distinct, mais peu avancé, peu distincte sous pilosité rare superficielle. Saillie prosternale fortement étranglée entre les hanches et à côtés convergeants en avant, l'espace entre eux étant étroit et en partie apicale brusquement dilatée; elle est, en général, petite et étroite. Ecusson petit et bronzé. Les élytres sont environ  $1\frac{3}{5}$  fois aussi longs, que larges à la base, environ  $2\frac{2}{3}$  fois aussi longs que la tête et le prothorax réunis, atténués vers l'apex, depuis la moitié de la longueur, subparallèles antérieurement, ayant la plus grande largeur environ dans les épaules, qui sont un peu élevées. Marge latéropostérieure de élytres inerme; sans dentelue; ils sont parallèles dans la moitié antérieure, étroitement arrondis vers le sommet. Carène humérale des élytres nulle. Apex élytral étroit. Ornementation élytrale est composée de trois vague et étroites bandes très flexueuses sur le fond couvert de pubescence semblable, mais d'une nuance un peu plus obscure et peu apparente. Hanches postérieures à l'angle latéropostérieur aigu. Pattes et palpes d'un noir profond.

(A suivre.)

#### Appendix.

101a. *Trachys* (s. str.) *Amiarta* n. sp. (Obenb. l. c. p. p. 67! — sous 216 [215]).

Long.: 2.2, lat.: 1.3 mm. Hab.: Cap Bonae Spei.

Taille assez robuste et assez trapue. Coloration du dessus d'un bronzé très obscur, noirâtre et luisant; sans reflets violacés. Coloration du dessous d'un bronzé noir. Pubescence de dessus assez peu dense, fine, éparsée, argentée. Tête assez large, vue de dessus à peine déprimée. Epistome large et chagriné. Le front est marqué d'une ligne fine impressionnée; partie interoculaire du front est en trapèze assez fortement atténué en avant. Antennes noires. Prothorax environ trois fois plus large que long, ayant sa plus grande largeur dans la base, atténué en avant en ligne oblique droite, à bord antérieur échancré en arc subbisinué, à lobe médian antérieur assez distinct. Marge basale du prothorax étroitement relevée en carène. Sculpture thoracale est composée de mailles arrondies peu visibles, peu distinctes et comme subéffacées. Saillie prosternale étroite et petite, subétranglée entre les hanches, fines stries marginales étant assez rapprochées, convergeantes en avant en ligne sinueuse. Ecusson très petit, noir. Les élytres sont environ  $1\frac{3}{5}$  fois aussi longs, que larges à la base, environ trois fois aussi longs que la tête et le prothorax réunis, atténués vers l'apex depuis le milieu, parallèles antérieurement, ayant la plus grande largeur environ dans les épaules, qui sont assez élevées. Marge latéropostérieure des élytres inerme. Ponctuation élytrale fine, irrégulière et superficielle. Carène humérale des élytres nulle. Apex élytral assez largement arrondi. Ornementation élytrale est composée de trois vagues bandes flexueuses et transversales peu indiquées. Hanches postérieures à l'angle latéropostérieur subarrondi. Pattes et palpes d'un noir uniforme et profond.

Observation: Cette espèce appartient dans mon travail cité sous Nro 216 (215), p. 67, derrière 99. *Tr.* (s. str.) *Swiertsrae* m. Le nom était y omis par une faute typographique, comme on pouvait constater facilement, par ce que entre les Nro 99. *Tr.* *Swiertsrae* et 101. *Tr.* *Darnotha* manquait Nro 100. *Tr.* *Amiarta* m.