

A. Hustache, Lagny:

ZYGOPINAE de L'AMÉRIQUE MÉRIDIONALE.

(Première série.)

Lacordaire, dans son *Genera des Coleoptères* (1866) donne une classification des groupes de cette intéressante famille. Depuis l'illustre auteur, un assez grand nombre de genres nouveaux ont été érigés par différents entomologistes; tous ces genres ont pu être intercalés dans les groupes de Lacordaire, sans modifications notable à sa classification. Le présent travail n'indique que deux nouveaux genres sintercalant aisément dans la même classification, mais l'examen de nombreuses espèces a fait observer un caractère singulier et jusqu'ici non signalé: la présence fréquente d'une série de petits granules jaunes le long de la suture des épisternes métathoraciques. Caractère habituel chez les Lechriopini mais se rencontrant parfois chez les petites espèces d'autres groupes. Quel est le rôle fonctionnel de ces granules? L'étude en est à faire et peut-être cette étude pourra-t-elle contribuer à une nouvelle classification des espèces qui possèdent ce caractère.

***Pinarus brevicollis* n. sp.**

Ovale, noir-brun, le revêtement cendré et jaunâtre, plus dense sur le dessous.

Rostre brun et lisse en avant, ponctué squamulé à la base. Yeux acuminés inférieurement, étroitement séparés par une carène. Antennes ferrugineuses, fines, la massue foncée, le 2. article du funicule aussi long que les 5 suivants ensemble, la massue fusiforme. Vertex avec deux carènes arquées.

Prothorax du double aussi large que long, brusquement mais très brièvement étranglé en avant, les côtés parallèles et échancrés dans leur milieu, le bord antérieur sinué-échancré au milieu, se lobes oculaires forts; fortement impressionné en avant; couvert de gros granules sétigères et peu serrés. Ecusson ovale, convexe, ponctué, squamulé.

Elytres de moitié plus longs que larges, parallèles, au sommet séparément terminés par une dent obtuse, faible; interstries irrégulièrement tuberculés sétulosés, le 2. avec, en arrière, une forte crête tuberculée, le 3. avec deux crêtes, l'une vers la base, l'autre moins élevée et plus longue vers le milieu, le calus huméral saillant et tuberculé; la suture et la base avec des squamules jaunes plus nombreuses.

Fémurs dentés, les postérieurs plus fortement, n'atteignant pas l'apex. Mésosternum et métasternum en avant impressionnés, la saillie mésosternale fortement bilobée. Deuxième segment ventral au milieu aussi long que les 3. et 4. ensemble, la 1. suture sinuée au milieu. Abdomen très peu ascendant.

Long. 8—9 mm.

Guyane française: Roches de Kourou, 12 spécimens.

***Latychus cinereus* n. sp.**

Noir, le revêtement dorsal cendré, le dessous et les pattes à revêtement grossier d'un brun ferrugineux, le milieu des 3., 4., 5. segments abdominaux dénudé, noir, les fémurs avec un anneau foncé peu tranché.

Rostre à la base caréné et latéralement rugueux et squamulé. Intervalle des yeux aussi large que les tibias antérieurs. Antennes ferrugineuses, la massue foncée, le 2. article du funicule long.

Prothorax aussi long que large, subconique, modérément rétréci en avant, les côtés à peine arqués, la base à peine bisinuée; très fortement et longitudinalement convexe, avec une ligne médiane caréniforme, la ponctuation fine et très serrée. Écusson convexe et ponctué.

Elytres un peu plus longs que larges, arrondis ensemble au sommet; 3. interstrie surmonté de deux tubercules, l'un très petit, derrière la base, l'autre très gros, comprimé, au sommet de la déclivité postérieure, son sommet couvert d'une dense pubescence squamuleuse noire; 5. interstrie fortement convexe, subcostiforme en avant; stries fines, leurs points allongés et peu serrés.

Long. 9—10, 5 mm.

Brésil, province de Minas Geraes: Matusinhos, 3—4, 1885 (E. Gounelle, ma coll.).

Latychellus n. gen.

Ce genre diffère de *Latychus* Pasc. par les pattes postérieures plus longues que les autres, leurs fémurs fortement renflés, dépassant longuement le sommet des élytres, armés d'une forte dent triangulaire, leurs tibias, ainsi que ceux des pattes intermédiaires, fortement arqués.

Prothorax et élytres tuberculés.

Le génotype cet:

Latychellus venustus n. sp.

Noir, les antennes rousses, les tarsi ferrugineux. Revêtement d'un rouge brique (entremêlé de quelques poils blancs) sur le prothorax, la tête, les fémurs antérieurs et intermédiaires, le prosternum, les côtés du métasternum; cendré sur les fémurs postérieurs et les tibias; une tache blanche vers le tiers postérieur des 6., 7., 8. interstries, une autre petite entre les yeux, une de chaque côté sur la base du rostre, une au sommet des épimeres et des épisternes; une sur les côtés des 4 derniers segments ventraux; milieu du métasternum, 1. et 2. segments abdominaux à pubescence dense, fine, grise, les 3. et 4. segments presque glabres. Elytres noirâtres, la pubescence ferrugineuse plus serrée autour des tubercules et formant une vague bande sur la 1. moitié de la suture prolongée de chaque côté par une fascie oblique, dirigée en arrière vers les côtés mais ne les atteignant pas.

Rostre en avant subcylindrique, arqué, luisant, finement pointillé, à la base caréné, de chaque côté impressionné et tomenteux, blanc. Yeux convexes, cerclés de rouge sur les côtés, de jaune en dessus. Antennes insérées vers le tiers basal, le funicule avec ses articles 2. et 3. longs, le 2. un tiers plus long que le 3., la massue grosse, ovale, son 1. article moitié de sa longueur totale, noire.

Prothorax plus large que long, les côtés anguleux vers le tiers basal, puis sinués en dedans et assez fortement rétrécis en avant, la base faiblement bisinuée; pourvu sur le milieu du disque de deux gros tubercules pubescents; transversalement impressionné en avant, le bord antérieur relevé. Écusson blanchâtre.

Elytres subrectangulaires, plus longs que larges, rétrécis dans leur tiers postérieur, échancrés au sommet, le sommet du 3. interstrie triangulaire, les épaules presque rectangulaires, leur calus élevé; disque convexe, le 3. interstrie avec deux tubercules, l'un près de la base, l'autre près du milieu, le 5. interstrie avec deux tubercules beaucoup plus petits, l'antérieur placé un peu en arrière, le postérieur en avant de ceux du 5.; stries ponctuées, les interstries subplans.

Tibias intermédiaires et postérieurs pourvus à leur sommet interne d'une petite dent opposée à l'onglet apical.

Long. 7 mm.

Guyane française: Roches de Kourou, 2 spécimens.

Latychellus bidentatus n. sp.

Noir, mat, les antennes ferrugineuses, revêtu en dessous, sur les pattes, la tête d'une pubescence squamuleuse jaunâtre.

Rostre droit, en avant élargi, ferrugineux, lisse, à la base densément ponctué, obsolètement caréné, faiblement squamulé. Intervalle des yeux aussi large que les tibias antérieurs au milieu. Deuxième article du funicule deux fois environ aussi long que le 3., la massue foncée.

Tête densément ponctuée.

Prothorax conique, aussi long que large, modérément rétréci en avant, pourvu en avant, près du bord antérieur, de deux forts tubercules coniques séparés par la carène médiane, cette dernière effacée en arrière; ensellé en arrière devant la base; la base finement reborbée et précédée d'un sillon; mat, la ponctuation obsolète. Écusson ovale, plan, mat.

Elytres à peine plus longs que larges, à la base du double de la largeur du prothorax, les épaules brièvement arrondies, les côtés arqués, convergents en arrière des les épaules, le sommet tronqué et le 3. interstrie brièvement dentiforme; 3. interstrie pourvu vers son milieu, d'un très gros tubercule conique, aigu, son sommet recourbé et dirigé en arrière; derrière la base des 3. et 5. interstries et sur la déclivité postérieure du 5. un tout petit tubercule; stries fines, obsolètement ponctuées, les interstries coriacés.

Pattes robustes, les tibias et les tarsi d'un rouge ferrugineux, les fémurs postérieurs fortement renflés, leur dent forte, atteignant juste l'apex des élytres.

Long. 9 mm.

Guyane française: Rivière de Kourou.

Pseudopinarus guyanensis n. sp.

Brun, le revêtement, en dessus très fin, couché, peu serré, fauve, jaunâtre ou brunâtre sur les tubercules, en dessous plus grossier et serré, jaunâtre, blanchâtre et formant une bande latérale (en partie visible de haut) sur le bord supérieur du prosternum.

Rostre ferrugineux, à sa base fortement caréné et squamulé de chaque côté, en avant lisse et luisant. Antennes ferrugineuses, les 2. et 3. articles du funicule très longs et égaux, les 4. et 5. subconiques et aussi longs que larges, les 6. et 7. globuleux et plus larges. Intervalle des yeux aussi large que le sommet du scape. Tête avec deux carènes divergentes en arrière, arquées, et un petit tubercule dans l'angle des yeux.

Prothorax un peu plus large que long, les côtés parallèles jusqu'au rétrécissement apical, ce dernier court; pourvu en son milieu d'un gros tubercule pubescent, traversé par une ligne caréniforme atteignant la base, mais effacée dans l'étranglement antérieur, marqué de points assez gros, espacés, foncés, très distincts à travers la pubescence, cette dernière en majeure partie foncée et plus claire sur la ligne médiane.

Elytres un peu plus longs que larges; le 3. interstrie avec deux crêtes, l'une non loin de la base et sa déclivité antérieure d'un brun noir, l'autre vers son milieu et bilobée, les 5., 7. et 9. interstries irrégulièrement costiformes en avant, subcarénés en arrière, les trois premiers interstries plans sur la déclivité postérieure; interstries latéraux pourvus de quelques petits granules; sommet des élytres échancré.

Long. 6—7, 5 mm.

Guyane française: Rivière de Kourou, St. Laurent et St. Jean du Maroni, une série de spécimens.

Cette espèce, voisine de *P. cerastes* F. en diffère par sa taille supérieure, l'écartement des yeux notablement moindre, le prothorax à côtés parallèles et son tubercule moins fort, les élytres plus longs. A un fort grossissement on aperçoit sur les côtés des élytres de très courtes soies, à peine soulevées.

***Pseudopinarus callosicollis* n. sp.**

Brun, revêtu en dessus de fines squamules sétiformes, jaunes de sable, assez serrées, et d'autres plus claires blanchâtres formant quelques mouchetures le long des interstries, sans soies dressées; pattes et dessous à revêtement assez dense, cendré, les fémurs postérieurs avec une large tache subdénudée, foncée.

Rostre arqué, aussi long que la tête et le prothorax, ferrugineux, en avant glabre et lisse, à la base fortement élargi; densément squamulé, finement caréné au milieu. Antennes rousses. Yeux assez étroitement séparés, leur intervalle moitié de la largeur des tibias antérieurs. Vertex densément tomenteux, impressionné, ses carènes latérales fines, un peu arquées.

Prothorax carré, brusquement resserré brièvement derrière le bord antérieur, ce rétrécissement dilaté en un tubercule gros, arrondi, squamulé, les côtés ensuite légèrement sinués en dedans, puis subparallèles jusqu'à la base; pourvu en son milieu d'un forte gibbosité carénée à son sommet, la ponctuation forte, serrée mais voilée par le revêtement. Écusson tomenteux, cendré.

Elytres un peu plus longs que larges, parallèles, brusquement rétrécis en arrière; interstries convexes, rugueux-granulés, le 3. avec deux tubercules squamuleux, médiocres, le 1. vers le tiers antérieur, le 2. plus gros au sommet de la déclivité postérieure.

Long. 6 mm.

Amar. Str., collection Kraatz, deux spécimens.

Cette espèce se distingue aisément de toutes ses congénères par les tubercules latéraux antérieurs du prothorax.

***Piazolechriops gracilitarsis* n. sp.**

Allongé, noir brun, revêtu en dessus et sur les pattes de nombreuses et très petites taches d'un jaune de sable, formées de petites squamules linéaires et appliquées, les tubercules des élytres avec quelques soies semblablement colorées, couvert en dessous de squamules plus grossières, serrées et jaunâtres. Tarses longs.

Rostre ferrugineux, caréné et densément squamulé à la base. Yeux séparés seulement par une étroite ligne de squamules. Carènes de la tête courtes. Antennes testacées, le 2. article du funicule de un tiers plus long que le 3.

Prothorax aussi long que large, en avant peu rétréci et les côtés presque rectilignes, les angles postérieurs droits, la base faiblement bisinuée; très fortement impressionné transversalement derrière le bord antérieur, ce dernier relevé, par suite la partie basale assez élevée mais en son milieu plane et pourvue de quelques granules petits et aplatis. Écusson convexe, pubescent.

Elytres de moitié plus longs que larges, brièvement arrondis séparément au sommet, pourvus de trois tubercules sur le 3. interstrie, le 1. près de la base et le plus gros, le 2. petit, le 3. gros, au sommet de la déclivité postérieure, le 5. interstrie caréné de la base à la déclivité; les points des stries gros et pourvus au fond d'une très courte soie squamuleuse.

Pattes grêles et élancées, la dent des fémurs antérieurs et intermédiaires très petite, celle des postérieurs forte. Tarses élancés, étroits, le 1. article deux fois aussi long que le 2., le 2. trois fois aussi long que large et plus du double aussi long que le 3.

Long. 6—7 mm.

Guyane française: Rivière et Roches de Kourou, Nouveau Chantier, 15 spécimens.

Plus étroit que *P. bicristata* Hell. il s'en distingue par les caractères ci-dessus et notamment par la longueur des tarses.

ZYGOPINI.

Zygops cylindrica n. sp.

Allongé, subcylindrique, noir, le revêtement d'un jaune terreux, sur le prothorax formant trois taches basales, la médiane réduite à un trait court, les latérales irrégulièrement triangulaires émettant à leur sommet un court rameau interne, parfois isolé comme une petite macule; sur les élytres le revêtement dense, presque uniforme, les bords latéraux et une tache médiane allongée sur les 3. et 4. interstries noirs. Dessous noir le sommet des épimères et les bords latéraux des quatre derniers segments ventraux squamulés. Pattes densément squamulées, les fémurs noirs à la base.

Rostre large, en avant dilaté et lisse, à la base élargi, densément ponctué et faiblement caréné. Yeux convexes, leur ligne de séparation large et squamulée ainsi que les côtés inférieurs de la tête. Antennes d'un ferrugineux foncé, le 2. article du funicule allongé, presque deux fois aussi long que le 3.

Prothorax cylindrique, à la base plus long que long au milieu, brièvement rétréci au sommet, les côtés subrectilignes, la base subtronquée et brièvement impressionnée, marginée, de chaque côté de l'écusson; convexe, en avant avec un arc profond, la ponctuation extrêmement fine, obsolète, les parties noires parsemées de très petites squamules cendrées. Écusson grand, subvertical, rugueux, squamulé.

Elytres cylindriques, très peu plus larges que le prothorax, plus de moitié aussi longs que larges, brièvement rétrécis et arrondis au sommet; convexes, la suture en avant graduellement élargie, relevée, rugueuse et finement granulée; légèrement mais brièvement impressionnés transversalement vers le quart antérieur sur les trois ou quatre premiers interstries; stries fines, leurs points en avant assez serrés et bien visibles, en arrière plus petits; interstries plans.

Pattes robustes, courtes, les fémurs unidentés, les postérieurs atteignant juste l'apex; tibias larges, comprimés, courts.

Long. 8—9 mm.

Brésil: Goyaz, Jatahy, 4 spécimens, ma collection (en Donckier).

Parazygops curtirostris n. sp.

Subcylindrique, noir, mat, le revêtement squamuleux d'un rouge rosé teinté de jaune et blanc. Tête rouge. Prothorax rouge, avec une grande tache centrale noire, ovale, irrégulière, au milieu en avant avec un lobe court, étroit atteignant presque le bord antérieur, en arrière atteignant la base en face de la 3. strie élytrale, mais coupée par une ligne médiane basale prolongée jusqu'au milieu, la base et les angles postérieurs teintés de jaune ou blancs; les flanes avec une grande tache noire, en partie visible de dessus vers les angles antérieurs, le dessous blanc. Elytres avec des taches et des bandes, dessinant: un losange irrégulier, prolongé en avant, en contournant l'écusson, jusque sur la base de la 3. strie, en arrière par une simple ligne, parfois interrompue, jusque sur le tiers postérieur du 2. interstrie, un peu avant le sommet une large fascie, arquée en avant et se rétrécissant extérieurement, une bordure apicale, quelques taches latérales, quelques taches en avant sur les 5. et 6. interstries. Dessous et pattes densément couverts de squamules cendrées.

Rostre moins du double aussi long que large à sa base, les côtés subparallèles, légèrement échancrés vers l'insertion antennaire, en dessus presque plan, densément squamulé, cendré, avec une carène médiane. Ligne de séparation des yeux, inférieurement très étroite et blanche, supérieurement élargie en triangle et rouge. Antennes d'un ferrugineux foncé.

Prothorax à la base presque deux fois aussi large que long au milieu, peu rétréci en avant, les côtés légèrement sinués en dedans vers le milieu, la base subtronquée; convexe, avec une ligne médiane basale impressionnée et rouge et un arc net derrière le bord antérieur. Écusson invisible, caché par la gibbosité basale de la suture.

Elytres cylindriques, très peu plus larges que le prothorax, presque deux fois aussi longs que larges, convexes, la suture à sa base, fortement élargie, gibbeuse et rugueuse; calus huméral à peine visible; stries fines, leurs points visibles dans les parties blanches; interstries larges et plans.

Pattes élancées, noires; fémurs linéaires, carénés, les antérieurs très brièvement unidentés, les postérieurs bidentés, leur dent antérieure longue et squamulée, leurs genoux noirs, leur lobe extérieur long mais obtus; tibias postérieurs noirs.

Long. 5—6 mm.

Brésil: Goyaz, Jatahy, types, ma collection (ex Donckier); même provenance (diverses collections). Brésil (E. Gounelle, Museum de Paris).

Cette espèce a quelque ressemblance pour la coloration avec *Zygops tricolor* Desbr., la seule espèce avec laquelle on pourrait la confondre, mais le rostre est très différent.

Timorus curvipes n. sp.

Allongé, noir, la pubescence d'un brun jaune sur la tête, le prothorax et la base du rostre, sur les élytres variée de gris, de cendré et de brun, formant en arrière des petites taches cendrées le 2. interstrie vers son milieu avec un point noir entouré de pubescence fauve.

Rostre moins long que le prothorax, épais, rugueux, en arrière tricaréné. Intervalle des yeux large, creusé, densément squamulé, les squamules jaunes et vers la partie supérieure formant une crête latérale de chaque côté. Tête densément squamulée; antennes ferrugineuses.

Prothorax presque aussi long que large à la base, en avant brièvement et brusquement rétréci, derrière le rétrécissement dilaté latéralement en formant une dent triangulaire, les côtés subparallèles au milieu, fortement rétrécis arrondis en arrière; convexe, transversalement déprimé en avant, muni d'une courte mais vive carène médiane, la ponctuation très fine et très serrée. Écusson conique, jaune.

Elytres rectangulaires, très peu plus larges que le prothorax, à peine de moitié plus longs que larges, les épaules accusées, leur calus assez élevé et rugueux, les côtés parallèles jusqu'au quart postérieur; déprimés, les stries fines et ponctuées; interstries convexes, plus fortement à leurs extrémités, les 3., 5., 7., à leur sommet relevés en une crête peu forte, crénelée noire.

Pattes courtes; fémurs munis d'une assez forte dent. Tibias comprimés et fortement arqués, ferrugineux ainsi que les tarses, ces derniers robustes et courts.

Mésosternum pourvu en son milieu d'une carène élevée, longitudinale.

Long. 4,5 mm.

Guyane française. Cayenne, ma collection.

Cette petite espèce s'éloigne considérablement de *T. suturalis* Rosensch. par sa forme étroite, la conformation des pattes et du prothorax; elle se rapproche de *Colpothorax undulata* Desbr. par la forme du prothorax et des élytres, toutefois elle est plus courte et le pygidium complètement recouvert. La présence d'une carène mésosternale, la conformation des pattes, militeraient en faveur d'un nouveau genre.

Hemicolpus abdominalis n. sp.

Brièvement ovale, noir, revêtu d'une pubescence variée, sur les pattes la tête, la partie antérieure du prothorax, ferrugineuse, sur les élytres, d'un gris jaunâtre; épars, plus dense le long de la suture; d'un blanc teinté de roux et dense sur le bord apical le bord postérieur du 2. segment ventral et les segments suivants revêtus d'une dense pubescence blanche, teintée de jaune, condensée en touffes sur les côtés et formant en outre deux touffes sur les 3. et 4. segments, le milieu du bord postérieur du 2. segment creusé d'une profonde cavité brune limitée de chaque côté par une grosse touffe claire; le reste du dessous à pubescence cendrée-brune et assez serrée. La pubescence en dessus est semi-dressée.

Rostre assez densément ponctué, pubescent en arrière, sa ligne médiane moins ponctuée et subglabre. Antennes ferrugineuses, la massue ovale. Yeux séparés par une ligne pubescente.

Prothorax un peu plus large que long, subconique, les côtés peu arqués, la base presque deux fois aussi large que le bord antérieur, à peine resserré derrière le bord antérieur mais les angles latéraux légèrement saillants en avant, les angles postérieurs arrondis; assez fortement convexe et sa ligne médiane caréniforme; la ponctuation forte, serrée et profonde mais voilée par la pubescence, cette dernière plus serrée le long de la ligne médiane et des côtés. Écusson pubescent.

Élytres aussi longs que larges, en demi-ovale, un tiers plus larges que le prothorax, arqués sur les côtés, au sommet séparément arrondis, leur angle sutural aigu et marqué, à pubescence claire; milieu du disque plan, le calus huméral gros et rugueux, le calus postérieur marqué et surmonté d'une grosse touffe de dense pubescence foncée; stries fortes ponctuées et pubescentes; interstries larges, plans, densément et fortement ponctués-rugueux.

Pattes courtes, les fémurs inermes, canaliculés en dessous, non carénés extérieurement, les postérieurs atteignant le niveau du 3. segment ventral.

Long. 5—5,5 mm.

Brésil: prov. de Goyaz, Jatahy (ex Donckier), ma coll. types, (coll. Kraatz). Bello Horizonte, Diamantina (E. Gounelle, Mus. Paris).

Cayenne? (coll. A. Clere).

10 spécimens.

***Cylindrocopturus uniseriatus* n. sp.**

Subcylindrique, brun de poix, les pattes, les antennes et le rostre d'un roux clair, revêtu en dessus d'une fine pubescence d'un cendré soyeux, soulevée, sur le prothorax assez serrée, transversalement dirigée vers la ligne médiane, sur les élytres unisériée, serrée sur les interstries, excessivement courte et peu visible le long des stries; sur le dessous du corps plus grossière, blanche, serrée sur les épimères, les épisternes et devant les hanches antérieures, moins grossière et plus éparse sur l'abdomen

Rostre aussi long que le prothorax, arqué, à la base caréné au milieu, latéralement finement ponctué et à pubescence peu serrée. Yeux subcontigus dans le milieu. Tête glabre, alutacée. Antennes courtes, le 1. article du funicule gros, le 2. beaucoup plus petit et beaucoup plus court que le 1.

Prothorax presque aussi long que large, peu rétréci en avant, les côtés assez fortement et presque régulièrement arqués, la base fortement bisinuée, son lobe médian triangulaire; convexe, à ponctuation fine, profonde, serrée, vers le bord antérieur plus fine et ce bord rougeâtre. Écusson très petit.

Elytres un peu plus larges que le prothorax, un tiers plus longs que larges, rétrécis dans leur tiers postérieur, arrondis au sommet; modérément convexes, déprimés le long de la suture, le calus huméral luisant; profondément sillonnés ponctués, les interstries peu plus larges que les sillons, convexes, avec une série de points serrés et une ligne de pubescence soulevée.

Fémurs inermes, les postérieurs atteignant à peine l'apex. Suture interne des épisternes métathoraciques avec une ligne de granules jaunes.

Long. 2 mm.

Brésil. Diamantina, ma collection (ex Donckier).

***Cylindrocopturus minutus* n. sp.**

Subcylindrique, brun-marron, revêtu en dessus d'une fine pubescence soyeuse, cendrée couchée, formant, sur les élytres deux fascies transversales, l'une basale, l'autre postmédiane, réunies par une ligne suturale entière, sur le prothorax trois bandes très légères. Dessous et pattes à pubescence cendrée et éparse.

Rostre d'un rouge ferrugineux, aussi long que le prothorax, à la base faiblement caréné. Yeux subcontigus dans le milieu. Tête glabre, pointillée alutacée. Antennes testacées, le 2. article du funicule plus long que le 3. et seulement un peu plus court que le 1.

Prothorax aussi long que large, presque d'égale largeur à ses extrémités, les côtés assez régulièrement mais peu fortement arqués; convexe, à ponctuation fine, très serrée, granuleuse. Écusson très petit, pubescent.

Elytres un peu plus larges que le prothorax, de un tiers plus longs que larges, parallèles, séparément arrondis au sommet; peu convexes, le calus huméral petit; finement striés-ponctués, les interstries de 2 à 3 fois aussi larges que les stries, plans, finement rugueux, à pubescence irrégulièrement bisériée, brune et cendrée, les deux fascies cendrées réunies non seulement sur la suture mais encore sur les 4. et 5. interstries. Bord apical marginé de ferrugineux.

Fémurs bruns, inermes, les postérieurs n'atteignant pas l'apex; tibias et tarses roux. Suture interne des épisternes avec une ligne de granules jaunes.

Long. 1,7 mm.

Guyane française: Nouveau Chantier, ma collection.

Hoplocoturus punctum-album n. sp.

Rhomboidal, d'un brun rouge, les antennes et les pattes testacées, le revêtement dorsal dense et unicolore d'un jaune de paille ou grisâtre, les côtés des élytres dénudés, rougeâtres du 7. interstrie au bord, ornés d'une petite tache blanche vers le tiers postérieur des 7. et 8. interstries, d'une autre sur le bord vers les épisternes, et parfois d'un point blanc près du sommet. Base du rostre et dessous (épimères mesothoraciques exceptés) densément couverts de squamules blanches, moins serrées sur le milieu du métasternum et sur les pattes.

Rostre noir, souvent ferrugineux à la base, dépassant les hanches intermédiaires, densément squamulé à la base, lisse et luisant en avant. Vertex squamulé à l'exception d'un petit triangle densément ponctué.

Prothorax conique, presque deux fois aussi large à la base que long au milieu, les côtés très peu arqués et à squamules plus serrées, modérément convexe, la ponctuation fine, serrée, voilée par le revêtement. Écusson pubescent.

Elytres triangulaires, sensiblement plus longs que larges, un tiers plus larges que le prothorax; peu convexes, légèrement déprimés le long de la suture, le calus huméral arrondi et en partie glabre, les stries fines, leurs points peu serrés et squamulés, les interstries plans, 2—3 fois aussi larges que les stries ponctués-coriacés, pourvus de 3—4 rangs irréguliers de poils squamuleux légèrement soulevés.

Pattes très allongées, les fémurs très finement dentés, leurs genoux avec une dent aiguë.

Long. 3—3,2 mm.

Pérou: Madre de Dios, 500 m d'alt. ma coll. (ex Staudinger); Pérou (coll. A. Clere, Pape).

Hoplocoturus minutus n. sp.

Rhomboidal, brun, les pattes, les antennes et le rostre roux, revêtu en dessus de poils squamuleux peu serrés, grisâtres et jaunâtres, un peu plus serrés le long de la suture, les poils blancs plus serrés et formant une petite tache vers le tiers postérieur des interstries 7—9.

Dessous densément couvert de squamules blanches, ovales, plus allongées sur le prosternum, piliformes sur les épisternes, mais à leur sommet serrées et formant une petite tache. Pattes assez densément couvertes de poils squamuleux cendrés.

Rostre dans son tiers basal fortement et triangulairement dilaté, densément squamulé de blanc, obsolètement caréné, la partie antérieure cylindrique, arquée glabre, lisse, luisante. Yeux cernés de squamules blanches et serrées.

Prothorax subtrapézoïdal, moins long que large, les côtés un peu arqués et densément squamulés, le bord antérieur moitié aussi large que la base; convexe, transversalement impressionné derrière le bord antérieur, la ponctuation fine, très serrée, rugueuse, subgranuleuse, la ligne médiane étroitement caréni-forme dans le milieu. Écusson petit, subglabre.

Elytres triangulaires, pas plus longs que larges, les épaules obliquement arrondies, leur calus petit mais élevé et glabre à son sommet; au sommet subarrondis ensemble; disque peu convexe, légèrement impressionné le long de la suture, d'un brun ferrugineux, les côtés noirâtres, les stries fines, les interstries trois fois aussi larges que les stries, plans, rugueux.

Fémurs très finement dentés, les postérieurs dépassant longuement l'apex, la dent de leur genou aiguë mais courte.

Long. 2—2,3 mm.

Brésil: Fort Nacional, type (ma coll.); Jatahy (coll. Kraatz, ex Donckier); Matto Grosso, Corumba (A. Clerc, ex Staudinger).

Hoplocopturus bifasciatus n. sp.

Noir, le revêtement squamuleux varié; prothorax rouge, étroitement blanc sur les côtés et tout le dessous, élytres avec la suture, une étroite bordure basale, deux fascies transversales d'un blanc cendré, la 1. fascie peu oblique, commençant derrière l'écusson et atteignant le tiers antérieur du bord latéral, la 2. commençant vers le milieu, dirigée vers le tiers postérieur du bord latéral, interrompue sur le 5. interstrie, plus blanche sur les 6. et 7. interstries, effacée sur les interstries marginaux, ces deux fascies formées de linéoles, ces linéoles plus longues sur les interstries 1 et 2 et en avant atteignant la base. Dessous entièrement blanc. Pattes rouges, densément revêtues de poils squamuleux blancs.

Antennes testacées. Rostre rouge, à sa base densément squamulé, blanc; vertex rouge. Prothorax conique, au milieu moitié aussi long que large à sa base, cette dernière du double aussi large que le bord antérieur, convexe, légèrement impressionné transversalement en avant, la ponctuation fine, serrée, peu visible, la ligne médiane convexe, non carénée, pubescente, la base avec une étroite bordure cendrée. Écusson subglabre.

Elytres à peine plus longs que larges, peu arqués sur les côtés, modérément rétrécis en arrière, le sommet du calus huméral foncé, les stries fines, ponctuées et pubescentes, les interstries dorsaux de 2 à 3 fois aussi larges que les stries et pourvus de deux lignes de poils squamuleux, les interstries latéraux moins larges et plus fortement sculptés. Fémurs très finement, obsolètement dentés.

Long. 2,3—2,6 mm.

Petite espèce qui semble variable de coloration; les pattes et même le rostre sont parfois d'un brun foncé, les fascies des élytres peuvent s'effacer plus ou moins, particulièrement chez la forme suivante:

Var. *ferrugineus* n. var.

Elytres roux, comme le prothorax.

Pérou: Pachitea, forme type et var., types dans ma collection (ex Staudinger); même origine (coll. A. Clerc); Marcapata, ma coll. (ex Staudinger). Pérou (coll. Pape).

14 spécimens.

Cette espèce plus petite que *H. concinnus* Boh.; les spécimens à pattes foncées pourraient être confondus avec cette dernière; ils s'en distinguent par leur taille et l'absence de tache noire sur la base du prothorax.

Hoplocopturus bolivianus (Faust in litt.) n. sp.

Rhomboidal, noir, les antennes testacées, les tarses roux, le revêtement dorsal fin, varié, rouge sur plus de la moitié antérieure du prothorax et le bord supérieur des yeux, blanc et formant une large bande basale sur le prothorax, largement interrompue au milieu, sur les élytres deux bandes obliques, latérales, composées de taches, l'une vers le tiers postérieur, s'étendant du 7. interstrie au bord et très blanche, l'autre vers le tiers antérieur, moins blanche, se perdant dans la pubescence dorsale, cette dernière grisâtre assez dense, ménageant de chaque côté trois grandes taches noires séparées par les bandes latérales, la base et le sommet étroitement gris. Dessous avec la moitié postérieure du métasternum et l'abdomen, la moitié antérieure des épimères, la moitié postérieure des épisternes blancs; sur le 1. segment ventral une large tache latérale, sur le 2. une petite noires. Pattes densément revêtues de squamules blanches.

Prothorax à ponctuation fine et très serré. Elytres triangulaires, un peu plus longs que larges, assez fortement rétrécis en arrière, les côtés très peu arqués.

Quant au reste semblable à *H. ruficeps* Kirsch dont elle se distingue par sa taille moindre, la forme et le dessin des élytres.

Long. 3,5—4,7 mm.

Bolivie: Yungas, type, ma coll. (ex Staudinger); Yungas de la Paz, 1000 m d'alt. (ex H. Rolle).

Pérou: Marcapata, Callanga, Ocobambe (ex Staudinger, diverses collectionne); Sa Madre de Dios (coll. A. Clerc).

Hoplocopturus cionus (Heller in litt.) n. sp.

Rhomboidal noir, le dessin squamuleux varié; sur le prothorax brun, sur les élytres d'un brun jaune, blanchâtre sur le tiers postérieur de la suture, blanc et formant une macule vers le tiers postérieur des 6. et 7. interstries; le prothorax avec une grande tache basale noire, subtriangulaire, dépassant le milieu en avant, divisée en deux parties par la ligne caréniforme médiane et brune; la partie latérale noire des élytres, en avant s'avancant en forme de triangle jusqu'au 1. interstrie, la base restant étroitement brune, vers le milieu atteignant le 5. interstrie, interrompue par le point blanc, couvrant, presque tout le tiers postérieur du disque (bord apical étroitement roux), et remontant obliquement en avant du 3. au 1. interstrie, la suture entièrement squamulée. Dessous avec un dessin blanc comprenant sur les flancs du prothorax une grande tache en demi ovale, son bord inférieur rectiligne, son bord supérieur arqué, n'atteignant pas les lobes oculaire, cette bande visible de haut comme

une ligne latérale étroite; métathorax et la moitié postérieure de leurs épisternes, abdomen, blancs. Antennes et tarses testacés. Une ligne de granules jaunes le long de la suture épisternale. Pattes à revêtement cendré, dense.

Rostre à la base à squamules blanches. Prothorax conique, transversal, les côtés droits; convexe, à ponctuation très serrée, la ligne médiane caréniforme. Écusson glabre.

Elytres triangulaires, aussi longs que larges, le calus huméral noir, les stries ponctuées et squamulées, les interstries plans.

Long. 3,3 mm.

Pérou: Marcapata, type, ma coll. (ex Staudinger).

Var. *albiventris* n. var.

Dessous complètement revêtu de squamules blanches très serrées. Prothorax un peu plus court, son revêtement analogue à celui des élytres et d'un jaune grisâtre, la bande marginale blanche plus large, le disque avec quelques poils cendrés.

Pérou: Marcapata, Callanga (coll. Kraatz).

Hoplocopturus versicolor n. sp.

Oblong, les pattes et le dessus d'un brun rougeâtre, le disque du prothorax et les côtés des élytres plus foncés, noirâtres, le prothorax dénudé sur le disque, avec une bande latérale squamuleuse d'un brun jaune, le dessous blanc, densément squamulé. Elytres revêtus de poils squamuleux acuminés à leur base, de coloration variée, blancs, teintés de jaune, d'un brun noir, courts, peu serrés, ne voilant pas les téguments, la suture ornée d'une bande jusqu'en son milieu et d'une linéole apicale blanches, le 7. interstrie avec un point médian blanc. Pattes à revêtement peu dense, les fémurs postérieurs avec une tache blanche avant le genou. Métasternum et abdomen avec des squamules ovales, blanches, beaucoup moins serrées que celles du prosternum.

Rostre au sommet rougeâtre, lisse, luisant, à la base fortement dilaté, rugueusement ponctué, avec une forte carène médiane prolongée entre la base des yeux. Antennes testacées, le 2. article allongé, beaucoup plus long que le 1. aussi long que les trois suivants ensemble, la massue ovale, son 1. article moitié de sa longueur totale. Yeux entourés de squamules jaunes sur leur moitié inférieure, leur ligne de séparation étroite, enfoncée et glabre.

Prothorax subconique, à peu près aussi long au milieu que large à la base en face des 6. stries, en avant modérément rétréci mais largement quoique peu fortement resserré; disque presque plan, à ponctuation assez forte, modérément serrée, les intervalles des points lisses et luisants, la ligne médiane imponctuée, lisse et large. Écusson arrondi, glabre.

Elytres triangulaires, aux épaules très obliquement dilatés arrondis et un tiers plus larges que le prothorax, un quart plus longs que larges; modérément convexes, légèrement déprimés sur la moitié antérieure de la suture, le calus huméral gros, glabre, lisse au sommet; sillonnés ponctués, les interstries de 2 à 3 fois aussi larges que les sillons, plans, densément ponctués rugueux.

Pattes élancées; fémurs linéaires, unicarénés, unidentés, les postérieurs n'atteignant pas tout à fait l'apex, le lobe intérieur de leurs genoux, prolongé par une forte dent aiguë. Suture épisternale avec une série de granules jaunes.

Saillie mésosternale profondément creusée, ses côtés à pic, le bord antérieur du métasternum à peine impressionné.

Long. 4,5—5 mm.

Brésil: Minas Geraes, Matusinhos, type, ma coll. (A. E. Gounelle, ex Donckier); Nova Friburge (Id.).

L'ensemble des caractères génériques de cette espèce la rapproche des *Hoplocopturus*, mais la conformation de son mésosternum nécessitera sans doute, plus tard, la création d'un nouveau genre.

***Hoplocopturus aequatorialis* n. sp.**

Espèce très voisine de *H. varipes* Champ. dont elle se distingue par les antennes plus robustes, le 2. article un peu moins du double aussi long que le 3., les yeux dans leur partie supérieure sensiblement plus écartés, le prothorax visiblement plus long et par suite moins transversal, le calus huméral un peu plus gros, les fémurs un peu plus épais, les postérieurs à dent obtuse beaucoup plus forte.

Long. 5 mm.

Equateur: Ambato, ma collection; Hac. Ana Maria, Quevedo (Museum de Hamburg).

Bien que la nouvelle espèce soit très voisine de *H. varipes*, tant par la forme que par le revêtement, elle s'en distingue par le prothorax plus long et la dent obtuse mais forte des fémurs postérieurs.

***Lissoderes heterorostris* n. sp.**

Noir, peu luisant, en dessus à pubescence très fine, blanche, peu visible, un peu plus longue, plus serrée et plus distincte sur le tiers basal des élytres et sur la base du prothorax; sur les pattes et le dessous la pubescence plus longue, plus distincte, devenant serrée sur le sommet des épimères et sur les épisternes, ces derniers avec une série de granules jaunes sur leur suture interne.

Rostre: ♂, comprimé latéralement en arrière, dilaté et obtusément caréné latéralement vers son tiers antérieur, densément ponctué, mat, sa carène médiane forte, s'effaçant seulement à ses extrémités; ♀ en arrière modérément comprimé, densément ponctué, caréné au milieu, en avant peu dilaté, luisant, pointillé. Antennes ferrugineuses. Tête pointillée en avant, mate.

Prothorax cylindrique, plus large que long, à peine moins large en avant qu'à la base; fortement convexe, subgibbeux vu latéralement, la ponctuation fine et très serrée sur le disque, éparse et les intervalles des points luisants sur les flancs.

Elytres un peu plus longs que larges, faiblement rétrécis en arrière, la suture déprimée et en partie imponctuée et lisse, tous les interstries pourvus d'une série de points râpeux, émettant chacun un poil excessivement court et foncé.

Long. 3,2 mm environ.

Cette espèce diffère de *L. subnudus* Champ., génotype et unique espèce connue par les caractères indiqués ci-dessus. Les différences du rostre sont accusées suivant les sexes.

Pérou: Pachitea, type ♂, Madre de Dios, type ♀, ma coll. (ex Staudinger); Pérou (coll. A. Clerc).

Brésil: Serra de Baturite (E. Gounelle in Mus. Paris).

COPTUROMORPHA CHAMP.

Champ. Biol. Centr. Amer. Col. IV, 5, 1906—09 (1906) p. 65.

Une quinzaine d'espèces de l'Amérique méridionale peuvent être rattachées à ce genre, lequel ne comprend que de petites espèces.

Tableau des espèces.

1. Fémurs inermes; prothorax ordinairement non caréné, mais parfois avec une ligne médiane lisse 2
Fémurs dentés, parfois très brièvement 3
2. Prothorax caréné. Antennes avec le 2. article du funicule moins long que le 1. Meso et métasternum non impressionnés mais séparés par une ligne arquée 15. brevicornis
Prothorax non caréné 4
3. Deuxième article du funicule moins long que le 1. 5
Ce même article un peu plus long que le 1. 8. mutica
4. Squamules élytrales étroites, linéaires: 12. oblongula, 14. épisternalis.
Squamules élytrales en majeure partie ovales ou lancéolées:
9. seriata, 13. ornata.
5. Prothorax non caréné 6
Prothorax caréné: 10. dispersa, 11. ochracea.
6. Funicule avec le 2. article tout au plus aussi long que le 1. 7
Ce même article sensiblement plus long que le 1. 8
7. Antennes noires: 6. obscura, 7. nigricornis.
Antennes ferrugineuses: 4. signatella, 5. variegata.
8. Deuxième article du funicule au moins aussi long que les trois suivants réunis: 2. diffusa, 1. nigrobasalis.
Ce même article moins long que les trois suivants ensemble: 3. fulva.

1. *Copturomorpha nigrobasalis* n. sp.

Ovale, noir, mat, le revêtement dorsal d'un gris jaunâtre, composé de squamules linéaires, légèrement noulevées, le prothorax dessudé, noir, ses côtés squamulés, les élytres avec une grande tache triangulaire noire, squamuleuse, plus foncée en arrière où elle atteint le milieu de la suture, suivie d'une courte tache cendrée s'étendant sur la suture et un ou deux interstries. Dessous et pattes à revêtement concolore assez dense, les squamules ovales, plus fines sur les pattes.

Rostre arqué, en avant ferrugineux, lisse et à ponctuation fine et éparse, en arrière rugueusement ponctué et avec une carène médiane. Yeux séparés par une ligne squamuleuse enfoncée et assez large, les lobes oculaires arrondis et assez accusés. Antennes ferrugineuses, le 2. article du funicule aussi long que les quatre suivants ensemble, les 3. et 4., courts, un peu plus longs que larges, la massue ovale, son 1. article moitié de la longueur totale.

Prothorax peu plus large que long, peu rétréci en avant, la base fortement bisinuée, les côtés subparallèles dans leur moitié basale, derrière le bord antérieur assez fortement étranglé; modérément convexe, la ponctuation très serrée, subgranuleuse, avec une étroite ligne médiane relevée, lisse et abrégée en avant. Écusson petit et noir.

Elytres en demi-ovale, plus larges que le prothorax, un peu plus longs

que larges, arrondis ensemble au sommet, le calus huméral gros et dénudé, les stries fines, ponctuées et pubescentes, les interstries légèrement convexes et rugueux.

Pattes robustes, courtes, brunes; fémurs linéaires, uni-carénés extérieurement, munis en dessous d'une dent triangulaire peu aiguë, faible, les postérieurs ne dépassant pas le 2. segment ventral, les lobes de leurs genoux arrondis; tibias assez larges et faiblement comprimés. Hanches postérieures terminées par un tubercule conique. Mésosternum impressionné, le bord antérieur du métasternum profondément fovéolé.

Long. 4 mm.

Brésil: Goyaz, Jatahy, ma collection, 5 exemplaires (ex Donckier).

Malgré la longueur du 2. article du funicule cette espèce appartient aux Copturomorpha.

2. *Copturomorpha diffusa* n. sp.

Ovale, brun, le revêtement dorsal varié, brun et cendré, épars, formé de squamules linéaires, ou dancéolées, les élytres avec un point cendré vers le milieu de la suture. Dessous avec des squamules ovales, jaunâtres assez serrés.

Rostre gros, court, au sommet ferrugineux et lisse, à la base caréné et squamulé. Antennes ferrugineuses, le 2. article du funicule de moitié plus long que le 1. et aussi long que les trois suivants ensemble, le 4. oblong et un peu plus long que large, la massue elliptique. Yeux séparés par une assez large ligne squamulée et approfondie.

Prothorax de un tiers plus large que long, assez fortement rétréci en avant et largement resserré derrière le bord antérieur, le côté oblique; fortement convexe devant l'écusson, le sommet de la convexité avec une courte carène, la ponctuation peu profonde, serrée, voilée par le revêtement, les squamules plus denses et plus jaunes sur les côtés. Écusson glabre.

Elytres en demi-ellipse, en arrière assez fortement rétrécis et au sommet brièvement arrondis ensemble, le calus huméral assez saillant, ponctué, en partie glabre; stries fines, ponctuées et pubescentes; interstries convexes, densément rugueux.

Pattes courtes, rugueuses; fémurs carénés extérieurement, obtusément dentés en dessous; tarses roux. Bord antérieur du métasternum impressionné.

Long. 3,5—3,7 mm.

Brésil: Goyaz, Jatahy, ma collection (ex Donckier).

3. *Copturomorpha fulva* n. sp.

Ovale, brun, le revêtement d'un jaune fauve, très dense et plus jaune sur les 4 derniers segments ventraux, le milieu de ces derniers traversé par une bande dénudée, le disque du prothorax à squamules éparses, plus serrées et formant une petite tache devant l'écusson, les élytres revêtus de nombreuses squamules linéaires, traversés par des ondulations dénudées.

Rostre au sommet ferrugineux, lisse et luisant, à la base rugueux, squamulé, caréné au milieu. Yeux complètement entourés par une ligne squamuleuse jaune. Antennes ferrugineuses, le 2. article peu plus long que le 1. et moins long que les 3. et 4. ensemble, le 4. aussi long que les 5. et 6. ensemble, le 7. contigu à la massue, cette dernière ovale et son 1. article les deux tiers de la longueur totale.

Prothorax fortement transversal, resserré et brièvement rubuleux en avant, les côtés modérément arqués, la base fortement bisinuée; modérément convexe, la ponctuation fine, très serrée, brièvement caréné sur sa ligne médiane. Écusson petit et glabre.

Elytres en demi-ovale, largement arrondis ensemble au sommet, ample-ment de moitié plus larges que le prothorax, le calus huméral assez grand mais peu élevé et en partie glabre; stries fines, ponctuées et pubescentes; interstries larges, plans, les latéraux, particulièrement vers le calus huméral, transversalement rugueux granulés.

Pattes courtes, robustes, brunes, les tibias et les tarses ferrugineux; fémurs unicarénés extérieurement, armés en dessous d'une faible dent triangulaire et obtuse, les tibias postérieurs assez larges et comprimés. Mésosternum et bord antérieur du métasternum non impressionnés.

Long. 3,5—4 mm.

Brésil: Goyaz, Jatahy, trois spécimens, ma collection (ex Donckier).

4. *Copturomorpha signatella* n. sp.

Oblong, noir, mat, la pubescence dorsale extrêmement courte et noire, parsemée de très courts poils squamuleux cendrés, plus abondants sur les côtés, les élytres avec un dessin squamuleux blanchâtre, tranché, comprenant: une macule sur l'épaule, un trait vers le tiers postérieur de la suture flanqué de chaque côté d'un trait plus court et un peu plus avancé sur le 2. interstrie, d'une bordure apicale sur 2 ou 3 interstries. Dessous et pattes à revêtement dense et cendré, les fémurs postérieurs avec un anneau noir près du genou.

Rostre d'un rouge ferrugineux, en avant glabre et pointillé (♀), plus fortement (♂), à la base très densément squamulé et avec une fine carène médiane. Yeux séparés par une ligne assez étroite et glabre à la base, s'élargissant graduellement jusqu'au sommet, vers le milieu et le sommet squamulée, la tête densément ponctuée, glabre, mais pourvue contre les yeux vers leur sommet d'un petit arc squamulé, blanchâtre. Antennes ferrugineuses, le 2. article du funicule seulement aussi long que le 1., la massue étroite, elliptique.

Prothorax un quart plus large que long, modérément rétréci mais distinctement resserré en avant, les côtés assez fortement et presque régulièrement arqués, la base très faiblement bisinuée; très convexe, la ponctuation très fine, très serrée, peu visible; noir, les côtés cendrés, les angles postérieurs à pubescence teintée de jaunâtre. Écusson noir.

Elytres en demi-ovale, un tiers plus larges que le prothorax, un peu plus longs que larges, arrondis au sommet, le calus huméral fort, cendré en avant; convexes, les stries très fines, les interstries plans.

Pattes courtes, d'un rouge ferrugineux, les fémurs linéaires, non carénés, finement dentés. Mesosternum non impressionné; suture épisternale sans ligne de granules.

Long. 3—3,3 mm.

Argentine: Gob. Misiones (C. Bruck), ma collection.

5. *Copturomorpha variegata* n. sp.

Oblong, brun foncé, le revêtement dorsal varié de cendré et de jaunâtre, les squamules cendrées formant sur le prothorax trois taches basales peu tranchées, sur les élytres une petite tache sur l'épaule, une bande sur les deux tiers antérieurs de la suture dilatée à la base sur les deux interstries adja-

cents, ce dessin peu tranché; pattes brunes, leur revêtement peu dense, les fémurs avec un large anneau foncé. Dessous à revêtement assez dense composé de squamules ovales, blanches et jaunes entremêlées.

Rostre ferrugineux, arqué, aussi long que le prothorax, en arrière densément et rugueusement ponctué, squamulé de jaune latéralement, la ligne médiane lisse, caréniforme. Yeux séparés dans le milieu par une ligne squamulée, dans leur partie supérieure par un ovale profond et squamulé; la carène du vertex pénétrant à peine entre les yeux. Antennes ferrugineuses, la massue rembrunie, le 2. article du funicule de moitié plus long que le 3., les trois derniers épaissis et globuleux, la massue ovale, son 1. article plus long que la moitié de sa longueur.

Prothorax à peine plus large que long, les côtés modérément arqués jusqu'au quart antérieur, en avant à peine plus étroit qu'à la base, assez largement mais faiblement resserré, la base fortement bisinuée; fortement convexe, les points forts, très serrés, tapissés de squamules ovales. Écusson étroit, petit, cendré.

Elytres en demi-ovale, moitié plus longs que larges, au sommet brièvement arrondis séparément, à la base de un tiers à peine plus larges que le prothorax, le calus huméral saillant et squamulé; disque déprimé; étroitement sillonnés-ponctués, les sillons squamulés, les interstries 2—3 fois aussi larges que les sillons, plans, fortement ponctués-rugueux, avec deux ou trois séries irrégulières de squamules jaunes ou cendrées, ces dernières plus grosses.

Pattes rugueuses; fémurs linéaires, unicarénés extérieurement, très brièvement dentés en dessous, les postérieurs dépassant le 3. segment ventral, leurs genoux inermes. Tibias et tarses ferrugineux.

Saillie mésosternale plane, verticale, non impressionnée.

Long. 3,5 mm.

Brésil: prov. de Goyaz, Jatahy, types, ma coll. (ex Donckier).

6. *Copturomorpha obscura* n. sp.

Ovale, noir-brun, mat, le revêtement dorsal cendré formant sur le prothorax trois bandes peu tranchées, la médiane étroite, les latérales plus larges, sur les élytres une bande suturale élargie sur son tiers basal où elle recouvre les trois premiers interstries, au-delà du milieu où elle envahit le 1. et parfois le 2. interstrie, le reste des téguments revêtu d'une très courte pubescence noire, parsemée ça et là de quelques poils cendrés, le dessin cendré formé sur les élytres de squamules linéaires, légèrement soulevées, sur le prothorax plus ovales, plus petites et appliquées. Dessous et pattes densément revêtus de squamules grisâtres, beaucoup plus fines sur les pattes, ces dernières presque concolores, leurs genoux seulement un peu plus clairs.

Rostre noir, lisse et luisant en avant, obsolètement caréné et faiblement squamulé à la base. Yeux séparés par une ligne squamuleuse assez large, dans la partie supérieure élargie, enfoncée, glabre au commencement de l'élargissement. Antennes noires, le 2. article du funicule plus court que le 1., les suivants pas plus longs que larges, serrés, la massue étroite.

Prothorax à peine plus large à la base que long au milieu, faiblement rétréci et très légèrement sinué en dedans en avant; modérément convexe, à ponctuation fine et très serrée. Écusson arrondi, cendré.

Elytres en demi-ovale, peu plus larges que le prothorax, un tiers plus longs que larges ensemble, les épaules très obliquement arquées, au sommet largement arrondis ensemble et le bord marginal étroitement ferrugineux, le calus huméral assez élevé et à sa base avec une petite tache squamuleuse grisâtre; stries étroites, profondes, ponctuées et pubescentes; interstries plans, densément ponctués rugueux; sommet du 1. interstrie, comme la suture avec des poils squamuleux cendrés.

Pattes courtes, robustes; fémurs unicarénés extérieurement, obsolètement dentés en dessous; tibias et tarses d'un brun ferrugineux. Mésosternum non impressionné.

Long. 2,8—3 mm.

Brésil: Goyaz, Jatahy, ma collection (ex Donckier).

7. *Copturomorpha nigricornis* n. sp.

Oblong, brun, le revêtement dorsal assez dense, varié, composé de poils squamuleux jaunâtres et bruns, de petites squamules ovales blanches cendrées, sur le prothorax en majeure partie jaunâtre, peu serré, avec trois lignes obsolètes cendrées, la médiane longuement interrompue dans le milieu; les élytres avec une étroite ligne suturale cendrée, une étroite fascie jaunâtre, vers le tiers antérieur et formée d'une macule sur les interstries 2, 3, 4, d'un trait assez large, blanc vers le milieu du 2. interstrie, un point blanc vers le tiers postérieur du 4., la base parsemée de squamules cendrées. Dessous et pattes assez densément revêtus de squamules cendrées, tapissant les points, entremêlées de squamules jaunes sur le prosternum, mais blanches et très serrées contre les yeux.

Rostre noir, à la base fortement élargi, caréné au milieu et assez densément squamulé. Antennes noires, le sommet du scape fortement épaissi, le 2. article du funicule à peine aussi long que le 1. Ligne interoculaire, en avant assez large et avec deux lignes de squamules, supérieurement élargie et squamulée. Tête ponctuée, squamulée autour des yeux, le vertex avec une plaque triangulaire mate, nette, échancrant la bordure squamulée des yeux.

Prothorax un peu plus large que long, faiblement rétréci en avant, les côtés peu arqués, la base faiblement bisinuée; modérément convexe, en avant transversalement impressionné et d'un brun ferrugineux, la punctuation fine, très serrée, ruguleuse. Écusson arrondi, squamulé.

Elytres en demi-ovale, un peu plus longs que larges, largement arrondis au sommet, le calus huméral peu élevé et rugueux; peu convexes, les stries fines, profondes, ponctuées, pourvues d'une ligne de poils cendrés, plus visibles vers la base; interstries rugueux, leur pubescence irrégulièrement bisériée.

Pattes d'un brun ferrugineux, les tarses rougeâtres; fémurs linéaires, carénés extérieurement, brièvement dentés, les postérieurs atteignant à peine le bord postérieur du 2. segment ventral, le lobe interne de leurs genoux triangulaire; tibias robustes. Mésosternum non impressionné. Suture épisternale sans ligne de granules.

Long. 3 mm.

Argentine: Gob. Misiones (C. Bruch), ma collection.

Cette espèce se rapproche par sa forme de *C. obscura* m., elle est cependant plus large, le dessin plus tranché.

8. *Copturomorpha mutica* n. sp.

Oblong, brun foncé, densément revêtu en dessous de squamules ovales et cendrées, sur les pattes les squamules plus fines et moins serrées. Prothorax avec quelques squamules ovales cendrées, un peu plus nombreuses sur les côtés et formant une bande latérale vague. Elytres avec des squamules cendrées, oblongues, unisériées sur les interstries, de chaque côté avec une bande foncée commençant derrière le calus huméral, oblique, dans le milieu s'étendant sur les interstries 4—6, atteignant la suture au sommet, un peu avant ce dernier interrompue par une petite tache cendrée, peu marquée, la suture cendrée sur toute sa longueur.

Rostre subcylindrique, noir, luisant, éparsément pointillé, atteignant le milieu des hanches intermédiaires, à sa base brièvement et faiblement élargi, squamulé de chaque côté, brièvement caréné au milieu chez le ♂. Yeux grands, acuminés inférieurement, contigus au milieu, au sommet divergents et leur intervalle logeant le prolongement de la carène du vertex. Antennes fines d'un brun de poix, insérées vers le tiers du rostre; ♀ le 2. article du funicule un peu plus long que le 1., deux fois aussi long que le troisième, les 3. et 4. subégaux, les suivants non épaissis, le 7. seulement aussi long que large, la massue très étroite, son 1. article plus de la moitié de sa longueur totale; ♂, plus courtes, plus épaisses, la massue ovale. Vertex ponctué, sa carène médiane lisse prolongée entre les yeux presque jusqu'au milieu, squamulée chez le ♂.

Prothorax plus long (♀) ou aussi long (♂) que large à la base, peu rétréci en avant et les côtés faiblement arqués la base faiblement bisinuée; modérément convexe, la ligne médiane étroitement carénée et parfois avec des squamules cendrées, particulièrement chez le ♂, la ponctuation très serrée, rugueuse, les points tapissés de squamules d'un brun foncé, les bandes claires latérales réduites parfois à une tache basale et triangulaire. Écusson petit, cendré.

Elytres un tiers seulement plus longs que le prothorax, triangulaires (♂), les côtés plus arqués (♀), peu plus longs que larges, obliquement arrondis aux épaules, leur calus très élevé, lisse et glabre à son sommet; disque déprimé; striés-caténulés, les points squamulés dans les parties claires; interstries moins larges que les sillons, carénés, avec une ligne de points forts, serrés, squamulés.

Pattes élancées; fémurs linéaires, unicarénés extérieurement, en dessous inermes mais assez profondément sillonnés, les postérieurs n'atteignant pas tout à fait l'apex (♂), un peu plus courts (♀), leurs genoux inermes. Tibias et tarses ferrugineux, les tibias normaux, assez épais, les lobes du 3. article tarsal très courts.

♂. Saillie mésosternale fortement impressionnée et de chaque côté avec un tubercule squamulé; ♀ faiblement impressionnée, les tubercules très petits. Long. 2,5—3,8 mm.

Brésil: prov. de Goyaz, Jatahy, une série de spécimens (ex Donckier), ma collect. types, (coll. A. Clerc, H. Portevin, Kraatz). Diamantina (ex Donckier).

9. *Copturomorpha seriata* n. sp.

Noir, oblong, allongé, revêtu en dessus de squamules brunes et linéaires, blanches et ovales ou lancéolées, le prothorax avec trois taches basales blan-

ches, la médiane petite, les latérales plus grosses et parfois vaguement prolongées en avant par une bande droite en partie cendrée, les élytres avec des squamules blanches le long de la base, condensées en formant une petite tache devant le calus huméral, alignées au fond des stries, plus denses tout le long de la suture sauf au sommet et sur le 1. interstrie sur ses deux tiers antérieurs, les bords latéraux avec quelques squamules, parfois condensées en un point blanc derrière le milieu du 7. interstrie, toutes les squamules blanches et brunes parfaitement alignées. Dessous et pattes couverts de squamules créta-cées, celles des pattes plus petites.

Rostre en avant très lisse, à la base fortement et triangulairement élargi, densément squamulé, les squamules blanches et ocrés, mlangées, la carène médiane vive. Antennes rousses, courtes, le 2. article du funiculaire moins long que le 1., les suivants courts, le 7. et la massue noirs. Yeux séparés par une assez large ligne squamulée. Vertex squamulé, sa plaque dénudée étroite, pénétrant entre les yeux, couverte de très fines stries transversales et serrées.

Prothorax subconique, aussi long que large, faiblement rétréci en avant, brièvement et légèrement resserré derrière le bord antérieur; peu convexe, la ponctuation grosse, profonde, très serrée, les points remplis par les squamules. Écusson large et très court, glabre.

Elytres peu plus larges que le prothorax, triangulaires, fortement rétrécis en arrière, le calus huméral assez saillant et en partie luisant; disque déprimé, les stries profondes, ponctuées, les interstries étroits, pas plus larges que les stries, avec une série de points et de squamules.

Pattes courtes, fémurs linéaires, inermes en dessous, unicarénés extérieurement, les lobes de leurs genoux aigus, les postérieurs atignant le 4. segment ventral; tibias et tarses roux. Bord antérieur du métasternum et mésosternum échancrés par une profonde fovéole.

Long. 2,5—3 mm.

Paraguay (Gonzales), type, ma collection (ex Staudinger).

Brésil: Corumba, Matto Grosso (A. Clerc); Santos (J. Metz, coll. Kraatz); Serra de Baturita (E. Gounelle, Mus. Paris).

Espèce voisine de *C. mutica* m. dont elle diffère par le prothorax plus court, sans carène et à ponctuation plus forte, les élytres plus courts.

10. *Copturomorpha dispersa* n. sp.

Ovale rhomboidal, brun, les pattes et les antennes ferrugineuses, revêtu en dessus de courts poils sétiformes, jaunes de paille, espacés, luisant apercevoir les téguments, plus serrés sur les côtés du prothorax, sur la base des élytres, sur leur sommet, et formant une linéole sur le milieu de la suture et du 1. interstrie. Dessous revêtu de squamules lancéolées, cendrées, assez serrées, la suture interne des épisternes avec une série de granules petits et jaunes.

Rostre ferrugineux au sommet, caréné, rugueux et squamulé à la base. Antennes courtes, le 2. article à peine plus long que le 1. mais plus long que les 3. et 4. ensemble, le 4. ovale et indistinctement plus long que large, la massue oblongue, son 1. article conique et deux tiers de la longueur totale. Yeux séparés par une étroite ligne squamulée, au sommet fortement élargie. Lobes oculaires nuls.

Prothorax fortement transversal, en avant un peu rétréci et obsolètement resserré, les côtés faiblement arqués en arrière, obliques en avant; convexe,

à ponctuation fine, très serrée, rugueuse, avec une étroite el vive carène médiane effacée à ses extrémités. Écusson petit et pubescent.

Elytres triangulaires, en arrière fortement rétrécis, au sommet brièvement arrondis ensemble, le calus huméral gros, rugueux, glabre au sommet, en avant avec une petite tache de pubescence jaune; stries étroites, profondes, ponctuées et pubescentes; interstries convexes, densément rugueux, leurs poils légèrement soulevés.

Pattes courtes; fémurs unicarénés extérieurement, en dessous avec une très petite dent triangulaire obtuse. Hanches antérieures prolongées par une dent aiguë. Mésosternum et bord antérieur du métasternum non impressionnés.

Long. 2,5 mm.

Brésil: Goyaz, Jatahy, 6 spécimens, ma collection (ex Donckier).

11. *Copturomorpha ochracea* n. sp.

Ovale, noir, en dessus densément revêtu de courtes squamules linéaires d'un ocre teinté d'orangé, le prothorax avec deux petites taches dénudées, chaque élytre avec une grande tache dénudée noire dentelée, s'étendant des bords latéraux jusqu'à la 5. strie derrière l'épaule, puis prolongée en forme de tache triangulaire vers le tiers antérieur de la 2. strie, vers le tiers postérieur atteignant la 1. strie, interrompue par une tache squamuleuse vers le tiers postérieur des 6. et 7. interstrie. Dessous couvert de squamules lancéolées, blanches, sériées sur le milieu des pro-méso-métasternum et les derniers segments ventraux. Pattes avec quelques poils cendrés, épars.

Rostre court, brun au sommet, à ponctuation fine et assez serrée en avant, plus forte et longitudinalement confluyente en arrière, sa base finement carénée au milieu el avec des squamules teintées de jaune. Yeux entourés d'une bordure squamuleuse, inférieurement assez large et teintée de jaune, sur le vertex très étroite, à peine visible, leur ligne de séparation assez large et squamulée, jaune. Antennes jaunes, le 2. article du funicule de un tiers plus long que le 1., les suivants courts et graduellement plus épais, la massue ovale.

Prothorax trapézoïdal, la base de moitié plus large que le bord antérieur et presque du double de la longueur au milieu, les côtés subrectilignes, fortement convexe, avec une fine et courte carène médiane, le bord antérieur étroitement dénudé, la ponctuation fine et très serrée. Écusson arrondi, glabre.

Elytres en demi-ovale, un tiers plus larges que le prothorax, peu plus longs que larges, largement arrondis ensemble au sommet, le calus huméral assez élevé, jaune en avant; stries peu profondes ponctuées et pubescentes; interstries plus larges que les stries, plans, densément rugueux, les squamules de la suture vers la base un peu plus claires.

Pattes courtes, rugueuses; fémurs carénés extérieurement, en dessous obsolètement dentés mais assez longuement canaliculés; tarses jaunes. Mésosternum oblique, sans impression, squamulé.

Long. 3,3 mm.

Brésil: Goyaz, Jatahy, ma collection (ex Donckier). Pétopolis (D. Ohaus, Mus. Hambourg).

Chez l'exemplaire de Petropolis la tache noire latérale des élytres occupe seulement les 3 interstries externes sans envahir le disque.

12. *Copturomorpha oblongula* n. sp.

Ovale, d'un brun ferrugineux, le revêtement dorsal jaunâtre, épars, un peu plus serré sur les côtés du prothorax, la base des élytres, leur tiers postérieur, particulièrement sur la suture, formé de squamules linéaires. Dessous à revêtement cendré, serré, les squamules longues et assez larges.

Rostre ferrugineux en avant, à la base brièvement caréné et squamulé. Antennes ferrugineuses, courtes, le 2. article un peu plus court que le 1., aussi long que les deux suivants ensemble, la massue étroite. Yeux séparés par une ligne squamuleuse, étroite au milieu, fortement élargie à ses extrémités. Lobes oculaires nuls.

Prothorax subtrapézoïdal, les côtés très peu arqués, indistinctement resserrés en avant, le bord antérieur de un tiers moins large que la base, fortement convexe, le point le plus élevé de sa convexité vers le tiers postérieur, avec une ligne médiane caréniforme, la ponctuation fine et très serrée. Écusson petit et pubescent.

Elytres en demi-ellipse, presque de moitié plus longs que larges à leur base, leur plus grande largeur vers le tiers basal, les épaules très obliquement arrondies, en arrière peu rétrécis, au sommet largement arrondis ensemble; convexes, la suture déprimée en avant, le calus huméral peu élevé et en partie glabre; stries profondes, ponctuées et pubescentes; interstries larges, plans et rugueux.

Pattes revêtues de fines, squamules lancéolées, assez serrées, d'un gris jaunâtre; fémurs assez élancés, non carénés extérieurement, inermes en dessous. Hanches antérieures terminées par une dent aiguë. Mésosternum impressionné.

Long. 3,8—4 mm.

Brésil: Goyaz, Jatahy, 4 spécimens, ma collection (ex Donckier).

13. *Copturomorpha ornata* n. sp.

Ovale, d'un rouge ferrugineux, le disque des élytres noirâtre sur les trois premiers interstries, orné d'un dessin tranché blanc, formé de petites squamules serrées, ovales sur le prothorax, lancéolées sur les élytres et composé: sur le prothorax, d'une bande de chaque côté, rétrécie ou effacée en son milieu, dilatée sur les angles postérieurs, quelques squamules éparses sur le disque, un peu plus serrées devant l'écusson et sur le bord antérieur; sur les élytres une bande recouvrant le cinquième basal des interstries, se terminant latéralement par une petite tache devant le calus huméral, prolongée en arrière presque jusqu'au milieu sur la suture et le 2. interstrie, un arc un peu au-delà du milieu sur 4 interstries reliée au sommet par la suture blanche, un trait vers le milieu des interstries 7—8—9, les interstries et les stries glabres en dehors du dessin, les stries squamulées dans le dessin. Dessous et pattes à revêtement dense, cendré.

Rostre à la base modérément élargi, caréné densément squamulé. Ligne de séparation des yeux très étroite, glabre. Antennes rousses, courtes, le 2. article du funicule plus court que le 1., peu plus long que le 3., le 4. encore un peu plus long que large, la massue étroite. Vertex mat, glabre.

Prothorax subtrapézoïdal, modérément rétréci et faiblement resserré en avant, peu convexe, à ponctuation fine mais profonde, très serrée, rugueuse, la ligne médiane lisse flexueuse et peu tranchée. Écusson petit, enfoncé, glabre.

Elytres en demi-ellipse, plus longs que larges, au sommet brièvement arrondis séparément, le calus huméral élevé, en partie squamulé; profondément sillonnés-caténulés, les interstries dorsaux moins larges, les latéraux un peu plus larges que les sillons, tous avec une série de gros points très serrés, faisant paraître leurs bords finement carénés.

Fémurs carénés, inermes et non canaliculés en dessous. Mésosternum légèrement impressionné, de chaque côté en avec avant un petit tubercule derrière les hanches, le métasternum non impressionné.

Long. 3 mm.

Brésil: Goyaz, Jatahy, ma coll. (ex Donckier).

14. *Copturomorpha episternalis* n. sp.

Oblong, noir, mat, les points du prothorax pourvus au fond d'une petite squamule linéaire et blanche, les squamules, le long de la base, plus grosses, ovales, mais non serrées. Écusson glabre. Elytres avec des lignes de squamules linéaires, blanches, serrées, formant une légère fascie basale sur le tiers antérieur, une large fascie apicale moins visible, ou une tache ovale, ces deux fascies séparées par une large bande transversale d'un noir profond, à pubescence microscopique et d'un noir brun. Points du dessous et des pattes tapissés de squamules cendrées, sur les épisternes et le sommet des épimères blanches et très serrées, sur le prosternum très serrées sur les hanches et contre le canal pectoral. Suture épisternale avec une ligne de granules jaunes.

Rostre en avant brun ferrugineux, en arrière fortement élargi, caréné, à ponctuation et squamules peu serrées. Ligne interoculaire très étroite, glabre, élargie en triangle seulement au sommet. Antennes jaunes, fines, pubescentes, le 2. article du funicule plus court que le 1. Tête alutacée, mate.

Prothorax à peine plus large que long, légèrement rétréci à ses extrémités, distinctement resserré derrière le bord antérieur, la base modérément bisinuée, les côtés régulièrement et assez fortement arqués; fortement convexe, les points arrondis, assez gros, profonds, serrés, formant quelques rugosités, la ligne médiane peu élevée et lisse. Écusson très petit.

Elytres triangulaires, un tiers plus longs que larges, fortement rétrécis en arrière, au sommet brièvement arrondis, le bord apical étroitement ferrugineux; convexes, le calus huméral gros, oblong, lisse; profondément sillonnés ponctués, les interstries deux fois aussi larges que les sillons et avec une série de gros points serrés.

Pattes noires, les tarsi roux; fémurs linéaires, inermes mais carénés extérieurement. Mésosternum profondément impressionné.

Long. 3—3,2 mm.

Brésil, sans localité précise (E. Gounelle, Museum de Paris).

15. *Copturomorpha brevicornis* n. sp.

Ovale, noir, mat, revêtu en dessus de très courts poils squamuleux grisâtres, très épars, un peu plus distincts sur les premiers interstries des élytres, la suture lisse et luisante sur ses deux tiers antérieurs. Pattes et dessous revêtus de squamules grises, assez, serrées, tapissant les points.

Rostre court, à peine plus long que le prothorax au milieu, épais, densément ponctué jusqu'au sommet, peu élargi et caréné à la base, peu arqué. Antennes très courtes, ferrugineuses, le 2. article du funicule plus court que le 1. les suivants transversaux, très serrés, grossissant graduellement, la massue

ovale, son 1. article moitié de la longueur totale. Yeux séparés par une ligne squamulée à la base, très étroite, creusée et glabre vers son milieu, un peu plus large et glabre vers les vertex. Vertex assez densément et finement pointillé, mat, sans plaque lisse.

Prothorax transversal, en avant peu rétréci et brièvement resserré, les côtés un peu arqués; peu convexe, la ponctuation fine, très serrée, la ligne médiane caréniforme et en rapprocher tière, les poils parfois un peu plus nombreux le long de cette ligne et sur les côtés. Écusson arrondi.

Élytres un tiers plus larges que le prothorax et un peu plus longs que larges, en arrière médiocrement rétrécis, au sommet largement arrondis ensemble, le calus huméral assez gros, saillant et rugueux; peu convexes, les stries profondes, ponctuées, les interstries étroits, à peine plus larges que les stries, densément mais finement rugueux transversalement. Suture épisternale granulée.

Pattes robustes, courtes, rugueuses; fémurs finement carénés extérieurement, en dessous largement et profondément canaliculés et inermes; tibias et tarses assez courts, bruns. Canal prosternal large et profond, fermé derrière les hanches antérieures par une cloison verticale, en son milieu peu élevée et fendue, sur les côtés formée par une arête postcoxale élevée et arrondie. Méso- et métasternum non impressionnés mais séparés par une ligne arquée reliant le milieu des hanches intermédiaires.

Long. 3 mm.

Brésil: Goyaz, Jatahy, ma collection, 4 spécimens (ex Donckier).

La conformation du prosternum, la brièveté du rostre et des antennes militeraient en faveur de l'érection d'un nouveau genre.

Copturominus carinatus n. sp.

Oblong, noir, revêtu en dessus de squamules ovales, serrées, d'un brun d'ocre et blanches, ces dernières plus nombreuses sur les élytres et en majeure partie alignées dans les points des stries. Points du dessous et des pattes tapissés de grosses squamules brunes et blanches.

Rostre brun, densément ponctué, à la base avec une carène forte et prolongée entre les yeux à leur base. Yeux entourés de squamules jaunes et séparés par une ligne squamuleuse. Antennes ferrugineuses, robustes, le 2. article du funicule aussi long que les 3. et 4. réunis, les articles suivants à peine épaissis, la massue elliptique, son 1. article plus de moitié de la longueur totale. Tête glabre (excepté autour des yeux), ponctuée, avec une aire médiane triangulaire lisse et luisante.

Prothorax fortement transversal, trapézoïdal, en avant fortement rétréci et distinctement étranglé, les côtés convergents mais faiblement arqués; gibbeux dans le milieu, la gibbosité surmontée d'une courte carène luisante, la ponctuation très serrée mais voilée par les squamules. Écusson squamulé.

Élytres semi-elliptiques, un tiers plus longs que larges, les épaules très obliques, leur calus élevé; stries fortement ponctuées et squamulées; interstries 5, 7, 9 relevés en une forte côte luisante, les 7. et 9. réunis au calus huméral; suture plane; interstries, un peu avant le sommet, brièvement costiformes (les impairs plus relevés) et formant ensemble une crête dentelée anté-apicale; 2. interstrie, vers son milieu avec une crête tomenteuse et noire.

Pattes courtes; fémurs linéaires, carénés et dentés, les antérieurs avec une aire dénudée, strigieuse, placée au niveau de la dent, les fémurs posté-

rieurs atteignant seulement le bord antérieur du 2. segment ventral. Mésosternum incliné et non impressionné. Suture interne des épisternes non granulée.

Long. 6,5 mm.

Brésil: Goyaz, Jatahy, ma collection (ex Donckier).

Copturosomus malefidus n. sp.

Ovale, noir, le revêtement dorsal ocré, varié de cendré, composé de squamules ovales, assez grandes, légèrement soulevées; prothorax avec la partie centrale dénudée, noire, parsemée de quelques squamules, les côtés densément squamulés, formant une bande souvent interrompue, les angles postérieurs et une tache antéscutellaire plus clairs et plus densément squamulés. Elytres densément squamulés ocrées, avec une tache jaunâtre ou blanchâtre vers le milieu de la suture, un point plus petit vers le milieu du 8. interstrie, une grande tache dénudée recouvrant l'épaule jusqu'au bord latéral. Pattes densément squamulées, les fémurs intermédiaires et postérieurs avec une tache basale dénudée noire. Dessous en avant peu squamulé, l'abdomen densément.

Rostre densément pointillé, à la base modérément élargi, rugueux, caréné au milieu et squamulé. Ligne interoculaire squamulée, creusée, en son milieu aussi large que les tibias antérieurs. Antennes ferrugineuses, insérées vers le tiers basal du rostre, le 2. article du funicule beaucoup plus long que le 1. et aussi long que les quatre suivants ensemble. Tête mate, avec quelques squamules autour des yeux, avec une ligne médiane alutacée.

Prothorax à la base presque du double aussi large que, long au milieu, les côtés peu arqués jusqu'au milieu, puis fortement resserres en avant; disque, dans le milieu, relevé et surmonté d'une courte et vive carène médiane, en avant largement et profondément impressionné transversalement; ponctuation forte, très serrée, rugueuse. Écusson subtriangulaire, squamulé.

Elytres de moitié plus larges que le prothorax, à peine plus longs que larges, leur plus grande largeur vers le tiers antérieur, en arrière peu rétrécis, les côtés arqués, au sommet largement arrondis; calus huméral gros, élevé, rugueux, le calus postérieur effacé; disque peu convexe, déprimé le long de la suture en avant; stries fortes, tous leurs points squamulés; suture plane, les interstries carénés, plus fortement en avant, les impairs un peu plus fortement que les pairs.

Pattes robustes; fémurs rugueux, carénés extérieurement en dessous fortement dentés. Dessous à ponctuation forte et serrée. Suture interne des épisternes métathoraciques avec une ligne de granules jaunes très petits.

Long. 3,5—5,5 mm.

Brésil: Goyaz, Jatahy, types (ex Donckier), ma collection; Diamantina, Tijuca (ex Gounelle); Sao Paulo. Une série de spécimens.

C'est l'une des espèces des plus communes. Je l'ai nommée, par erreur, dans quelques collections *Copturosomus affaber* Boh. laquelle est une espèce bien différente.
