

Doc. Dr. Jan Obenberger:

REVISION DES ESPÈCES EXOTIQUES DU GENRE TRACHYS FABR. DU CONTINENT AFRICAÏN.

PŘEHLED EXOTICKÝCH DRUHŮ RODU TRACHYS AFRICKÉ PEVNINY.

(Dokončení.)

132. *Trachys* (s. str.) *Xenarthra* n. sp. (Obenb. l. c. p. 75.)

Long.: 2.2, lat.: 1.1 mm. Hab.: Nairobi.

Taille ovulaire, cunéiforme, peu convexe, assez atténuée vers le sommet. Coloration du dessus d'un noir bronzé et luisant, un peu verdâtre. Coloration du dessous d'un bronzé noirâtre et luisant. Pubescence de dessus unicolore, très dense, ocrée, ornementation élytrale, formée de la même pilosité condensée. Tête assez large, à dépression linéaire au milieu. Epistome étroit. Le front est marqué d'une ligne médiane enfoncée; partie interoculaire du front est en trapèze, atténué en avant. Antennes noires, normales. Prothorax court et très large, atténué en avant en ligne presque droite, assez convexe, luisant. Prothorax environ $3\frac{1}{4}$ fois plus large que long, ayant sa plus grande largeur dans la base, au bord, postérieur légèrement relevé en carène, à bord antérieur distinctement échancré en arc bisinué, à lobe médian antérieur peu avancé. Peu distincte sous la pilosité. Saillie prosternale très étranglée entre les hanches et à côtés convergeants en avant, l'espace entre eux étant étroit et partie apicale de cette saillie brusquement dilatée au sommet, en général petite et étroite. Ecusson petit, bronzé. Les élytres sont environ $1\frac{2}{3}$ fois aussi longs, que larges à la base, environ trois fois aussi longs que la tête et le prothorax réunis, atténués vers l'apex depuis la base, cunéiformes, peu convexes, ayant la plus grande largeur environ dans les épaules, qui sont assez élevées. Marge latéropostérieure des élytres inerme. Ponctuation élytrale assez forte, irrégulière et superficielle. Carène humérale des élytres nulle. Apex élytral assez largement arrondi. Ornementation élytrale est composée de trois fascies flexueuses et transversales d'un jaune assez clair sur le fond, qui est densément couvert d'une pubescence semblable, d'un jaune ocré, d'une nuance un peu plus obscure que celle des fascies. Hanches postérieures à l'angle latéropostérieur aigu. Pattes et palpes d'un ocré brun très obscur. Ongles des tarses et les derniers articles des pattes noirs et luisants.

133. *Trachys* (s. str.) *Dalaraea* n. sp.

Long.: 2.1, lat.: 1.2 mm. Hab.: Natal.

Taille assez grande, assez large, un peu convexe. Coloration du dessus d'un noir un peu bronzé. Coloration du dessous d'un noir bronzé. Pubescence de dessus unicolore, épars, assez longue et assez irrégulière. Tête et prothorax assez larges. Epistome court, large et chagriné. Le front est marqué d'une ligne médiane longitudinale; partie interoculaire du front est en trapèze atténué en avant. Antennes noires, normales. Prothorax environ $3\frac{1}{2}$ fois plus large que long, ayant sa plus grande largeur dans la base, atténué en avant en ligne arrondie, à bord antérieur échancré en arc presque simple, à lobe médian antérieur très peu distinct. Sculpture thoracale est indistincte. Saillie

prosternale très étranglée entre les hanches et à côtés convergeants en avant, l'espace entre eux étant étroit et partie apicale de cette saillie brusquement dilatée au sommet, en général petite et étroite. Ecusson petit, bronzé. Les élytres sont environ $1\frac{2}{3}$ fois aussi longs, que larges à la base, environ $2\frac{3}{4}$ fois aussi longs que la tête et le prothorax réunis, atténués vers l'apex depuis le milieu, subparallèles antérieurement, ayant la plus grande largeur environ dans les épaules, qui sont assez élevées. Marge latéropostérieure des élytres inerme. Ponctuation élytrale assez forte, mais superficielle et irrégulière. Elytres à pubescence peu dense, assez longue, assez irrégulière, mais subégale. Carène humérale des élytres nulle. Apex élytral assez largement arrondi. Ornementation élytrale est composée de fascies onduleuses et transversales vagues, jaunâtres et à peine condensées, espaces entre elles étant couverts d'une pubescence semblable, mais obscure et peu perceptible. Hanches postérieures à l'angle latéropostérieur subaigu. Pattes et palpes d'un brun ocré et très obscur. Ongles des tarses et les derniers articles des tarses d'un noir luisant.

134. *Trachys* (s. str.) *heliochaera* n. sp. (Obenb. l. c. p. 75.)

Long.: 2, lat.: 1 mm. Hab.: Abessynie.

Taille très petite, convexe; tête et prothorax assez peu larges. Coloration du dessus d'un noir bronzé, légèrement verdâtre. Coloration du dessous d'un bronzé obscur et luisant. Pubescence de dessus unicolore, assez peu dense, pas trop courte, assez éparsée et assez irrégulière. Tête médiocre, yeux situés obliquement. Epistome étroit et chagriné. Le front est impressionné au milieu; partie interoculaire du front est en trapèze assez atténué en avant. Antennes noires, normales. Prothorax environ quatre fois plus large que long, ayant sa plus grande largeur dans la base, atténué en avant en ligne presque droite, à bord antérieur assez profondément échancré subbisinué, à lobe médian antérieur peu distinct. Sculpture thoracale indistincte. Saillie prosternale très étranglée entre les hanches et à côtés convergeants en avant, l'espace entre eux étant étroit et partie apicale de cette saillie brusquement dilatée au sommet, en général petite et étroite. Ecusson médiocre. Elytres convexes. Les élytres sont environ $1\frac{2}{3}$ fois aussi longs, que larges à la base, environ $2\frac{2}{3}$ fois aussi longs que la tête et le prothorax réunis, atténués vers l'apex depuis le milieu, subparallèles antérieurement, ayant la plus grande largeur environ dans les épaules, qui sont un peu élevées. Marge latéropostérieure des élytres inerme. Ponctuation élytrale superficielle, irrégulière, mais assez forte. Carène humérale des élytres nulle. Apex élytral assez étroitement arrondi. Ornementation élytrale, est composée de vagues bandes transversales et onduleuses, formées de pubescence jaunâtre condensée — sans pubescence obscure dans les espaces intermédiaires. Hanches postérieures à l'angle latéropostérieur aigu. Pattes et palpes d'un ocré brun très obscur. Fémurs assez courts. Ongles des tarses et les derniers articles des tarses noirs.

135. *Trachys* (s. str.) *montana* Kerr. in Sjoestedt, Kilimandjaro—Meru Exped. 7, Col. 3, Bupr. 1905—1906, p. 30.

Hab.: Kilimandjaro.

136. *Trachys* (s. str.) *Junodi* n. sp. (Obenb. l. c. p. 75.)

Long.: 2.5, lat.: 1.4 mm. Hab.: Transvaal.

Taille suballongée, subparallèle, ovulaire, peu convexe. Coloration du dessus d'un bronzé noir un peu violacé, assez luisant. Coloration du dessous

noirâtre. Pubescence de dessus unicolore, subégale, régulière, grise, fine, formant, sur les élytres, un dessin très vague et onduleux. Tête très large, aussi large que les $\frac{3}{4}$ de la largeur basale du prothorax. Epistome échancré en arc. Le front est sillonné au milieu; partie interoculaire du front est en trapèze, atténué en avant. Antennes noires, normales, étroites, courtes. Prothorax environ trois fois plus large que long, ayant sa plus grande largeur dans la base, atténué en avant en ligne arquée, à bord antérieur échancré en arc presque simple et large, à lobe médian antérieur à peu près indistinct, au bord postérieur légèrement relevé en carène. Sculpture thoracale peu distincte sous la pubescence. Saillie prosternale subétranglée entre les hanches et à côtés convergeants en avant, l'espace entre eux étant étroit et partie apicale de cette saillie subdilatée. Ecusson petit, noirâtre. Les élytres sont environ $1\frac{3}{4}$ fois aussi longs, que larges à la base, environ $3\frac{1}{3}$ fois aussi longs que la tête et le prothorax réunis, atténués vers l'apex depuis le milieu, subparallèles antérieurement, ayant la plus grande largeur environ dans les épaules, qui sont assez élevées. Marge latéropostérieure des élytres inerme. Ponctuation élytrale très fine, superficielle et irrégulière. Carène humérale des élytres nulle. Apex élytral assez étroitement arrondi. Ornementation élytrale est composée de trois bandes transversales et flexueuses, vagues et peu distinctes, nullement condensées; pilosité des espaces intermédiaires des élytres semblable, mais obscure, peu perceptible. Hanches postérieures à l'angle latéropostérieur aigu. Pattes et palpes d'un roux testacé très clair. Ongles des tarses et les derniers articles de tarses noirs.

137. Trachys (s. str.) Litha n. sp. (Obenb. l. c. p. 75.)

Long.: 2.4, lat.: 1.5 mm. Hab.: Zouloulouland.

Taille assez large, assez fortement acuminée postérieurement, subparallèle. Coloration du dessus d'un noir à peine bronzé, assez luisant. Coloration du dessous noirâtre. Pubescence de dessus unicolore, assez longue, assez éparse, assez irrégulière. Tête assez petite, assez enfoncée dans le prothorax, assez large, Epistome étroit. Le front est sillonné au milieu; partie interoculaire du front est en trapèze, assez fortement atténué en avant. Yeux relativement grands et assez saillants. Antennes normales, noires. Prothorax très large, atténué en avant en ligne arquée. Prothorax environ $3\frac{1}{2}$ fois plus large que long, ayant sa plus grande largeur dans la base, atténué en avant en ligne légèrement arquée, à bord antérieur échancré en arc simple et large, à lobe médian antérieur indistinct, au bord postérieur légèrement relevé en carène. Sculpture thoracale indistincte sous la pubescence. Saillie prosternale subétranglée entre les hanches est à côtés convergeants en avant, l'espace entre eux étant étroit et partie apicale de cette saillie subdilatée. Ecusson très petit, noirâtre. Les élytres sont environ $1\frac{2}{3}$ fois aussi longs, que larges à la base, environ trois fois aussi longs que la tête et le prothorax réunis, atténués vers l'apex depuis le milieu, subparallèles, ayant la plus grande largeur environ dans les épaules, qui sont assez élevées. Marge latéropostérieure de élytres inerme. Ponctuation élytrale superficielle, assez fine, subéffacée. Carène humérale des élytres nulle. Apex élytral assez largement arrondi. Ornementation élytrale est composée de trois bandes transversales vagues et flexueuses, dont les espaces intermédiaires sont couverts de pubescence obscure et peu visible. Blanches postérieures à l'angle latéropostérieur subaigu. Pattes et palpes d'un jaune roux très clair. Ongles des tarses et les derniers articles des tarses noirs.

138. *Trachys* (s. str.) *Dabraxa* n. sp. (Obenb. l. c. p. 76.)

Long.: 2.2, lat.: 1.5—1.6 mm. Hab.: Congo belge: Bondo. (Dr. Jiří Baum lgt.)

Taille relativement assez allongée, parallèle et étroite, ovulaire, assez peu convexe. Coloration du dessus d'un bronzé verdâtre assez obscur et très luisant. Coloration du dessous d'un noir bronzé. Pubescence de dessus unicolore, d'une nuance jaune-dorée, très réguglière, courte, dense. Tête large et assez grande, assez avancée, impressionnée au milieu. Epistome étroit et transversal, chagriné. Le front est sillonné au milieu; partie interoculaire du front est en trapèze assez atténué en avant. Yeux assez aplanis. Antennes noires, normales. Prothorax assez peu large, atténué en avant en ligne oblique et droite. Prothorax environ trois fois plus large que long, ayant sa plus grande largeur dans la base, atténué en avant en ligne presque droite, à bord antérieur échancré en arc simple et large, à lobe médian antérieur indistinct. Sculpture thoracale est composée des mailles arrondies, très fines et plus distinctes soulevées latéralement. Saillie prosternale subétaglée entre les hanches et à côtés convergeants en avant, l'espace entre eux étant étroit et partie apicale de cette saillie subdilaté. Ecusson petit et noirâtre. Les élytres sont environ $1\frac{3}{4}$ fois aussi longs, que larges à la base, environ trois fois aussi longs que la tête et le prothorax réunis, atténués vers l'apex depuis le milieu, subparallèles, ayant la plus grande largeur environ dans les épaules, qui sont assez élevées. Marge latéropostérieure des élytres inerme. Ponctuation élytrale superficielle, fine, irrégulière et assez espacée. Carène humérale des élytres nulle. Apex élytral assez étroitement arrondi. Ornementation élytrale est composée de trois bandes transversales et flexueuses fines et formées de pubescence espacée, courte et très régulière; elles sont assez peu distinctes et assez larges, peu remarquables. Hanches postérieures à l'angle latéropostérieur aigu. Pates et palpes d'un jaune clair. Derniers articles des tarses et les ongles noirs.

139. *Trachys* (s. str.) *Daghma* n. sp. (Obenb. l. c. p. 76.)

Long.: 2.8, lat.: 1.8 mm. Hab.: Natal. Zouloulund. (British Museum of Nat. History.)

Taille assez ovulaire, subcunéiforme, assez allongée. Coloration du dessus d'un bronzé cuivré légèrement violacé et obscur, assez luisant. Coloration du dessous d'un bronzé obscur. Pubescence de dessus unicolore, assez dense et assez longue, d'un gris jaune, formant, sur les élytres, un dessin onduleux. Tête assez large, sillonnée, peu avancée, à peine excavée. Epistome large et chagriné. Le front est impressionné au milieu; partie interoculaire du front est atténuée en avant en trapèze. Antennes noires et normales. Prothorax large, atténué en avant en ligne courbée. Prothorax environ $3\frac{1}{3}$ fois plus large que long, ayant sa plus grande largeur dans la base, atténué en avant en ligne légèrement arquée, à bord antérieur échancré en arc simple et peu large, à lobe médian antérieur nul. Sculpture thoracale est suboblitérée. Bord postérieur du prothorax légèrement relevé en carène. Saillie prosternale subétaglée entre les hanches et à côtés convergeants en avant, l'espace entre eux étant étroit et partie apicale de cette saillie subdilaté. Ecusson petit, bronzé. Les élytres sont environ $1\frac{3}{4}$ fois aussi longs, que larges à la base, environ $3\frac{1}{2}$ fois aussi longs que la tête et le prothorax réunis, atténuées vers l'apex depuis la base, subparallèles anté-

rieurement, ayant la plus grande largeur environ dans les épaules, qui sont légèrement élevées. Marge latéropostérieure des élytres inerme. Ponctuation élytrale fine, superficielle, subcoriacée. Carène humérale des élytres nulle. Apex élytral assez largement arrondi. Ornementation élytrale est composée de deux bandes, situées dans la partie apicale, superposées et un peu obliques, assez larges et peu condensées. L'autre surface élytrale à pilosité subégale, jaune, d'une nuance un peu plus foncée, que celle des bandes précitées. Hanches postérieures à l'angle latéropostérieur aigu. Pattes et palpes d'un jaune clair, les derniers articles et les ongles noirs.

140. *Trachys* (s. str.) *Lameerei* Kerr. Rev. Zool. Afric. II., fasc. 1., 1912, p. 14.

Hab.: Congo belge.

141. *Trachys* (s. str.) *Coryphaea* n. sp. (Obenb. l. c. p. 76.)

Long.: 2.5, lat.: 1.3 mm. Hab.: Congo belge.

Taille assez, cunéiforme. Coloration du dessus d'un bronzé un peu brunâtre. Coloration du dessous d'un bronzé assez clair. Pubescence de dessus unicolore, assez dense, assez longue, d'un gris jaunâtre. Tête large, courte, à peine déprimée antérieurement, peu avancée. Epistome large et chagriné. Le front est marqué d'une ligne médiane enfoncée; partie interoculaire du front est en trapèze atténué en avant. Antennes noires, normales. Prothorax très large, à bord postérieur légèrement, étroitement, mais très distinctement élevé en carène. Prothorax environ trois fois plus large que long, ayant sa plus grande largeur dans la base, atténué en avant en ligne arquée, à bord antérieur échancré en ligne nettement bisinuée, à lobe médian antérieur distinct et peu avancé; latéralement fortement atténué en avant en ligne légèrement arquée. Sculpture thoracale est suboblitérée, surface luisante. Bord postérieur du prothorax nettement relevé en carène. Angles postérieurs du prothorax aigus, un peu saillants et abaissés sur les élytres. Saillie prosternale subétranglée entre les hanches et à côtés convergents en avant, l'espace entre eux étroit et partie apicale de cette saillie subdilaté. Ecusson petit, bronzé. Elytres subcunéiformes, atténués en arrière en ligne légèrement arquée, luisante. Ils sont environ $1\frac{3}{4}$ fois aussi longs, que larges à la base, environ trois fois aussi longs que la tête et le prothorax réunis, atténués vers l'apex depuis la base, subparallèles antérieurement, ayant la plus grande largeur environ dans les épaules, qui sont assez élevées. Marge latéropostérieure des élytres inerme. Surface des élytres couverte d'une ponctuation fine, subéffacée; ils sont légèrement coriacés et assez étroitement arrondis postérieurement. Ligne dorsale des élytres, vue en profil, droite. Carène humérale des élytres nulle. Apex élytral assez largement arrondi. Ornementation élytrale est composée de trois bandes flexueuses et transversales, ces fascies étant composées de pubescence plus condensée que celle des autres espaces intermédiaires des élytres. Hanches postérieures à l'angle latéropostérieur aigu. Pattes et palpes d'un jaune testacé clair. Ongles des tarses et les derniers articles des tarses noirs.

142. *Trachys* (s. str.) *Zarogha* n. sp. (Obenb. l. c. p. 77.)

Long.: 2.6, lat.: 1.4 mm. Hab.: Cape de Bonne Espérance.

Taille assez large, assez convexe, ovulaire et assez courte. Coloration du dessus d'un bronzé brun, assez clair et luisant. Coloration du dessous d'un

bronzé assez clair. Pubescence de dessus unicolore, d'un jaune pâle. Tête assez courte, assez large, plane, très peu avancée. Epistome large et chagriné. Le front est marqué d'une fine ligne longitudinale enfoncée; partie interoculaire du front est en trapèze atténué en avant. Bords oculofrontaux du front arrondis. Antennes noires et courtes, normales. Prothorax à l'angle basal un peu abaissé sur les élytres de part et d'autre, prolongé et aigu. Prothorax environ trois fois plus large que long, ayant sa plus grande largeur dans la base, atténué en avant en ligne arquée, à bord antérieur échancré en ligne bisinuée, à lobe médian antérieur assez peu distinct, à lobe présutellaire (basal) assez grand et assez avancé. Bord postérieur distinctement relevé en carène. Bord postérieur du prothorax est étroitement relevé. Saillie prosternale subétranglée entre les hanches et à côtés convergeants en avant, l'espace entre eux étroit et partie apicale de cette saillie subdilatée. Sculpture thoracale est composée de mailles arrondies et assez distinctes. Ecusson petit, bronzé. Les élytres sont environ $1\frac{1}{2}$ fois aussi longs, que larges à la base, environ trois fois aussi longs que la tête et le prothorax réunis, atténués vers l'apex depuis le milieu, subparallèles antérieurement, ayant la plus grande largeur environ dans les épaules, qui sont un peu élevées. Marge latéropostérieure des élytres inerme. Les élytres sont assez largement arrondis postérieurement. Carène humérale des élytres nulle. Apex élytral assez largement arrondi. Ornementation élytrale est composée de trois bandes flexueuses et transversales d'un jaune pâle, espaces entre les bandes élytrales étant à pilosité légèrement brunâtre; les fascies sont composées de pubescence un peu plus condensée que celle de l'autre surface. Hanches postérieures à l'angle latéropostérieur subaigu. Pattes et palpes d'un jaune clair, ongles des tarses et les derniers articles noirs.

143. *Trachys* (s. str.) *Antistes* n. sp. (Obenb. l. c. p. 77.)

Long.: 2.5, lat.: 1.4 mm. Hab.: Africa or.: Katona.

Taille assez étroite, ovale, assez convexe, assez fortement atténuée postérieurement. Coloration du dessus unicolore, d'un bronzé assez clair et luisant. Coloration du dessous d'un bronzé assez clair. Pubescence de dessus unicolore, d'un jaune ocré, assez dense, formant sur les élytres un dessin onduleux plus condensé. Tête assez grande, relativement très large, peu avancée. Epistome assez large et chagriné. Le front est marqué d'une ligne longitudinale enfoncée; partie interoculaire du front est en trapèze assez atténué en avant. Bords oculofrontaux arrondis. Prothorax à l'angle basal un peu abaissée sur les élytres de part et d'autre, prolongé et subaigu postérieurement. Prothorax environ trois fois plus large que long, ayant sa plus grande largeur dans la base, atténué en avant en ligne presque droite, à bord antérieur échancré en ligne bisinuée, à lobe médian antérieur bien distinct, lobe postérieur, antéscutellaire assez peu avancé, assez petit, assez faiblement développé. Sculpture thoracale peu visible. Bord postérieur du prothorax étroitement relevé en carène. Saillie prosternale subétranglée entre les hanches et à côtés convergeants en avant, l'espace entre eux étroit et partie apicale de cette saillie subdilatée. Ecusson petit, bronzé. Elytres assez longs, assez étroitement arrondis en arrière en courbure allongée. Les élytres sont environ $2\frac{2}{3}$ fois aussi longs, que larges à la base, environ trois fois aussi longs que la tête et le prothorax réunis, atténués vers l'apex depuis le milieu, subparallèles antérieurement, ayant la plus grande largeur environ dans les épaules, qui sont assez

élevées. Marge latéropostérieure des élytres inerme. Carène humérale des élytres nulle. Apex élytral assez étroitement arrondi en ligne courbée et assez allongée. Ornementation élytrale est composée de trois bandes flexueuses et transversales d'un jaune ocré, espaces entre ces fascies étant à pilosité semblable, à peine plus obscure; les fascies étant composées de pubescence un peu plus condensée que celle de l'autre surface élytrale. Hanches postérieures à l'angle latéropostérieur aigu. Pattes et palpes d'un jaune clair. Ongles des tarses et les derniers articles noirs.

144. *Trachys* (s. str.) *Scyrrhaea* n. sp. (Obenb. l. c. p. 77.)

Long.: 2.3, lat.: 1.4 mm. Hab.: Cape de Bonne Espérance, Kenya, Usambara.

Talile ovulaire, assez convexe, assez courte, assez atténuée postérieurement. Coloration du dessus d'un bronzé assez obscur et luisant. Coloration du dessous d'un bronzé obscur et luisant. Pubescence de dessus unicolore, jaune, simple, fine et pas trop dense, assez longue. Tête à forme normale, assez large, assez grande, vue de dessus, subplane. Epistome étroit, plus large que long, chagriné. Le front est marqué d'une ligne longitudinale enfoncée; partie interoculaire du front est en trapèze, atténué en avant. Bords oculofrontaux arrondis. Antennes noires, normales. Bord postérieur du prothorax très étroitement, légèrement élevé en carène. Prothorax à l'angle latéropostérieur court, à peine prolongé postérieurement. Prothorax environ trois fois plus large que long, ayant sa plus grande largeur dans la base, à bord antérieur largement et faiblement échancré en ligne bisinuée, à lobe médian antérieur bien distinct, à lobe médian basal assez peu développé, au bord postérieur légèrement élevé en carène. Sculpture thoracale est composée de mailles suboblitérées et très fines. Prothorax atténué latéralement assez fortement en avant en ligne légèrement arquée. Saillie prosternale subétranglée entre les hanches et à côtés convergeants en avant, l'espace entre eux étroit et partie apicale de cette saillie subdilataée. Ecusson petit, bronzé. Les élytres sont environ $1\frac{1}{2}$ fois aussi longs, que larges à la base, environ $2\frac{3}{4}$ fois aussi longs que la tête et le prothorax réunis, atténués vers l'apex depuis la base, subparallèles antérieurement, ayant la plus grande largeur environ dans les épaules, qui sont assez élevées. Marge latéropostérieure des élytres inerme. Ponctuation élytrale assez dense, superficielle et médiocre. Carène humérale des élytres nulle. Apex élytral assez étroitement arrondi. Ornementation élytrale est composée de trois larges et assez vagues bandes transversales, peu flexueuses, formées de la même pubescence jaune, simple et condensée, qui couvre régulièrement toute l'autre surface élytrale. Hanches postérieures à l'angle latéropostérieur aigu. Pattes et palpes d'un jaune clair, les ongles et les derniers articles noirs.

145. *Trachys* (s. str.) *Gambiana* n. sp. (Obenb. l. c. p. 77.)

Long.: 1.7, lat.: 1.1 mm. Hab. Gambia.

Taille minuscule, ovulaire, assez convexe, assez atténuée postérieurement. Coloration du dessus d'un bronzé brun obscur et concolore, très luisant. Coloration du dessous d'un bronzé obscur. Pubescence de dessus unicolore, assez fine, longue, mais éparse et très irrégulière, d'un jaune pâle. Tête assez petite, faiblement et largement excavée, peu avancée. Epistome assez étroit, chagriné.

Le front est légèrement déprimé; partie interoculaire du front est en trapèze atténué en avant. Yeux situés obliquement; bords oculofrontaux arrondis. Antennes noires, normales. Prothorax environ $2\frac{2}{3}$ fois plus large que long, ayant sa plus grande largeur dans la base, atténué en avant en ligne presque droite, à bord antérieur fortement bisinué, à lobe médian antérieur très distinct, à lobe postérieur préscutellaire peu développé, aux angles antérieurs assez peu avancées. Sculpture thoracale est composée de mailles arrondies et assez grandes, très fines et distinctes surtout latéralement. Base du prothorax à peine relevée en carène. Saillie prosternale subétranglée entre les hanches et à côtés convergents en avant, l'espace entre eux étroit et partie apicale de cette saillie subdilataée. Ecusson petit, bronzé. Les élytres sont environ $1\frac{1}{2}$ fois aussi longs, que larges à la base, environ $2\frac{1}{2}$ fois aussi longs que la tête et le prothorax réunis, atténués vers l'apex depuis le milieu, subparallèles antérieurement, ayant la plus grande largeur dans la base, avec les épaules un peu élevées. Marge latéropostérieure des élytres inerme. Ponctuation élytrale fine, irrégulière, suboblitérée. Surface luisante. Carène humérale des élytres nulle. Apex élytral étroitement arrondi. Ornementation élytrale est composée de vagues et peu distinctes bandes flexueuses et transversales sur les élytres, formées de pubescence un peu plus condensée que celle de l'autre surface élytrale, qui est un peu plus obscure et brunâtre. Hanches postérieures à l'angle latéropostérieur aigu. Pattes et palpes d'un jaune clair, ongles des tarses et les derniers articles noirs.

146. *Trachys (s. str.) delectabilis* n. sp. (Obenb. l. c. p. 78.)

Lon.: 2.4, lat.: 1.1 mm. Hab.: Congo belge.

Taille petite, ovale, assez convexe, assez atténuée postérieurement. Coloration du dessus d'un bronzé brun un peu cuivreux sur les côtés du prothorax; luisant. Coloration du dessous d'un bronzé obscur. Pubescence de dessus unicolore, éparsée et assez obscure, d'un jaune brunâtre, fine, assez longue. Tête, vue de dessus, très peu excavée antérieurement, à peu près plane. Epistome étroit et chagriné. Le front est marqué d'une ligne médiane enfoncée; partie interoculaire du front est en trapèze assez atténué en avant. Antennes noires, normales. Prothorax environ trois fois plus large que long, ayant sa plus grande largeur dans la base, atténué en avant en ligne presque droite, oblique, à bord antérieur profondément échancré en ligne bisinuée, à lobe médian antérieur distinct. Angles postérieurs aigus, angles antérieurs assez peu avancés. Surface luisante. Sculpture thoracale est composée de mailles fines arrondies. Bord postérieur du prothorax très distinctement relevé en carène. Marges latérales du prothorax étroitement relevées. Saillie prosternale subétranglée entre les hanches et à côtés convergents en avant, l'espace entre eux étroit et partie apicale de cette saillie subdilataée. Ecusson assez grand. Elytres assez acuminés, luisants, à ponctuation irrégulière assez forte, mais superficielle et peu profonde. Les élytres sont environ $1\frac{2}{3}$ fois aussi longs, que larges à la base, environ trois fois aussi longs que la tête et le prothorax réunis, atténués vers l'apex presque depuis la base, ayant la plus grande largeur environ dans les épaules, qui sont un peu élevées. Marge latéropostérieure des élytres inerme. Carène humérale des élytres nulle. Apex élytral assez largement arrondi. Ornementation élytrale est composée de bandes flexueuses transversales peu distinctes, espace entre elles étant irrégulièrement pubescent. Hanches postérieures à l'angle latéropostérieur aigu. Pattes et palpes d'un jaune clair, les articles postérieurs et les ongles noirs.

147. *Trachys* (s. str.) *Simba* n. sp. (Obenb. l. c. p. 78.)

Long.: 3, lat.: 1.7 mm. Hab.: Natal.

Taille assez robuste, subcunéiforme, ovulaire, allongée, assez faiblement convexe. Coloration du dessus d'un bronzé doré assez clair et un peu cuivreux et luisant. Coloration du dessous d'un bronzé obscur et luisant. Pubescence de dessus unicolore, assez longue, assez claire; celle de la partie basale du prothorax roussâtre. Tête, vue de dessus, peu excavée, très large et très peu avancée. Epistome assez large, chagriné. Le front est assez large, faiblement impressionné au milieu; partie interoculaire du front est en trapèze atténué en avant. Antennes noires, normales. Prothorax environ trois fois plus large que long, ayant sa plus grande largeur dans la base, atténué en avant en ligne légèrement arquée, à bord antérieur assez faiblement échancré en ligne bisinuée, à lobe médian antérieur distinct. Sculpture thoracale est composée de mailles arrondies ponctifères très subtiles et plus distinctes latéralement. Marges latérales du prothorax nullement relevées. Lobe basal du prothorax assez développé et un peu avancé. Saillie prosternale subétranglée entre les hanches et à côtés convergeants en avant, l'espace entre eux étroit et partie apicale de cette saillie subdilaté. Bord basal du prothorax légèrement élevé en carène. Ecusson ponctiforme. Elytres assez longs, assez cunéiformes. Les élytres sont environ $1\frac{2}{3}$ fois aussi longs, que larges à la base, environ $3\frac{1}{2}$ fois aussi longs que la tête et le prothorax réunis, atténués vers l'apex presque depuis la base, ayant la plus grande largeur environ dans les épaules, qui sont assez élevées. Marge latéropostérieure des élytres inerme. Ponctuation élytrale assez forte, peu dense, irrégulière, superficielle. Carène humérale des élytres nulle. Apex élytral assez largement arrondi. Ornementation élytrale est composée de bandes flexueuses et transversales; espaces entre les bandes et entre la partie antérieure des élytres à pilosité un peu roussâtre. Hanches postérieures à l'angle latéropostérieur subaigu. Pattes et palpes d'un jaune clair, les ongles et les derniers articles noirs.

148. *Trachys* (s. str.) *Proculeia* n. sp. (Obenb. l. c. p. 78.)

Long.: 2.1, lat.: 1.1 mm. Hab.: Usambara.

Taille peu robuste, convexe, ovulaire, assez fortement atténuée postérieurement. Coloration du dessus d'un bronzé un peu verdâtre et assez obscur. Luitant. Coloration du dessous d'un bronzé obscur et luitant. Pubescence de dessus unicolore, subuniforme, sans trace de poils roussâtres; longue, épars. Tête, vue de dessus, très peu excavée en avant, à peu près plane, à peine avancée. Epistome étroit, transversal, chagriné. Le front est étroit, à peine impressionné au milieu; partie interoculaire du front est en trapèze atténué en avant. Antennes noires, normales, courtes. Prothorax environ trois fois plus large que long, ayant sa plus grande largeur dans la base, convexe et luitant, à pubescence irrégulière, à bord antérieur échancré en ligne nettement bisinuée, à lobe médian antérieur distinct, mais peu avancé, côtés du prothorax atténués en avant en ligne presque droite et oblique. Sculpture thoracale est composée de mailles arrondies et suboblitérées. Lobe préscutellaire, basal, du prothorax petit et peu avancé. Marges latérales nullement relevées en carène. Saillie prosternale subétranglée entre les hanches et à côtés convergeants en avant, l'espace entre eux étroit et partie apicale de cette saillie subdilaté. Ecusson ponctiforme. Elytres courts, assez ovalaires, assez convexes, luitants. Les élytres sont environ $1\frac{3}{5}$ fois aussi longs, que larges à la base, environ $2\frac{3}{4}$

fois aussi longs que la tête et le prothorax réunis, atténués vers l'apex presque depuis la base, ayant la plus grande largeur presque dans la base. Épaules assez élevées. Marge latéropostérieure des élytres inerme. Ponctuation élytrale forte, mais irrégulière et espacée, superficielle. Carène humérale des élytres nulle. Apex élytral assez étroitement arrondi. Ornementation élytrale est composée de trois bandes flexueuses et très vagues; les espaces entre elles à pilosité semblable, mais un peu moins dense, plus espacée. Hanches postérieures à l'angle latéropostérieur aigu. Pattes et palpes d'un jaune clair. Ongles des tarses et les derniers articles des tarses noirs.

149. *Trachys* (s. str.) *luxuriosa* n. sp. (Obenb. l. c. p. 78.)

Long.: 2.5, lat.: 1.4 mm. Hab.: Africa or.: Katona.

Taille suballongée, ovale, peu convexe. Coloration du dessus d'un bronzé un peu verdâtre et très luisant. Coloration du dessous d'un bronzé obscur. Pubescence de dessus unicolore, éparsée et assez longue, d'un jaune gris pâle et jaunâtre. Tête, vue de dessus, fortement excavée, concave, sans ligne médiane. Epistome large, transversal, court et chagriné. Le front est impressionné au milieu; partie interoculaire du front est en trapèze assez atténué en avant. Bords oculofrontaux subcarénés. Antennes noires et courtes, normales. Prothorax à partie latéroantérieure subdéprimée, aux côtés atténués en avant en ligne assez fortement arquée. Angles antérieurs un peu défléchis ainsi que l'étroite partie antérieure du bord latéral. Prothorax environ trois fois plus large que long, ayant sa plus grande largeur dans la base, atténué en avant en ligne légèrement arquée, à bord antérieur échancré en arc large et très profond, à lobe médian antérieur presque indistinct; marge basale très distinctement, mais étroitement relevée en carène. Sculpture thoracale est composée de mailles fines arrondies et peu distinctes. Marges latérales du prothorax étroitement relevées et aplanis antérieurement. Saillie prosternale subétranglée entre les hanches et à côtés convergeants en avant, l'espace entre eux étroit et à partie apicale de cette saillie subdilaté. Ecusson petit, bronzé. Elytres assez longs, peu convexes, subparallèles jusqu'au milieu, luisants. Les élytres sont environ $1\frac{3}{5}$ fois aussi longs, que larges à la base, environ trois fois aussi longs que la tête et le prothorax réunis, atténués vers l'apex depuis le milieu en ligne arquée vers le sommet, ayant la plus grande largeur environ dans les épaules qui sont un peu obliquement élevées. Marge latéropostérieure des élytres inerme. Ponctuation élytrale irrégulière, médiocre, distincte. Carène humérale des élytres nulle. Apex élytral assez étroitement et conjointement arrondi. Ornementation élytrale est composée de trois vagues lignes onduleuses très flexueuses et transversales jaunâtres. Hanches postérieures à l'angle latéropostérieur aigu. Pattes et palpes d'un jaune testacé clair. Ongles des tarses et les derniers articles des tarses noirs.

150. *Trachys* (s. str.) *saga* n. sp. (Obenb. l. c. p. 79.)

Long.: 2.5, lat.: 1.5 mm. Hab.: Congo belge.

Taille assez grande, assez robuste, suballongée, assez peu convexe. Coloration du dessus d'un bronzé brunâtre presque noir et luisant. Coloration du dessous d'un noir bronzé et luisant. Pubescence de dessus unicolore, assez dense et courte, d'un jaune assez profond, formant, sur les élytres un vague dessin onduleux et transversal. Tête grande, assez avancée, impressionnée au milieu, un peu excavée. Epistome assez long et chagriné, transversal. Le front est

marqué au milieu d'une ligne longitudinale enfoncée; partie interoculaire du front est en trapèze atténué en avant. Antennes courtes, normales, noires. Prothorax à marge latérale normale, nullement relevée en forme d'un sillon plan. Prothorax plus que trois fois plus large que long, ayant sa plus grande largeur dans la base, assez faiblement atténué en avant en ligne droite, à bord antérieur assez fortement échancé en arc presque simple, à lobe médian antérieur assez peu distinct; assez court, bords latéraux très étroitement et peu distinctement défléchis. Sculpture thoracale indistincte. Bord postérieur du prothorax relevé en carène fine. Saillie prosternale subétranglée entre les hanches et à côtés convergeants en avant, l'espace entre eux étroit et à partie apicale de cette saillie subdilataée. Ecusson petit, bronzé. Les élytres sont environ $1\frac{1}{2}$ fois aussi longs, que larges à la base, environ $2\frac{2}{3}$ fois aussi longs que la tête et le prothorax réunis, atténués vers l'apex depuis le moitié, subparallèles antérieurement, ayant la plus grande largeur environ dans les épaules, qui sont assez élevées. Marge latéropostérieure des élytres inerme. Sculpture élytrale subeffacée, fine et éparse, irrégulière. Carène humérale des élytres nulle. Apex élytral assez largement arrondi. Ornementation élytrale est composée de trois vagues bandes un peu flexueuses sur le fond à pubescence d'un jaune assez profond. Hanches postérieures à l'angle latéropostérieur subaigu. Pattes et palpes d'un jaune clair. Ongles des tarsi et les derniers articles des tarsi noirs.

151. **Trachys (s. str.) tavetana** Kerr. Mitt. Naturhist. Mus. Hamburg, XXX, 1913, p. 120.

Hab.: Kilimandjaro.

152. **Trachys (s. str.) ramissina** Obenb. Sborník Entom. Odd. Nár. Mus. Praha, VI, 49, 1928, p. 21, 23, T. 1, fig. 18.

Hab.: Afr. or. anal.

153. **Trachys (s. str.) Laurencii** n. sp. (Obenb. l. c. p. 79.)

Long.: 2.4, lat.: 1.4 mm. Hab.: Lourenço Marques.

Taille convexe, assez courte, assez ovale et acuminée. Coloration du dessus violacée à reflet bleuâtre, celle de la tête et du prothorax un peu plus noirâtre, celle des élytres plus bleuâtre. Luisant, avec les élytres presque glabres. Coloration du dessous noire. Pubescence de dessus unicolore et éparse, vague, dorée, plus distincte seulement sur la tête et prothorax. Tête fortement sillonnée au milieu, vue de dessus à peine excavée. Epistome assez étroit et chagriné, transversal. Le front est glabre dans la partie supérieure; partie interoculaire du front est en trapèze. Une ligne fine impressionnée longitudinale au milieu du front. Antennes noires, normales, courtes. Prothorax régulièrement convexe, atténué en avant en ligne presque droite, lobe antéscutellaire peu avancé; il est environ trois fois plus large que long, ayant sa plus grande largeur dans la base, atténué en avant en ligne légèrement arquée, à bord antérieur profondément échancré en arc simple, à lobe médian antérieur nul. Sculpture thoracale est composée de mailles arrondies extrêmement fines. Marge basale du prothorax très étroitement et légèrement relevée en carène distincte. Saillie prosternale aux côtés subparallèles, droits, en général un peu plus large que chez les espèces précédentes, à peine dilatée postérieurement. Ecusson petit, noir. Elytres à ponctuation suboblitérée; ils sont convexes et

luisants. Environ $1\frac{1}{2}$ fois aussi longs, que larges à la base, environ trois fois aussi longs que la tête et le prothorax réunis, atténués vers l'apex depuis le tiers basal en ligne très régulièrement arquée, ayant la plus grande largeur dans la base, subparallèles dans le tiers basal. Marge latéropostérieure des élytres inerme. Carène humérale des élytres nulle. Apex élytral assez étroitement arrondi. Ornementation élytrale spéciale nulle, seulement çà et là avec des traces de pubescence vague et très courte dorée. Hanches postérieures à l'angle latéropostérieur aigu. Pattes et palpes d'un noir profond.

154. *Trachys* (s. str.) *resupinans* n. sp. (Obenb. l. c. p. 80.)

Long.: 2.7, lat.: 1.4 mm. Hab.: Insula San Thomé.

Taille ovulaire, assez trapue, assez convexe. Coloration du dessus d'un bronzé verdâtre obscur et luisant. Coloration du dessous d'un bronzé noirâtre. Pubescence de dessus unicolore, dense, assez longue et assez régulière d'un jaune gris ocré. Tête profondément sillonnée, faiblement pubescente. Epistome transversal et chagriné. Le front est marqué d'une ligne longitudinale enfoncée; partie interoculaire du front est en trapèze, assez fortement atténué en avant. Antennes noires, normales. Prothorax à marge basale assez fortement relevée; il est large, convexe et luisant. Environ trois fois plus large que long, ayant sa plus grande largeur dans la base, atténué en avant en ligne oblique, à bord antérieur fortement bisinueusement échancré, à lobe médian antérieur très distinct, au bord postérieur distinctement relevé en carène fine. Sculpture thoracale est composée de mailles fines et rondes, distinctes même dans la partie discale et médiane. Saillie prosternale aux côtés subparallèles, droits, à peine dilatée postérieurement. Ecusson petit, bronzé. Les élytres sont à peine $1\frac{1}{2}$ fois aussi longs, que la tête et le prothorax réunis, atténués vers l'apex depuis la base, assez robustes et luisants, ayant la plus grande largeur environ dans la base, avec les épaules un peu élevées. Marge latéropostérieure des élytres inerme. Carène humérale des élytres nulle. Apex élytral largement arrondi. Ornementation élytrale spéciale nulle; les élytres sont couverts d'une pubescence régulière et jaunâtre, condensée par places et formant ainsi de très vagues traces d'une ondulation transversale peu distincte. Hanches postérieures à l'angle latéropostérieur aigu. Pattes et palpes obscurs. Ongles des tarses noirs.

155. *Trachys* (s. str.) *purpuridorsis* Obenb. Col. Cat. Pars 157, 1937 (VI), p. 1406.

Syn.: *purpurea* Kerr. (nom. praeocc. C. G.) Voy. Alluaud et Jeannel, Afr. or. Ins. Col. VI., Bupr. 1914, p. 240. Obenb. l. c. p. 80.

Hab.: Kilimandjaro.

156. *Trachys* (s. str.) *penaria* n. sp. (Obenb. l. c. p. 80.)

Long.: 2.4, lat.: 1.4 mm. Hab. Cap Bonae Spei.

Taille allongée, ovulaire, par trop convexe. Coloration du dessus d'un bronzé brun assez obscur, un peu violacé et luisant. Coloration du dessous d'un bronzé obscur et violacé, luisant. Pubescence de dessus unicolore, assez éparse, jaune, assez régulière, d'un jaune grisâtre. Tête très large, assez avancée et largement excavée au milieu. Epistome très large et chagriné. Le front est marqué d'une ligne longitudinale enfoncée; partie interoculaire du front est

en trapèze assez atténué en avant. Antennes noires, normales, courtes. Prothorax très large, court, un peu moins large que les élytres, assez faiblement atténué en avant en ligne subarquée; il est environ trois fois plus large que long, ayant sa plus grande largeur dans la base; assez convexe et luisant, à bord antérieur très largement et fortement échancré en arc simple, à lobe médian antérieur nul. Sculpture thoracale est peu distincte. Partie basale du prothorax légèrement déprimée le long de la base, bord postérieur légèrement et très finement relevé en carène. Écusson petit, bronzé. Les élytres sont environ $1\frac{2}{3}$ fois aussi longs, que larges à la base, environ $2\frac{1}{2}$ fois aussi longs que la tête et le prothorax réunis, atténués vers l'apex depuis le milieu des élytres, subparallèles antérieurement, ayant la plus grande largeur environ dans les épaules, qui sont assez élevées. Marge latéropostérieure des élytres inerme. Élytres parallèles jusqu'au milieu, puis atténués en ligne longue et courbée vers le sommet, à ponctuation irrégulière, superficielle et assez forte. Carène humérale des élytres nulle. Apex élytral assez étroitement arrondi. Ornementation élytrale est composée de trois bandes fléchueuses et transversales. Hanches postérieures à l'angle latéropostérieur arrondi. Pattes et palpes d'un jaune très clair. Ongles des tarses et les derniers articles des tarses noirs.

157. *Trachys* (s. str.) *patrona* n. sp. (Obenb. l. c. p. 80.)

Long.: 2.2, lat.: 1.2 mm. Hab.: Africa or.: Katona.

Taille ovale, assez allongée, peu convexe. Coloration du dessus d'un bronzé verdâtre doré et luisant. Coloration du dessous d'un bronzé et luisant. Pubescence de dessus unicolore, assez longue, assez épars, jaune, formant sur les élytres un vague dessin onduleux. Tête médiocrement large, nettement excavée, peu avancée. Epistome moins que deux fois aussi large que long. Le front est marqué d'une ligne longitudinale médiane; partie interoculaire du front est en trapèze assez atténué en avant. Antennes noires, courtes, normales. Prothorax légèrement déprimé latéralement, assez court, fortement atténué en avant en ligne très légèrement arquée, environ trois fois plus large que long, ayant sa plus grande largeur dans la base, luisant et assez convexe, à bord antérieur fortement échancré en arc simple, à lobe médian antérieur nul. Bord postérieur légèrement relevé en carène. Sculpture thoracale est composée de mailles arrondies. Base du prothorax légèrement impressionnée le long du lobe préscutellaire, normale latéralement. Saillie prosternale subparallèle, aux côtés droits, à peine dilatée postérieurement. Écusson petit, bronzé. Élytres à ponctuation fine, peu dense, suboblitérée; épaules assez saillantes; ils sont environ $1\frac{2}{3}$ fois aussi longs, que larges à la base, environ $3\frac{1}{4}$ fois aussi longs que la tête et le prothorax réunis, atténués vers l'apex depuis le milieu, subparallèles antérieurement, ayant la plus grande largeur environ dans les épaules. Marge latéropostérieure des élytres inerme. Carène humérale des élytres nulle. Apex élytral assez étroitement arrondi. Ornementation élytrale spéciale nulle. Hanches postérieures à l'angle latéropostérieur arrondi au sommet. Pattes et palpes d'un jaune clair. Ongles des tarses et les articles derniers noirs.

158. *Trachys* (s. str.) *novicia* n. sp. (Obenb. l. c. p. 80.)

Long.: 2, lat.: 1 mm. Hab.: Congo belge.

Taille ovale, allongée, assez convexe. Coloration du dessus d'un noir un peu violacé bronzé, luisant. Coloration du dessous d'un noir luisant. Pubescence de dessus unicolore, assez dense, fine, espacée et jaunâtre, formant

sur les élytres un dessin étroit et très vague onduleux. Tête assez grande et assez avancée, largement excavée antérieurement. Epistome moins que deux fois aussi large qu long. Le front est marqué d'une ligne longitudinale impressionnée; partie interoculaire du front est en trapèze assez atténué en avant. Antennes noires, courtes, normales. Prothorax large, assez faiblement atténué latéralement en ligne droite et oblique, légèrement déprimé le long des bords latéraux; il est trois fois plus large que long, ayant sa plus grande largeur dans la base, assez convexe et bien luisant, à bord antérieur échancré en arc simple, à lobe médian antérieur nul. Bord postérieur du prothorax étroitement élevé en carène mince et fine. Sculpture thoracale est à peine distincte. Saillie prosternale subparallèle, aux côtés droits, à peine dilatée postérieurement. Ecusson petit et luisant. Les élytres sont environ $1\frac{2}{3}$ fois aussi longs, que larges à la base, environ trois fois aussi longs que la tête et le prothorax réunis, atténués vers l'apex depuis le milieu, subparallèles antérieurement, ayant la plus grande largeur environ dans les épaules, qui sont un peu élevées. Marge latéropostérieure des élytres inerme. Elytres à ponctuation grossière, mais irrégulière et très superficielle, suboblitérée. Carène humérale des élytres nulle. Apex élytral assez largement arrondi. Ornementation élytrale est composée des bandes transversales et flexueuses très vagues, formées de pilosité éparses, espaces »lisses« des élytres couverts d'une pilosité fine et éparses, noirâtre et peu perceptible. Hanches postérieures à l'angle latéropostérieur arrondi au bout. Pattes et palpes d'un jaune clair. Ongles des tarses et les derniers articles des tarses noirs.

159. *Trachys* (s. str.) Bolivari Obenb. Trabajos del Mus. Nac Cienc. Nat. Madrid, 1921, p. 16.
Hab.: Biafra Bay.

160. *Trachys* (s. str.) *Ecloga* n. sp. (Obenb. l. c. p. 81.)

Long.: 2.7, lat.: 1.3 mm. Hab.: Congo belge.

Taille allongée, ovale, peu convexe. Coloration du dessus d'un bronzé assez clair et luisant. Coloration du dessous d'un bronzé obscur et luisant. Pubescence du dessus unicolore, jaune, assez longue et fine, formant sur les élytres un dessin onduleux. Tête assez peu large, assez longue, fortement excavée. Epistome assez large et court, chagriné. Le front est marqué d'une fine ligne longitudinale médiane; partie interoculaire du front est en trapèze assez atténué en avant. Antennes noires, normales. Prothorax un peu moins large que les élytres, atténué en avant en ligne oblique et droite; il est environ trois fois plus large que long, ayant sa plus grande largeur dans la base; assez convexe et luisant, à bord antérieur échancré en ligne bisinuée, à lobe médian antérieur assez distinct. Bord postérieur distinctement élevé en carène fine. Sculpture thoracale est peu distincte sous la pubescence jaunâtre. Marge latérale du prothorax simple, nullement relevée en gouttière, un peu défléchie. Angles antérieurs assez allongés et aigus. Saillie prosternale subparallèle, aux côtés droits, assez large, nullement dilatée postérieurement. Ecusson petit et bronzé. Elytres relativement longs, partie postscutellaire légèrement élevée. Ils sont environ $1\frac{3}{4}$ fois aussi longs, que larges à la base, environ $3\frac{1}{2}$ fois aussi longs que la tête et prothorax réunis, atténués vers l'apex depuis le milieu, subparallèles antérieurement, ayant la plus grande largeur environ dans les épaules, qui sont assez élevées. Marge latéropostérieure des élytres inerme. Ponctuation élytrale médiocre, assez espacée et fine, mais superficielle et sub-

oblitérée. Carène humérale des élytres nulle. Apex élytral assez étroitement arrondi. Ornementation élytrale est composée de trois vagues et peu denses bandes transversales, pubescence jaune de l'autre surface élytrale distincte partout et même à l'apex; les espaces entre les fascies sont couverts d'une pubescence semblable à celle des fascies, de la même densité et finesse, mais un peu plus brunâtre ou rousâtre. Hanches postérieures à l'angle latéropostérieur aigu. Pattes et palpes d'un jaune clair. Ongles des tarses et les articles derniers noirs.

161. *Trachys* (s. str.) *novella* n. sp. (Obenb. l. c. p. 81.)

Long.: 2.7, lat.: 1.5 mm. Hab.: Congo belge.

Taille ovulaire, allongée, subcunéiforme, assez peu convexe. Coloration du dessus d'un bronzé cuivreux clair et luisant. Coloration du dessous d'un bronzé un peu plus obscur et luisant. Pubescence de dessus unicolore, d'un jaune doré clair, sauf la partie apicale élytrale, qui est plus brunâtre. Tête assez courte et assez large, faiblement excavée, peu avancée. Epistome large et chagriné. Le front est marqué d'une fine ligne médiane enfoncée; partie interoculaire du front est en trapèze atténué en avant. Antennes noires, courtes et normales. Prothorax à marge latérale normale, non défléchie; angles antérieurs du prothorax assez courts et peu avancés. Prothorax environ trois fois plus large que long, ayant sa plus grande largeur dans la base, atténué en avant en ligne presque droite, à bord antérieur échancré en ligne assez fortement bisinuée, à lobe médian antérieur bien distinct et large. Bord postérieur légèrement élevé en carène. Sculpture thoracale est composée de mailles arrondies, peu distinctes. Prothorax très large, fortement atténué en avant en ligne légèrement arquée, à marge postérieure légèrement relevée postérieurement. Saillie prosternale subparallèle, aux côtés droits, assez large, nullement dilatée postérieurement. Ecusson petit, bronzé. Les élytres sont environ $1\frac{2}{3}$ fois aussi longs, que larges à la base, environ trois fois aussi longs que la tête et le prothorax réunis, atténués vers l'apex depuis la base, cunéiformes, ayant la plus grande largeur environ dans les épaules, qui sont un peu élevées. Marge latéropostérieure des élytres inerme. Ponctuation élytrale fine, éparse, régulière, superficielle. Carène humérale des élytres nulle. Apex élytral assez largement arrondi. Ornementation élytrale est composée de pilosité dorée, un peu plus condensée au quart postérieur de la longueur élytrale et y formant une vague bande transversale large, pubescence de l'apex élytral obscure, rousâtre, formant une espèce de macule apicale, nettement séparée en ligne légèrement arquée de la bande transversale préapicale. Hanches postérieures à l'angle latéropostérieur aigu. Pattes et palpes d'un jaune clair. Ongles des tarses et les articles derniers noirs.

162. *Trachys* (s. str.) *Proagora* n. sp. (Obenb. l. c. p. 81.)

Long.: 2.6, lat.: 1.3 mm. Hab.: Congo belge.

Taille assez allongée, assez peu convexe, un peu cunéiforme, ovulaire. Coloration du dessus d'un bronzé verdâtre assez clair et luisant. Coloration du dessous d'un bronzé noirâtre et luisant. Pubescence de dessus unicolore assez longue, assez peu dense, assez claire, jaunâtre. Tête assez grande et assez avancée, assez fortement excavée. Epistome large et transversal, chagriné. Le front est marqué au milieu d'une ligne longitudinale enfoncée; partie interoculaire du front est en trapèze assez atténué en avant, assez large. Bords oculo-

taux arrondis. Antennes noires, normales, courtes. Prothorax environ trois fois plus large que long, ayant sa plus grande largeur dans la base, atténué en avant en ligne presque droite, à bord antérieur assez largement et peu profondément échancré en arc simple, à lobe médian antérieur nul. Sculpture thoracale est composée de mailles fines et arrondies, peu distinctes sous la pubescence. Bord postérieur du prothorax élevé en carène fine. Lobe antéscutellaire un peu déprimé. Saillie prosternale subparallèle, aux côtés droits, assez large, nullement dilatée postérieurement. Ecusson petit, normal, bronzé. Les élytres sont environ $1\frac{3}{4}$ fois aussi longs, que larges à la base, environ $3\frac{1}{2}$ fois aussi longs que la tête et le prothorax réunis, atténués vers l'apex depuis le milieu, parallèles antérieurement, ayant la plus grande largeur environ dans les épaules, qui sont assez élevées. Marge latéropostérieure des élytres inerme. Ponctuation élytrale assez fine et éparse, subsériale, distincte. Elytres allongés, assez parallèles et assez convexes, subcunéiformes, luisants. Carène humérale des élytres nulle. Apex élytral étroitement arrondi. Ornementation élytrale est composée de pubescence jaunâtre assez longue et fine, qui est disposée assez régulièrement sur les élytres et qui est un peu condensée en bandes transversales onduleuses très vagues et peu distinctes. Hanches postérieures à l'angle latéropostérieur aigu au sommet. Pattes et palpes d'un jaune clair. Ongles des tarses et les derniers articles des tarses noirs.

163. *Trachys* (s. str.) *Nanubis* n. sp. (Obenb. l. c. p. 81—82.)

Long.: 2, lat.: 1.1 mm. Hab.: Zoulouländ.

Taille assez robuste, assez courte et assez ovale. Coloration du dessus d'un bronzé noirâtre et obscur, presque noir sur les élytres; luisant. Coloration du dessous d'un bronzé noir. Pubescence de dessus unicolore, d'un gris jaunâtre, formant sur les élytres un vague dessin onduleux. Tête enfoncée dans le prothorax, largement excavée, relativement petite. Epistome assez étroit, un peu plus large que long. Le front est marqué d'une ligne médiane enfoncée; partie interoculaire du front est en trapèze assez fortement atténué en avant. Antennes noires, courtes, normales. Prothorax environ trois fois plus large que long, ayant sa plus grande largeur dans la base, atténué en avant plus que la tête et le prothorax réunis, atténués vers l'apex depuis la moitié de la longueur élytrale, ayant la plus grande largeur dans la base, subparallèles dans la moitié antérieure. Marge latéropostérieure des élytres inerme. en ligne légèrement arquée, à bord antérieur assez peu largement, assez profondément échancré en arc simple, à lobe médian antérieur nul. Sculpture thoracale est composée de mailles fines et arrondies, très peu distinctes sous la pilosité. Bord postérieur très finement élevé en carène mince; partie basale transversalement subdéprimée suivant la ligne basale. Saillie prosternale subparallèle, aux côtés droits, assez large, nullement dilatée postérieurement. Ecusson petit, noirâtre. Les élytres sont environ $1\frac{3}{5}$ fois aussi longs, que larges à la base, environ trois fois aussi longs que la tête et le prothorax réunis, atténués vers l'apex depuis le milieu, subparallèles antérieurement, ayant la plus grande largeur environ dans les épaules, qui sont un peu élevées. Marge latéropostérieure des élytres inerme. Ponctuation élytrale grossière et éparse, mais superficielle, surface élytrale à l'apparence assez inégale. Elytres assez courts, peu parallèles, assez convexes. Carène humérale des élytres nulle. Apex élytral assez largement arrondi. Ornementation élytrale est composée de bandes transversales onduleuses vagues et étroites, peu distinctes. Hanches posté-

rieures à l'angle latéropostérieur aigu. Pattes et palpes d'un jaune clair. Ongles des tarsi et les derniers articles des tarsi noirs.

164. *Trachys* (s. str.) *differens* Kerr. in Krytsman, Genera Ins. fasc. XII, 1903, p. 320.

Hab.: Afr. or. angl.

165. *Trachys* (s. str.) *Armilla* n. sp. (Obenb. l. c. p. 82.)

Long.: 2.5, lat.: 1.4 mm. Hab.: Congo belge.

Taille assez robuste, assez convexe, ovale, un peu cunéiforme. Coloration du dessus d'un bronzé cuivreux et assez luisant. Coloration du dessous bronzé obscur. Pubescence de dessus unicolore, dorée, peu dense, assez courte, fine. Tête très large, largement et peu profondément excavée antérieurement. Epistome assez large, transversal, chagriné. Le front est marqué d'une ligne longitudinale enfoncée; partie interoculaire du front est en trapèze assez atténué en avant. Antennes noires, normales. Prothorax très large, atténué en avant en ligne oblique et droite, à marge basale étroitement relevée en carène. Prothorax environ trois fois plus large que long, ayant sa plus grande largeur dans la base, atténué en avant en ligne presque droite, au bord antérieur très largement échancré en arc simple, à lobe médian antérieur nul. Bord postérieur très distinctement et étroitement relevé en carène. Sculpture thoracale est composée de mailles arrondies et fines, distinctes même dans la partie discale et sous la pubescence jaune. Saillie prosternale subparallèle, aux côtés droits, assez large, nullement dilatée postérieurement. Ecusson petit, noir. Les élytres sont environ $1\frac{3}{5}$ fois aussi longs, que larges à la base, environ $3\frac{1}{3}$ fois aussi longs que la tête et le prothorax réunis, atténués vers l'apex depuis la moitié de la longueur élytrale, ayant la plus grande largeur dans la base, subparallèles dans la moitié antérieure. Marge latéropostérieure des élytres inerme. Ponctuation élytrale médiocre et distincte, irrégulière et peu profonde. Carène humérale des élytres nulle. Apex élytral assez largement arrondi. Ornementation élytrale est composée des bandes transversales, dont les espaces intermédiaires sont couverts d'une pubescence semblable, mais à peine visible, grise et obscure; ces bandes sont larges et peu flexueuses. Hanches postérieures à l'angle latéropostérieur aigu. Pattes et palpes d'un jaune clair. Ongles des tarsi et les derniers articles des tarsi noirs.

166. *Trachys* (s. str.) *erratica* Kerr. in Wytsman, Genera Ins. Fasc. XII, 1903, p. 310.

Hab.: Afr. or. angl.

167. *Trachys* (s. str.) *Usambarae* n. sp. (Obenb. l. c. p. 82.)

Long.: 3, lat.: 1.6 mm. Hab.: Usambara.

Taille ovale, allongée, assez convexe. Coloration du dessus d'un bronzé violacé cuivreux, assez luisant. Coloration du dessous noire. Pubescence de dessus unicolore, d'un roux orangé et clair, longue, assez dense, fine, assez longue. Tête grande et très large, avancée, légèrement excavée en avant. Epistome large, transversal, chagriné. Le front est marqué au milieu d'une ligne médiane; partie interoculaire du front est en trapèze assez atténué en avant. Les yeux sont placés très obliquement. Antennes noires, normales, courtes. Prothorax atténué en avant en ligne droite, à marge basale légèrement relevée en carène; assez convexe. Prothorax environ $3\frac{1}{2}$ fois plus large que long, ayant

sa plus grande largeur dans la base, à pubescence assez dense, comme celle de la tête, à bord antérieur largement échancré en ligne très légèrement bisinuée, à lobe médian antérieur très peu distincte, presque imperceptible. Sculpture thoracale est peu distincte sous la pilosité. Saillie prosternale parallèle, assez large. Ecusson très petit et bronzé. Les élytres sont environ $1\frac{2}{3}$ fois aussi longs, /ue larges à la base, environ trois fois aussi longs que la tête et le prothorax réunis, atténués vers l'apex depuis le milieu, subparallèles antérieurement, ayant la plus grande largeur environ dans les épaules, qui sont un peu élevés. Marge latéropostérieure des élytres inermes. Elytres convexes, ovalaires, allongés, à ponctuation forte, mais irrégulière, superficielle et suboblitérée. Carène humérale des élytres nulle. Apex élytral assez largement arrondi. Ornementation élytrale est composée de bandes transversales agglomérées des poils et formant un dessin flexueux et peu distinct, les poils, formant les bandes transversales étant un peu plus longs et un peu plus agglomérés, plus clairs que ceux des espaces intermédiaires. Hanches postérieures à l'angle latéropostérieur aigu. Pattes et palpes d'un testacé clair. Ongles des tarses et les derniers articles des tarses noirs.

168. *Trachys* (s. str.) *fluviatilis* Kerr. Ann. Soc. Ent. Belg. XL, 1896, p. 313.

Hab.: Fernando Poo, Ogowé.

169. *Trachys* (s. str.) *Jeanneli* Kerr. Voy. Alluaud et Jeannel, Afr. or. Ins. Col. VI, Bupr. 1914, p. 340.

Hab.: Kenya Colony, Kilimandjaro.

170. *Trachys* (s. str.) *ramisina* Obenb. Sborník Ent. odd. Nár. Mus. Praha, VI, 49, 1928, p. 21, 23, T. 1, fig. 18.

Syn.: *Jeanneli* Kerr. (pars) Voy. Alluaud et Jeannel, Afr. or. Ins. Col. VI., Bupr. 1914, p. 240.

Hab.: Afr. or. angl.

171. *Trachys* (s. str.) *Nautica* n. sp.

Long.: 2.4, lat.: 1.4 mm. Hab.: Congo belge.

Taille assez robuste, ovulaire, peu convexe. Coloration du dessus d'un bronzé assez obscur et verdâtre, luisant. Coloration du dessous d'un noir bronzé. Pubescence de dessus longue bicolore: grise, irrégulière, d'où émerge, çà et là, une pubescence jaunâtre. Tête large, anguleusement et assez largement déprimée au milieu. Epistome assez large, chagriné. Le front est marqué d'une ligne longitudinale médiane; partie interoculaire du front est en trapèze assez atténué en avant. Yeux obliques, peu visibles de dessus. Antennes courtes, noires, normales. Prothorax atténué en avant en ligne arquée, largement et transversalement déprimé le long de la base. Prothorax environ trois fois plus large que long, ayant sa plus grande largeur dans la base, atténué en avant en ligne légèrement arquée, à bord antérieur profondément et largement, à peu près simplement échancré en avant, à lobe médian antérieur peu distinct. Sculpture thoracale est composée de mailles fines arrondies; angles antérieurs assez saillants et avancées. Marge basale du prothorax relevée en carène; partie basale largement déprimée transversalement le long de la ligne de la base thoracale. Saillie prosternale large, subparallèle. Ecusson petit, normal. Les élytres sont un peu plus que $1\frac{1}{2}$ fois aussi longs, que larges à la base,

environ $2\frac{1}{2}$ fois aussi longs que la tête et le prothorax réunis, atténués vers l'apex depuis la moitié basale de la longueur élytrale, ayant la plus grande largeur environ dans la base, subparallèles dans la moitié basale. Marge latéropostérieure des élytres inerme. Ponctuation élytrale superficielle, irrégulière et assez grossière, peu distincte. Carène humérale des élytres nulle. Apex élytral largement arrondi. Ornementation élytrale est composée de très vagues ondulations transversales, formées de pubescence grise un peu plus longue que l'autre pilosité élytrale, dont les espaces intermédiaires sont couverts de pubescence un peu plus courte et brunâtre. Hanches postérieures à l'angle latéropostérieur arrondi. Pattes et palpes très obscurs, noirâtres.

172. *Trachys* (s. str.) *Nomas* n. sp.

Long.: 3.1, lat.: 1.9 mm. Hab.: Africa occ. mer.

Taille assez grande, robuste, ovale, assez peu convexe. Coloration du dessus d'un bronzé obscur et assez luisant. Coloration du dessous bronzé, luisante. Pubescence de dessus très distincte, longue, grise. Tête assez large, relativement petite, peu avancée. Epistome large, transversal, chagriné. Le front est marqué d'une ligne médiane longitudinale; partie interoculaire du front est en trapèze, assez étroitement excavée. Yeux assez plans. Antennes noires, normales. Prothorax très large, aux bords latéraux légèrement défléchis. Prothorax environ $3\frac{1}{2}$ fois plus large que long, ayant sa plus grande largeur dans la base, atténué en avant en ligne très légèrement arquée, à bord antérieur échancré en arc assez large et subbisiné, à lobe médian antérieur peu distinct. Sculpture thoracale est composée de mailles fines arrondies avec un point central, qui parfois seul reste plus visible. Marge extrême basale du prothorax relevée en carène. Saillie prosternale large et parallèle. Ecusson petit, bronzé. Les élytres sont environ $1\frac{1}{2}$ fois aussi longs, que larges à la base, environ $2\frac{3}{4}$ fois aussi longs que la tête et le prothorax réunis, atténués vers l'apex depuis la partie basale, ayant la plus grande largeur environ dans la base, subparallèles dans la partie basale. Marge latéropostérieure des élytres inerme. Ponctuation élytrale irrégulière et assez fine, superficielle. Carène humérale des élytres nulle. Apex élytral assez largement arrondi. Ornementation élytrale est composée de pubescence prédominante grise, avec les espaces entre les bandes à pilosité jaunâtre plus obscure; les bandes sont formées de poils un peu plus longs et un peu plus condensés que ceux des espaces intermédiaires. Hanches postérieures à l'angle latéropostérieur arrondi. Pattes et palpes d'un jaune ocre clair. Ongles des tarses et les articles derniers des tarses noirs.

173. *Trachys* (s. str.) *contexta* n. sp. (Obenb. l. c. p. 84.)

Long.: 2, lat.: 1 mm. Hab.: Congo belge.

Taille petite, allongée, ovale, peu convexe. Coloration du dessus d'un bronzé noir assez clair et luisant. Coloration du dessous d'un noir bronzé. Pubescence élytrale fine, brunâtre, régulière et assez éparse avec trois vagues bandes transversales grises. Tête très large, largement excavée, peu avancée. Epistome large, chagriné. Le front est marqué d'une ligne médiane longitudinale; partie interoculaire du front est en trapèze assez atténué en avant. Yeux assez convexes. Antennes noires, normales. Prothorax assez long. Prothorax environ trois fois plus large que long, ayant sa plus grande largeur dans la base, atténué en avant en ligne finement arquée, à bord antérieur échancré en arc large

et presque simple, à lobe médian antérieur nul. Sculpture thoracale est peu distincte sous la pilosité épars et grise, couvrant la tête et le prothorax. Bord postérieur distinctement relevé en carène. Saillie prosternale large et parallèle. Ecusson petit, noirâtre. Elytres allongés, à convexité assez légère, luisants. Ils sont environ $1\frac{2}{3}$ fois aussi longs, que larges à la base, environ $2\frac{2}{3}$ fois aussi longs la tête et le prothorax réunis, atténués vers l'apex depuis le milieu, subparallèles antérieurement, ayant la plus grande largeur environ dans les épaules, qui sont un peu élevées. Marge latéropostérieure des élytres inerme. Ponctuation élytrale irrégulière, fine, peu dense, superficielle et subobli-térée sous la pilosité, qui est très fine assez longue et dense. Carène humérale des élytres nulle. Apex élytral assez étroitement et conjointement arrondi. Ornementation élytrale est composée de trois bandes argentées transversales sur le fond, finement pubescent de pilosité brunâtre. Hanches postérieures à l'angle latéropostérieur arrondi. Pattes et palpes d'un jaune ocré clair. Ongles des tarses et les derniers articles noirs.

174. *Trachys* (s. str.) *Armaeone* n. sp. (Obenb. l. c. p. 84.)

Long.: 2.7, lat.: 1.2 mm. Hab.: Mashonaland.

Taille assez grande, assez convexe, assez acuminée postérieurement, ovulaire et subparallèle. Coloration du dessus d'un bronzé cuivreux et luisant. Coloration du dessous d'un bronzé cuivreux plus obscur. Tête et prothorax à pilosité, dorée, fine et épars; tête très large et grande. Pubescence fine et épars, assez longue et régulière bicolore, jaune brunâtre et blanche. Tête de dessus déprimée, à contour sinueux, faiblement excavée. Epistome large, chagriné. Le front est marqué d'une ligne médiane enfoncée fine; partie interoculaire du front est en trapèze assez fortement atténué en avant; la surface du front est, comme celle de la tête, couverte de pubescence dorée brunâtre, mélangée de poils blancs. Antennes noires et courtes, normales. Prothorax assez faiblement atténué en avant en ligne presque droite, très court et très large. Il est environ $3\frac{1}{4}$ fois plus large que long, ayant sa plus grande largeur dans la base, assez convexe et luisant, à bord antérieur assez fortement échancré en arc faiblement bisinué, à lobe médian antérieur assez distinct. Bord postérieur relevé en carène fine et mince. Une légère, assez large dépression transversale, partant des côtés jusque presque vers le disque au milieu. Sculpture thoracale est composée de mailles arrondies et fines, peu distinctes sous la pilosité, qui est rare, fine et régulière, pour la plupart jaune brunâtre, avec quelques poils blancs entremêlés. Saillie prosternale large, environ deux fois plus longue que large. Ecusson petit, noir. Elytres parallèles jusqu'au milieu, atténués vers le sommet en courbe régulière. Les élytres sont environ $1\frac{3}{5}$ fois aussi longs, que larges à la base, environ trois fois aussi longs que la tête et le prothorax réunis, atténués vers l'apex depuis le milieu de la longueur élytrale, ayant la plus grande largeur environ dans les épaules, qui sont un peu élevées. Marge latéropostérieure des élytres inerme. Ponctuation élytrale assez forte, assez épars et irrégulière, superficielle, assez peu distincte sous la pilosité élytrale, qui est très régulière, assez longue, fine et pas trop dense. Carène humérale des élytres nulle. Apex élytral assez étroitement arrondi. Ornementation élytrale est composée de trois bandes légèrement flexueuses de pilosité fine et argentée, avec quelques macules de la même couleur dans la partie antérieure, la majeure partie des élytres étant couverte de pilosité de la même consistance et densité, mais jaune brunâtre, les bandes minces argentées étant bien

visibles et distinctes. Hanches postérieures à l'angle latéropostérieur aigu. Pattes et palpes d'un jaune clair. Ongles des tarsi et les derniers articles des tarsi noirs.

175. *Trachys* (s. str.) *ruralis* n. sp. (Obenb. l. c. p. 84.—85.)

Long.: 1.7, lat.: 0.95 mm. Hab.: Tanganyika.

Taille petite, assez étroite; surface assez déprimée, subparallèle, ovale et allongée. Coloration du dessus d'un cuivreux roué un peu violacé dans la partie basale des élytres, apex élytral étant un peu plus cuivreux et plus luisant. Surface assez luisante. Coloration du dessous d'un bronzé cuivreux obscur et luisant. Pubescence jaune, avec ornementation élytrale argentée. Tête large, fortement et largement excavée au milieu, peu avancée. Epistome assez étroit et chagriné. Le front est nettement impressionné, au milieu; partie interoculaire du front est en trapèze assez fortement atténué en avant; surface thoracale et frontale couverte d'une pubescence prédominante jaunâtre, très fine, couchée et assez dense, régulière. Antennes normales, noires. Prothorax atténué en avant en ligne assez arquée, au bord postérieur légèrement élevé en carène. Prothorax environ trois fois plus large que long, ayant sa plus grande largeur dans la base, assez convexe et luisant, à bord antérieur fortement échancré en arc presque simple, à lobe médian antérieur peu sensible; lobe antéscutellaire légèrement subdéprimé anguleusement. Sculpture thoracale est composée de mailles arrondies et très fines, distinctes même dans la partie discale. Saillie prosternale large, environ deux fois plus longue que large. Ecusson petit, bronzé violacé. Les élytres sont environ $1\frac{3}{5}$ fois aussi longs que larges à la base, subparallèles antérieurement, environ trois fois aussi longs que la tête et le prothorax réunis, atténués vers l'apex depuis le milieu de la longueur élytrale, ayant la plus grande largeur environ dans les épaules, qui sont un peu élevées. Marge latéropostérieure des élytres inerme. Ponctuation élytrale irrégulière, médiocre, superficielle. Carène humérale des élytres nulle. Apex élytral assez étroitement arrondi. Ornementation élytrale est composée de trois vagues et larges bandes transversales et argentées sur le fond à pubescence jaune un peu roussâtre, mais semblable entièrement à celle des bandes argentées, assez dense, fine et régulière. Hanches postérieures à l'angle latéropostérieur aigu. Pattes et palpes d'un jaune clair. Ongles des tarsi et les derniers articles des tarsi noirs.

176. *Trachys* (s. str.) *confusula* Obenb. Sborník Ent. Odd. Mus. Nár. Mus. Praha, VI, 49, 1928, p. 22, 23, T. 1, fig. 6.

Syn.: *africana* Kerr. Voy. Alluaud et Jeannel, Afr. or. Ins. Col. VI. Bupr. 1914, p. 241.

Hab.: Afr. or. c.

177. *Trachys* (s. str.) *Bequaerti* Kerr. Rev. Zool. Afr. II, fasc. 1, 1912, p. 13.

Hab.: Congo belge.

178. *Trachys* (s. str.) *Phanerogaea* n. sp. (Obenb. l. c. p. 85.)

Long.: 2.3, lat.: 1.4 mm. Hab.: Congo belge: Bondo. (Dr. Jiří Baum lgt.)

Taille allongée, subparallèle, peu convexe, ovale. Coloration du dessus d'un noir bronzé très légèrement violacé. Surface très luisante. Coloration du

dessous d'un bronzé noir et luisant. Pubescence de la tête et prothorax rare et fine, jaune, prothorax mraqué d'une macule blanche semblable préscutélaire. Tête large, largement et profondément creusée au milieu. Epistome large et chagriné. Le front est marqué d'une ligne profonde médiane; partie interoculaire du front est en trapèze assez atténué en avant. Yeux obliques. Antennes noires et normales. Prothorax large et court, atténué en avant en ligne presque droite, assez convexe, subdéprimé transversalement. Prothorax environ trois fois plus large que long, ayant sa plus grande largeur environ dans la base, convexe et luisant, à bord antérieur échancré en avant en arc simple, très profond et large, à lobe médian antérieur indistinct. Bord postérieur du prothorax élevé en carène mince. Sculpture thoracale est composée de mailles fines superficielles arrondies, peu distinctes sous la pubescence. Saillie prosternale subparallèle, légèrement dilaté potérieurement. Ecusson petit, bronzé noir. Elytres parallèles jusque derrière le milieu, à ponctuation irrégulière assez fine, superficielle, environ $1\frac{2}{3}$ fois aussi longs que larges à la base, environ trois fois aussi longs que la tête et le prothorax réunis, atténués vers l'apex d'après la moitié de la longueur élytrale, ayant la plus grande largeur environ dans les épaules, qui sont assez élevées. Marge latéropostérieure des élytres inerme. Carène humérale des élytres nulle. Apex élytral arrondi en arc assez court. Ornementation élytrale est composée de trois vagues bandes de pilosité argentée, légèrement onduleuses et transversales, sur le fond, couvert de pubescence semblable, fine et rare, brunâtre, régulière, plus rousse vers la suture, très fine, courte et assez peu dense, régulière. Hanches postérieures à l'angle latéropostérieur aigu. Pattes et palpes d'un jaune clair. Ongles des tarses et les derniers articles des tarses noirs.

179. *Trachys* (s. str.) *confusissima* Obenb. Ann. Soc. Ent. France, XCIX, 1925, p. 359—360.

Hab.: Congo belge.

180. *Trachys* (s. str.) *xenonyma* n. sp. (Obenb. l. c. p. 86.)

Long.: 2.4, lat.: 1.2 mm. Hab.: Natal.

Taille en ovale assez acuminé postérieurement, assez convexe. Coloration du dessus d'un bronzé très obscur et luisant. Coloration du dessous d'un noir un peu bronzé. Pubescence jaune, rare et fine, avec, sur les élytres un vague dessin onduleux de pilosité blanchâtre. Tête assez grande, assez large, largement excavée. Epistome large, transversal, chagriné. Le front est largement excavé; partie interoculaire du front est en trapèze assez atténué en avant. Yeux peu visibles de dessus, aux bords oculofrontaux légèrement subcarénés. Antennes normales et noires. Prothorax large, aux angles postérieurs droits, atténué en avant en ligne oblique et droite, angles antérieurs aigus. Prothorax environ trois fois plus large que long, ayant sa plus grande largeur dans la base, atténué en avant en ligne droite, à bord antérieur fortement échancré en arc presque simple, à lobe médian antérieur indistinct. Bord postérieur légèrement élevé en carène. Angles antérieurs aigus. Sculpture thoracale est composée de mailles arrondies et fines, superficielles, sur le fond luisant. Saillie posternale parallèle, subarrondie postérieurement. Ecusson petit, noir. Elytres luisants, assez longs, subparallèles antérieurement, couverts d'une ponctuation assez faible. Les élytres sont environ $1\frac{2}{3}$ fois aussi longs, que larges à la base, environ trois fois aussi longs que la tête et le prothorax réunis, atténués vers l'apex depuis le milieu de la longueur élytrale, ayant la

plus grande largeur environ dans les épaules, qui sont assez élevées. Marge latéropostérieure des élytres inerme. Ponctuation élytrale alignée en vagues lignes un peu obliques. Elytres subparallèles dans la moitié antérieure. Carène humérale des élytres nulle. Apex élytral assez étroitement arrondi. Ornementation élytrale est composée de trois bandes étroites et flexueuses blanches sur le fond, couvert de pubescence jaune et, sur les espaces entre les bandes, de pubescence noirâtre, peu distincte. Hanches postérieures à l'angle latéropostérieur aigu. Pattes et palpes d'un ocre obscur. Ongles des tarses et les derniers articles des tarses noirs.

181. *Trachys* (s. str.) *Maxapha* n. sp. (Obenb. l. c. p. 86.)

Long.: 2.4, lat.: 1.4 mm. Hab.: Mashonaland.

Taille assez courte, ovale, assez convexe, subacuminée postérieurement. Coloration du dessus d'un cuivreux un peu violacé et luisant. Coloration du dessous d'un cuivreux violacé un peu plus obscur qu'en dessus. Pubescence prédominante élytrale blanche, formant des bandes, avec les parties intermédiaires d'un brun ou-roux obscur. Tête très large, grande, courte, assez plane. Epistome large, transversal, chagriné. Le front est marqué d'une ligne longitudinale enfoncée; partie interoculaire du front est en trapèze assez atténué en avant. Pilosité de la tête et du prothorax roussâtre avec quelques poils intermêlés blancs. Yeux arrondis. Antennes noires, normales. Prothorax environ trois fois plus large que long, ayant la plus grande largeur dans la base, atténué en avant en ligne presque droite, à bord antérieur faiblement échancré en ligne largement et faiblement bisinuée, à lobe médian antérieur distinct, à peine peu avancé; lobe basal médian du prothorax assez fortement avancé. Surface luisante. Sculpture thoracale est composée de mailles peu distinctes sous la pubescence générale. Bord postérieur du prothorax un peu relevé en carène; prothorax atténué en avant en ligne oblique presque droite. Saillie prosternale subparallèle. Ecusson petit, noir. Les élytres sont environ $1\frac{2}{3}$ fois aussi longs, que larges à la base, environ $2\frac{3}{4}$ fois aussi longs que la tête et le prothorax réunis, atténués vers l'apex depuis la base, convexes et luisants, ayant la plus grande largeur environ dans les épaules, qui sont assez élevées. Marge latéropostérieure des élytres inerme. Ponctuation élytrale forte, disposée vaguement en lignes longitudinales subobliques, les élytres sont assez acuminés postérieurement, convexes, atténués vers le sommet depuis le calus huméral. Carène humérale des élytres nulle. Ornementation élytrale est composée de bandes blanches et flexueuses, formées de pubescence assez condensée, fine et assez courte, la majeure partie de la partie basale des élytres et des espaces entre les bandes à pilosité semblable, mais rousse, fine, régulière et peu dense. Hanches postérieures à l'angle latéropostérieur subobtus. Pattes et palpes d'un brun obscur. Ongles des tarses et les derniers articles des tarses noirs.

182. *Trachys* (s. str.) *agitosa* n. sp. (Obenb. l. c. p. 86.)

Long.: 2.6, lat.: 1.3 mm. Hab.: Inhambane.

Taille assez allongée, ovale, convexe. Coloration du dessus d'un pourpré cuivreux un peu violacé et luisant. Coloration du dessous d'un cuivreux pourpré assez obscur et luisant. Pubescence de la surface fine, assez longue, éparse, bicolore, brunâtre et argentée, celle de la tête et du prothorax pour la majeure partie blanche. Tête courte et assez plane, large, peu avancée. Epistome transversal et chagriné. Le front est marqué d'une ligne longitudinale enfoncée;

partie interoculaire du front est en trapèze assez atténué en avant. Yeux arrondis. Antennes noires, normales. Prothorax environ trois fois plus large que long, ayant sa plus grande largeur dans la base, atténué en avant en ligne droite, à bord antérieur faiblement échancré en ligne bisinuée, à lobe médian antérieur peu avancée, mais distinct; bord postérieur étroitement et légèrement élevé en carène. Sculpture thoracale est composée de mailles arrondies et oblitérées, peu distinctes sous la pilosité générale, qui est rare et fine, mais assez régulière. Lobe basal du prothorax assez fortement avancé. Saillie prosternale subparallèle. Ecusson petit, noirâtre. Les élytres sont environ $1\frac{2}{3}$ fois aussi longs, que larges à la base, environ trois fois aussi longs que la tête et le prothorax réunis, atténués vers l'apex depuis le calus huméral, convexes et luisants, ayant la plus grande largeur environ dans les épaules, qui sont un peu élevées. Marge latéropostérieure des élytres inerme. Ponctuation élytrale assez faible, vague, irrégulière. Elytres assez acuminés postérieurement. Carène humérale des élytres nulle. Apex élytral assez étroitement arrondi. Ornementation élytrale est composée de bandes flexueuses et blanches, de la même façon et densité, que l'autre pubescence du fond élytral, qui est épars, fine, mais relativement longue. Pilosité prédominante élytrale blanche, formant des bandes flexueuses transversales, argentées avec les parties intermédiaires d'un brun roux et clair. Hanches postérieures à l'angle latéropostérieur subobtus. Pattes et palpes d'un brun obscur. Ongles des tarses et les derniers articles des tarses noirs.

183. *Trachys* (s. str.) *Xithris* n. sp. (Obenb. l. c. p. 86.)

Long. 2.5, lat.: 1.4 mm. Hab.: Bulawayo (Rhodésie).

Taille ovale, convexe, assez allongée, un peu acuminée postérieurement. Coloration. du dessus d'un pourpre rouge doré assez clair, l'apex élytral étant un peu plus doré. Luisant. Coloration du dessous d'un cuivreux un peu plus obscur. Pubescence prédominante grise jaunâtre, formant sur les élytres des bandes fleuveuses assez peu distinctes. Tête large, courte et assez plane, luisante, peu avancée. Epistome large, transversal et chagriné. Le front est marqué d'une ligne médiane longitudinale; partie interoculaire du front est en trapèze assez atténué en avant. Pubescence fine et épars de la tête et du prothorax jaunâtre. Yeux arrondis. Bords oculofrontaux très légèrement en carène. Antennes noires, courtes, normales. Prothorax assez long, atténué en avant en ligne oblique, presque droite et faible, convexe et luisant. Prothorax environ $2\frac{3}{4}$ fois plus large que long; ayant sa plus grande largeur dans la base, à bord antérieur faiblement échancré en ligne largement bisinuée, à lobe médian antérieur distinct, mais peu avancé; lobe basal médian du prothorax assez fortement avancé. Sculpture thoracale est subeffacée, surface thoracale très luisante. Bord postérieur légèrement relevé en carène. Saillie prosternale subparallèle. Eucosson petit, noir. Elytres longs, assez étroits, très régulièrement convexes, à ponctuation fine, épars et irrégulière. Les élytres sont environ $1\frac{2}{3}$ fois aussi longs, que larges à la base, environ $2\frac{4}{5}$ fois aussi longs que la tête et le prothorax réunis, atténués vers l'apex depuis le calus huméral, ayant la plus grande largeur environ dans la base, convexes et luisants. Marge latéropostérieure des élytres inerme. Elytres assez acuminés postérieurement, à ponctuation fine, irrégulière et superficielle, mais distincte. Carène humérale des élytres nulle. Apex élytral assez étroitement arrondi. Ornementation élytrale est composée des bandes

transversales jaunâtres, pilosité de dessus étant en général plus dorée ou roussâtre, pubescence élytrale étant fine, couchée et assez longue. Hanches postérieures à l'angle latéropostérieur subobtus. Pattes et palpes d'un brun obscur. Ongles des tarses et les derniers articles des tarses noirs.

184. *Trachys (s. str.) erogata* n. sp. (Obenb. l. c. p. 87.)

Long.: 2.1, lat.: 1.3 mm. Hab.: Africa or.: Katona.

Taille assez allongée, ovulaire, subparallèle, assez convexe. Coloration du dessus d'un bronzé assez clair et luisant. Coloration du dessous d'un bronzé un peu plus obscur et luisant. Pubescence de dessus jaune, avec une ornementation élytrale argentée; elle est dense, longue et fine. Tête très large, plane, vue de dessus, grande, assez avancée. Epistome large et chagriné. Le front est marqué d'une ligne longitudinale médiane; partie interoculaire du front est en trapèze assez atténué en avant. Pilosité de la tête et du prothorax blanche, entremêlée de poils jaunâtres. Antennes noires, courtes, normales. Prothorax assez faiblement atténué en avant, en ligne presque droite, court, large, luisant et assez convexe. Prothorax environ $3\frac{1}{2}$ fois plus large que long, ayant sa plus grande largeur dans la base, à pubescence régulière, mais épars, à bord antérieur très largement et très profondément échancré en arc bisinué, à lobe médian antérieur bien distinct et large. Sculpture thoracale est composée, de même que celle de la tête, de mailles rondes et très distinctes partout, même sur le disque. Marge postérieure du prothorax étroitement et nettement relevée en carène. Saillie prosternale assez étroite, assez, petite, stries latérales de cette saillie subétranglées au milieu, puis atténuées en avant, l'apex de cette saillie étant fortement dilaté au sommet. Ecusson petit, bronzé. Elytres parallèles jusque derrière le milieu, à ponctuation fine et irrégulière, assez dense, $1\frac{2}{3}$ fois aussi longs que larges à la base, environ $2\frac{2}{3}$ fois aussi longs que la tête et le prothorax réunis, atténués vers l'apex depuis le milieu de la longueur des élytres, ayant la plus grande largeur environ dans les épaules, qui sont un peu élevées. Marge latéropostérieure des élytres inerme. Ponctuation élytrale fine et dense, superficielle, les espaces entre les points étant marqués çà et là d'une ponctuation microscopique entremêlée, rare, mais distincte. Carène humérale des élytres nulle. Apex élytral assez étroitement arrondi. Ornementation élytrale est composée de trois vagues et très flexueuses bandes transversales argentées, sur le fond couvert de pubescence jaune. Hanches postérieures à l'angle latéropostérieur aigu au sommet. Pattes et palpes noirâtres.

185. *Trachys (s. str.) Tiburtia* n. sp. (Obenb. l. c. p. 87.)

Long.: 2.5, lat.: 1.2 mm. Hab.: Congo belge: Cap Plate.

Taille assez robuste, convexe, assez acuminée, ovulaire. Coloration du dessus d'un cuivreux clair un peu pourpré et très luisant. Coloration du dessous d'un bronzé clair et luisant. Pubescence formée des poils assez longs et courts, celle de la tête et du prothorax grise, dense, assez longue, fine, celle des élytres roussâtre. Tête assez avancée, à peine excavée antérieurement, normale. Epistome large, transversal, chagriné. Le front est marqué d'une ligne médiane enfoncée; partie interoculaire du front est en trapèze assez atténué en avant. Antennes noires, normales, courtes. Prothorax atténué en avant en ligne distinctement arquée, assez convexe, luisant. Prothorax environ trois fois plus large que long, ayant sa plus grande largeur dans la base,

atténué en avant en ligne légèrement arquée, à bord antérieur nettement et bisinueusement échancré, à lobe median antérieur distinct. Sculpture thoracale est composée de mailles arrondies très distinctes même dans la partie discale. Bord postérieur du prothorax très étroitement et peu sensiblement élevé en carène mince et peu sensible. Saillie prosternale étroite, petite, stries latérales de cette saillie étant subétranglées au milieu, fortement atténuées en avant, l'apex de cette saillie assez fortement dilaté. Écusson petit, noirâtre. Les élytres sont environ $1\frac{2}{3}$ fois aussi longs, que larges à la base, environ $2\frac{2}{3}$ fois aussi longs que la tête et le prothorax réunis, atténués vers l'apex depuis les épaules, subparallèles antérieurement, ayant la plus grande largeur environ dans les épaules, qui sont un peu élevées. Marge latéropostérieure des élytres inerme. Ponctuation élytrale fine, assez espacée, irrégulière. Carène humérale des élytres nulle. Apex élytral étroitement arrondi. Ornementation élytrale est composée de trois bandes flexueuses argentées et transversales sur le fond à pubescence roussâtre. Pilosité élytrale fine, régulière, mais rare. Hanches postérieures à l'angle latéropostérieur aigu. Pattes et palpes d'un noir intense.

186. *Trachys* (s. str.) *Rita* n. sp. (Obenb. l. c. p. 87.)

Long.: 2.2, lat.: 1.2 mm. Hab.: Congo belge: Congo da Lemba. Kapiri.

Taille assez peu robuste, assez étroite, allongée, assez acuminée. Coloration du dessus d'un bronzé doré et très luisant. Coloration du dessous d'un bronzé clair et luisant. Pubescence de dessus assez dense et peu régulière; pilosité de la tête et du prothorax grise. Tête assez courte, légèrement subdéprimée au milieu, normale. Epistome large et chagriné. Le front est marqué d'une ligne longitudinale enfoncée; partie interoculaire du front est en trapèze assez atténué en avant. Antennes noires, normales, courtes, minces. Prothorax environ trois fois plus large que long, ayant sa plus grande largeur dans la base, atténué en avant en ligne oblique presque droite, à bord antérieur profondément échancré en arc presque simple, à lobe median antérieur peu distinct. Bord postérieur étroitement mais distinctement élevé en carène. Sculpture thoracale est composée de mailles arrondies fines, mais distinctes même dans la partie discale. Saillie prosternale étroite, petite, stries latérales de cette saillie subétranglées au milieu et atténuées en avant, l'apex de cette saillie fortement dilaté au sommet. Écusson petit, bronzé. Les élytres sont environ $1\frac{2}{3}$ fois aussi longs, que larges à la base, environ $2\frac{2}{3}$ fois aussi longs que la tête et le prothorax réunis, atténués vers l'apex depuis le milieu, subparallèles antérieurement, ayant la plus grande largeur environ dans les épaules, qui sont un peu élevés. Marge lateropostérieure des élytres inerme. Ponctuation élytrale fine et assez dense, irrégulière, avec de traces de disposition sériale. Carène humérale des élytres nulle. Apex élytral assez étroitement arrondi. Ornementation élytrale est composée de trois bandes flexueuses et blanches sur le fond de pubescence roussâtre, cette pubescence étant fine, assez longue et éparse. Hanches postérieures à l'angle latéropostérieur aigu. Pattes et palpes d'un noir intense.

Observation: Un type de cette espèce se trouve dans la collection du Musée de Congo belge, l'autre dans la mienne.

187. *Trachys* (s. str.) *Zethmaea* n. sp. (Obenb. l. c. p. 87.)

Long.: 2, lat.: 1.1 mm. Hab.: Zouloulund.

Taille ovulaire, allongée, subparallèle et assez peu convexe, subacuminée postérieurement. Coloration du dessus d'un noir luisant, un peu bronzé sur la tête et prothorax. Coloration du dessous d'un noir à peine bronzé. Pubescence fine, dense, régulière, dorée, avec une ornementation vague, argentée sur les élytres. Tête largement excavée antérieurement, normale, assez large. Epistome large et chagriné. Le front est en trapèze. Bord oculofrontal des yeux subcaréniforme, yeux presque invisibles de dessus. Antennes noires et normales, courtes et minces. Pilosité de la tête et prothorax dorée et fine, peu dense, régulière. Prothorax obliquement atténuée en avant en ligne droite. Prothorax environ trois fois plus large que long, ayant sa plus grande largeur dans la base, atténué en avant en ligne oblique droite, à bord antérieur largement échancré en arc simple, à lobe médian antérieur nul. Bord postérieur du prothorax très légèrement élevé en carène. Sculpture thoracale est composée de mailles fines et arrondies superficielles, peu distinctes sous la pilosité du fond. Saillie prosternale étroite, petite, stries latérales étant subétranglées au milieu et fortement atténuées en avant, apex de cette saillie fortement dilaté au sommet. Ecusson petit, noirâtre. Les élytres sont environ $1\frac{3}{4}$ fois aussi longs, que larges à la base, environ $3\frac{1}{3}$ fois aussi longs que la tête et le prothorax réunis, atténués vers l'apex depuis le milieu, subparallèles antérieurement, ayant la plus grande largeur environ dans la base, avec les épaules un peu élevées. Marge latéropostérieure des élytres inerme. Ponctuation élytrale superficielle, assez peu dense, irrégulière. Carène humérale des élytres nulle. Apex élytral étroitement arrondi. Ornementation élytrale est composée de trois fascies peu denses, vagues, transversales, onduleuses et argentées, sur le fond à pubescence fine et dense, régulière, dorée. Pubescence générale peu dense et fine, mais très régulière. Hanches postérieures à l'angle latéropostérieur aigu. Pattes et palpes d'un noir intense.

188. *Trachys* (s. str.) *Mariaxis* n. sp. (Obenb. l. c. p. 88.)

Long.: 2.5, lat.: 1.3 mm. Hab.: Transvaal: Pretoria.

Taille ovulaire, convexe, assez trapue. Coloration du dessus d'un bronzé noirâtre et luisant. Coloration du dessous d'un noir à peine bronzé. Pubescence prédominante de dessus grise, condensée sur les élytres en fascies, parties intermédiaires à pubescence brune. Tête à peine excavée, vue de dessus plane, assez avancée antérieurement. Epistome large et chagriné. Le front est en trapèze distinctement plus large que long; partie interoculaire du front est marquée d'une ligne fine longitudinale enfoncée. Bord oculofrontal subarrondi, yeux bien visibles de dessus. Antennes noires, courtes, minces. Prothorax environ trois fois plus large que long, ayant sa plus grande largeur dans la base, atténué en avant en ligne presque droite, à bord antérieur échancré en ligne distinctement bisinuée, à lobe médian antérieur distinct, mais peu avancé. Bord postérieur très étroitement et peu sensiblement élevé en carène. Sculpture thoracale est composée d'un système des aréoles subsquamuliformes, nettes et très fines, distinctes même dans la partie médiane et discale. Saillie prosternale étroite, en général petite, stries latérales de cette saillie subétranglées au milieu et assez fortement atténuée en avant, l'apex de cette saillie assez fortement dilaté au sommet. Ecusson petit, noirâtre. Les élytres sont environ $1\frac{1}{2}$ fois aussi longs, que larges à la base, environ $2\frac{1}{2}$ fois aussi longs que la tête et le prothorax réunis, atténués vers l'apex depuis le milieu, subparallèles antérieurement, ayant la plus grande largeur environ dans les épaules, qui sont un peu

élevées. Marge latéropostérieure des élytres inerme. Ponctuation élytrale grossière, mais très oblitérée. Carène humérale des élytres nulle. Apex élytral assez largement arrondi. Ornementation élytrale est composée de trois vagues fascies transversales et flexueuses, un peu condensées, avec les parties intermédiaires de la surface élytrale couvertes de pilosité brunâtre. Hanches postérieures à l'angle latéropostérieur aigu. Pattes et palpes d'un noir intense.

189. *Trachys* (s. str.) *Gasurra* n. sp. (Obenb. l. c. p. 88.)

Long.: 2.6, lat.: 1.6 mm. Hab.: Congo belge.

Taille assez acuminée, ovulaire, assez trapue, convexe. Coloration du dessus bicolore: tête et prothorax d'un bronzé légèrement cuivreux, les élytres d'un bronzé un peu plus violacé et luisant. Coloration du dessous d'un noir à peine bronzé. Pubescence prédominante du dessus grise, celle du fond élytral brunâtre, fine, éparsée et régulière. Tête à peine excavée, normale, large, plane, peu avancée. Epistome large et chagriné. Le front est à peine plus large que long, assez étroit; partie interoculaire du front est marquée d'une ligne fine enfoncée longitudinale. Bord oculofrontal subarrondi, yeux bien visibles de dessus. Antennes noires, normales. Prothorax environ trois fois plus large que long, ayant sa plus grande largeur dans la base, atténué en avant en ligne oblique droite, à bord antérieur échancré en arc presque simple, à lobe médian antérieur peu distinct. Bord postérieur du prothorax légèrement élevé en carène fine et très étroite. Sculpture thoracale est composée des areoles simples et peu distinctes, très fines. Saillie prosternale étroite, petite, stries latérales de cette saillie étant subétranglées et atténuées en avant, l'apex de cette saillie fortement dilaté. Ecusson petit, noirâtre. Les élytres sont environ $1\frac{3}{5}$ fois aussi longs, que larges à la base, environ $2\frac{2}{3}$ fois aussi longs que la tête et le prothorax réunis, atténués vers l'apex depuis le milieu, subparallèles antérieurement, ayant la plus grande largeur environ dans les épaules, qui sont un peu élevées. Marge latéropostérieure des élytres inerme. Ponctuation élytrale fine et superficielle, subéffacée et assez dense. Carène humérale des élytres nulle. Apex élytral assz largement arrondi. Ornementation élytrale est composée de trois vagues fascies transversales et flexueuses, avec les parties intermédiaires de la surface couvertes de pilosité brunâtre. Hanches postérieures à l'angle latéropostérieur aigu. Pattes et palpes d'un noir intense.

190. *Trachys* (s. str.) *Kikuyina* Obenb. Sborník Ent. Odd. Nár. Mus. Praha, VI, 49, 1928, p. 24, t. 1, fig. 12.

Syn.: *montana* Kerr. Voy. Alluaud et Jeannel, Afr. or. Col. VII., Bupr. 1914, p. 241.

Hab.: Kenya Colony.

191. *Trachys* (s. str.) *Iphithea* n. sp. (Obenb. l. c. p. 88.)

Long.: 1.7, lat.: 1.1 mm. Hab.: Pondoland.

Taille petite, assez allongée, assez acuminée postérieurement, assez convexe. Coloration du dessus d'un bronzé brun noirâtre et luisant. Coloration du dessous d'un noir bronzé luisant. Pubescence de la majeure partie de la surface grise, fine, assez espacée et régulière, formée de poils fins courbés et peu denses. Tête courte et large, normale, un peu impressionnée et excavée antérieurement. Epistome peu large et chagriné. Le front est sillonné au milieu longitudinalement; partie interoculaire du front est en trapèze assez atténué en avant. Antennes noires, normales, courtes. Prothorax atténué en avant en

ligne presque droite, assez convexe et luisant, environ $2\frac{3}{4}$ fois plus large que long, ayant sa plus grande largeur dans la base, avec le bord postérieur légèrement relevé, à bord antérieur échancré en ligne nettement bisinuée, à lobe médian antérieur distinct. Sculpture thoracale est peu distincte sous la pubescence, qui est assez régulière, mais pas trop dense. Saillie prosternale étroite, assez petite, stries latérales de cette saillie subétranglées au milieu, atténuées en avant, l'apex de cette saillie étant assez fortement dilaté. Ecusson petit, bronzé. Les élytres sont environ $1\frac{2}{3}$ fois aussi longs, que larges à la base, environ trois fois aussi longs que la tête et le prothorax réunis, atténués vers l'apex depuis la base, convexes et luisants, ayant la plus grande largeur environ dans les épaules, qui sont assez élevées. Marge latéropotérieure des élytres inerme. Ponctuation élytrale assez forte, mais très oblitérée. Carène humérale des élytres nulle. Apex élytral assez étroitement arrondi. Ornementation élytrale est composée de bandes transversales et flexueuses vagues, nullement condensées, les espaces entre elles étant couverts de pilosité brune. Hanches postérieures à l'angle latéropostérieur aigu. Pattes et palpes d'un brun noirâtre et très obscur. Ongles des tarses et les derniers articles des tarses noirs.

192. *Trachys* (s. str.) *Theochaera* n. sp. (Obenb. l. c. p. 88.)

Long.: 2.2, lat.: 1.3 mm. Hab.: Rhodesia: Bulawayo.

Taille assez grande, assez robuste, assez fortement arrondie postérieurement. Coloration du dessus d'un noir bronzé un peu violacé et brillant. Coloration du dessous d'un bronzé noir. Pubescence de la majeure partie de la surface couverte de pilosité grise, fine, assez espacée et régulière avec entremêlés quelques poils plus brunâtres. Tête grande, assez avancée, assez large, normale, vue de dessus, plane. Epistome assez étroit, chagriné. Le front est silloné finement au milieu; partie interoculaire du front est en trapèze assez atténué en avant. Antennes noires, normales, minces. Prothorax atténué en avant en ligne presque droite, convexe, à peine déprimé avant la base, rebord basal à peine relevé; environ trois fois plus large que long, ayant sa plus grande largeur dans la base, à bord antérieur assez fortement échancré en arc simple, à lobe médian antérieur nul. Sculpture thoracale est composée de mailles arrondies et très fines. Saillie prosternale étroite, assez petite, stries latérales de cette saillie subétranglées au milieu, atténuées en avant, l'apex de cette saillie assez fortement dilaté. Ecusson petit, noir. Les élytres sont environ $1\frac{1}{2}$ fois aussi longs, que larges à la base, environ $2\frac{1}{2}$ fois aussi longs que la tête et le prothorax réunis, atténués vers l'apex depuis le milieu, subparallèles antérieurement, ayant la plus grande largeur environ dans les épaules, qui sont assez élevées. Marge latéropostérieure des élytres inerme. Ponctuation élytrale fine et oblitérée. Carène humérale des élytres nulle. Apex élytral assez étroitement arrondi. Ornementation élytrale est composée de bandes onduleuses et vagues, transversales, nullement condensées, dont les espaces intermédiaires sont couverts de pilosité brune. Hanches postérieures à l'angle latéropostérieur aigu. Pattes et palpes d'un brun noirâtre, très obscur. Ongles des tarses et les derniers articles des tarses noirs.

193. *Trachys* (s. str.) *Tiburtia* n. sp. (Obenb. l. c. p. 88.)

Long.: 2.5, lat.: 1.5 mm. Hab.: Africa or.: Amani.

Taille assez peu convexe, subcunéiforme, assez allongée. Coloration du dessus d'un noir à peine bronzé, luisant. Coloration du dessous noire. Pubes-

cence de dessus prédominante brune, avec, sur les élytres de très vagues bandes flexueuses blanches; elle est assez dense, fine, courte, assez régulière. Tête assez profondément excavée intérieurement, assez large. Epistome large et chagrine. Le front est marqué d'une ligne longitudinale enfoncée; partie interoculaire du front est en trapèze assez atténué en avant. Marges intérieures de yeux légèrement subcarénées. Antennes noires, courtes, normales. Prothorax large, assez fortement atténué en avant en ligne arquée, à marge basale légèrement relevée. Prothorax environ trois fois plus large que long, ayant sa plus grande largeur dans la base, atténué en avant en ligne légèrement arquée, à bord antérieur largement échancré en arc simple, à lobe médian antérieur nul. Sculpture thoracale indistincte sous la pubescence, qui est assez dense, brunâtre, comme sur la tête, avec quelques poils entremêlés blancs. Bord postérieur légèrement élevé en carène. Ecusson petit, noir. Elytres assez longs, subcunéiformes, peu convexes, assez luisants, assez longs, environ $1\frac{2}{3}$ fois aussi longs, que larges à la base, environ trois fois aussi longs que la tête et le prothorax réunis, atténués vers l'apex depuis la base, en ligne obliquement arquée, ayant la plus grande largeur environ dans les épaules, qui sont un peu élevées. Marge latéropostérieure des élytres inerme. Ponctuation élytrale à peu près subéffacée, indistincte et très superficielle. Carène humérale des élytres nulle. Apex élytral assez largement arrondi. Ornementation élytrale est composée de trois vagues bandes flexueuses argentées et étroites, composées de pubescence fine et assez dense, régulière, à peine condensée, avec quelques macules d'un jaune doré, aux espaces entre cette ornementation couverts d'une pubescence noire, peu visible, mais nette. Fémurs postérieurs assez longs, dépassant les hanches. Hanches postérieures à l'angle latéropostérieur aigu. Pattes et palpes d'un jaune clair. Ongles des tarses et les derniers articles des tarses noirs.

194. *Trachys* (s. str.) *Pharaxis* n. sp. (Obenb. l. c. p. 89.)

Long.: 2.7, lat.: 1.5 mm. Hab.: Mashonaland.

Taille grande, large, ovalaire, pas trop convexe. Coloration du dessus d'un cuivré clair et luisant, un peu violacé. Coloration du dessous d'un noir un peu cuivré et luisant. Pubescence de la tête et du prothorax peu dense et assez irrégulière, d'un jaune grisâtre. Tête assez profondément déprimée, assez grande, assez avancée. Epistome large et chagriné. Le front est marqué d'une ligne longitudinale enfoncée; partie interoculaire du front est en trapèze assez atténué en avant. Marges intérieures des yeux légèrement subcarénées. Antennes noires, courtes, normales. Prothorax large, assez fortement atténué en avant, aux angles postérieurs subaigus. Prothorax environ $3\frac{1}{2}$ fois plus large que long, ayant sa plus grande largeur dans la base, atténué en avant en ligne presque droite, à bord antérieur échancré largement en avant en ligne légèrement bisnuée, à lobe médian antérieur très peu distinct. Bord postérieur légèrement élevé en carène. Sculpture thoracale est composée de mailles fines arrondies et superficielles sur le fond luisant. Ecusson petit, noir. Les élytres sont environ $1\frac{3}{5}$ fois aussi longs, que larges à la base, environ trois fois aussi longs que la tête et le prothorax réunis, atténués vers l'apex depuis le milieu, subparallèles antérieurement, ayant la plus grande largeur environ dans les épaules, qui sont assez élevées. Marge latéropostérieure des élytres inerme. Ponctuation élytrale médiocre, assez dense, irrégulière, superficielle. Carène humérale des élytres nulle. Apex élytral assez largement arrondi. Ornementation élytrale est composée de trois bandes blanches transversales et flexueuses,

dont les espaces intermédiaires sont couverts d'une pilosité vague, d'un jaune gris. Fémurs postérieurs assez longs, dépassant les hanches. Hanches postérieures à l'angle latéropostérieur aigu au sommet. Pattes et palpes d'un jaune clair. Ongles des tarses et les derniers articles des tarses noirs.

195. *Trachys* (s. str.) *Phaedaena* n. sp. (Obenb. l. c. p. 89.)

Long.: 2.2, lat.: 1.1 mm. Hab.: Congo belge: Bondo. (Dr. Jiří Baum lgt.)

Taille allongée, peu convexe, ovalaire. Coloration du dessus d'un bronzé brun assez obscur, luisant. Coloration du dessous noire. Pubescence de dessus vague et jaunâtre, avec l'ornementation élytrale grise. Tête assez profondément déprimée, assez avancée, assez large. Epistome chagriné, transverse. Le front est marqué d'une ligne longitudinale médiane; partie interoculaire du front subcarénée. Antennes noires, courtes, minces, deuxième article aussi long que l'article basal, un peu renflé. Prothorax assez large, assez faiblement atténué en avant, aux angles postérieurs droits. Prothorax environ $2\frac{4}{5}$ fois plus large que long, ayant sa plus grande largeur dans la base, atténué en avant en ligne assez fortement arquée, à bord antérieur très profondément échancré en arc simple, à lobe médian antérieur indistinct. Bord postérieur très légèrement élevé. Sculpture thoracale est subéffacée et peu distincte sur le fond luisant. écusson petit, noir. Les élytres sont environ $1\frac{3}{5}$ fois aussi longs, que larges à la base, environ trois fois aussi longs que la tête et le prothorax réunis, atténués vers l'apex depuis le milieu, subparallèles antérieurement, ayant la plus grande largeur environ dans les épaules, qui sont un peu élevées. Marge latéropostérieure des élytres inerme. Ponctuation élytrale subéffacée, superficielle, fine et irrégulière. Carène humérale des élytres nulle. Apex élytral assez étroitement arrondi. Ornementation élytrale est composée de trois bandes transversales grises; parties intermédiaires entre ces bandes à pilosité vague jaunâtre, pubescence générale fine et éparsée, peu remarquable. Fémurs postérieurs assez longs, dépassant les hanches postérieures. Hanches postérieures à l'angle latéropostérieur aigu. Pattes et palpes d'un jaune clair. Ongles des tarses et les derniers articles des tarses noirs.

196. *Trachys* (s. str.) *pulex* n. sp. (Obenb. l. c. p. 89.)

Long.: 2.2, lat.: 1.1 mm. Hab.: Congo belge.

Taille petite, subparallèle, allongée, peu atténuée. Coloration du dessus noire et luisante. Coloration du dessous noire. Pubescence de dessus très fine, peu distincte, pubescence prédominante jaune brunâtre. Tête large, excavée au milieu, assez grande, peu avancée. Epistome assez large, chagriné. Le front est marqué d'une ligne longitudinale enfoncée; partie interoculaire du front est en trapèze, assez fortement atténué en avant. Marge intérieure des yeux subarrondie, yeux obliques et peu convexes. Antennes noires, normales, minces. Prothorax environ trois fois plus large que long, ayant sa plus grande largeur dans la base, atténué en avant en ligne assez arquée, à bord antérieur profondément, largement, simplement échancré, à lobe médian antérieur nul. Bord postérieur à peine élevé en carène. Sculpture thoracale subéffacée sur le fond luisant. Ecusson petit, noir. Elytres subparallèles jusque derrière le milieu, luisant, assez peu convexes, environ $1\frac{2}{3}$ fois aussi longs, que larges à la base, environ trois fois aussi longs que la tête et le prothorax réunis, atténués vers l'apex depuis le moitié de la longueur élytrale, ayant la plus grande largeur

environ dans les épaules, qui sont assez élevées. Marge latéropostérieure des élytres inerme. Ponctuation élytrale oblitérée et indistincte; fond élytral très luisant et très légèrement coriacé. Carène humérale des élytres nulle. Apex élytral assez largement arrondi. Ornementation élytrale est composée de quelques bandes transversales flexueuses très peu distinctes et grisâtres. Fémurs postérieurs courts, ne dépassant pas latéralement les hanches. Hanches postérieures à l'angle latéropostérieur aigu. Pattes et palpes d'un jaune clair. Ongles des tarses et les derniers articles des tarses noirs.

197. *Trachys* (s. str.) *riparia* Kerr. Mitt. Naturhist. Mus. Hamburg, XXX, 1913, p. 121.

Hab.: Afr. or. angl., Kilimandjaro.

198. *Trachys* (s. str.) *blandula* n. sp. (Obenb. l. c. p. 89—90.)

Long.: 2.5, lat.: 1.3 mm. Hab.: Haute Uéllé.

Taille allongée, convexe, assez acuminée, ovulaire. Coloration du dessus d'un bronzé assez clair et luisant. Coloration du dessous d'un bronzé luisant plus obscur. Pubescence de dessus abondante, fine, assez dense, assez longue, régulière et grise. Tête très large, excavée au milieu, large, peu avancée. Epistome court et transversal. Le front est marqué d'une ligne longitudinale enfoncée; partie interoculaire du front est en trapèze assez atténué en avant. Marge intérieure des yeux subarrondie. Antennes noires, normales, cavités antennaires médiocres. Prothorax très large, au bord postérieur légèrement relevé, atténué en avant en ligne légèrement arquée. Prothorax environ $2\frac{3}{4}$ fois plus large que long, ayant sa plus grande largeur dans la base, atténué en avant en ligne légèrement arquée, à bord antérieur profondément échancré en arc presque simple, à lobe médian antérieur peu distinct. Bord basal du prothorax légèrement élevé en carène. Sculpture thoracale est composée de fines mailles arrondies, très peu distincte sur le fond luisant et pubescent. Saillie prosternale assez large, mais petite, stries latérales de cette saillie subétranglées au milieu et atténuées en avant, l'apex de cette saillie assez fortement dilaté au sommet. Ecusson petit, bronzé. Les élytres sont environ $1\frac{2}{3}$ fois aussi longs, que larges à la base, environ $2\frac{3}{4}$ fois aussi longs que la tête et le prothorax réunis, atténués vers l'apex depuis la base, subparallèles antérieurement, ayant la plus grande largeur environ dans les épaules, qui sont assez élevées. Marge latéropostérieure des élytres inerme. Ponctuation élytrale fine et irrégulière, sur le fond luisant et subcoriacé. Carène humérale des élytres nulle. Apex élytral assez largement arrondi. Ornementation élytrale est composée des vagues bandes onduleuses transversales et grises, dont les espaces intermédiaires sont couverts de pubescence semblable, mais brunâtre. Fémurs postérieurs courts, ne dépassant pas les hanches. Hanches postérieures à l'angle latéropostérieur aigu. Pattes et palpes d'un jaune clair. Ongles des tarses et les derniers des articles des tarses noirs.

199. *Trachys* (s. str.) *matrona* n. sp. (Obenb. l. c. p. 90.)

Long.: 2.4, lat.: 1.4 mm. Hab.: Congo belge.

Taille assez grande, assez large, ovulaire, assez allongée. Coloration du dessus d'un noir un peu bronzé violacé, assez luisant. Coloration du dessous noire. Pubescence de dessus grise, formant sur les élytres des vagues ondulations transversales. Tête largement et peu profondément excavée, assez avan-

cée. Epistome assez large et chagriné. Le front est marqué d'une ligne longitudinale enfoncée; partie interoculaire du front est en trapèze atténué en avant. Antennes noires et courtes, normales. Prothorax aux angles antérieurs aigus, assez convexe, luisant, couvert, comme la tête de pubescence grise, environ trois fois plus large que long, ayant sa plus grande largeur dans la base, atténué en avant en ligne oblique droite, à bord antérieur très largement et assez profondément échancré en arc presque simple, à lobe médian antérieur indistinct. Sculpture thoracale est composée de mailles très fines et superficielles très peu distinctes. Saillie prosternale étroite, atténuée en avant en ligne droite. Ecusson petit, bronzé. Les élytres sont environ $1\frac{2}{3}$ fois aussi longs, que larges à la base, environ trois fois aussi longs que la tête prothorax réunis, atténués vers l'apex depuis le milieu de la longueur élytrale, ayant la plus grande largeur environ dans les épaules, qui sont un peu élevées. Marge latéropostérieure des élytres inerme. Surface élytrale sans ponctuation plus distincte; élytres subparallèles jusqu' au milieu, luisants et subcoriaces. Carène humérale des élytres nulle. Apex élytral assez étroitement arrondi. Ornementation élytrale est composée de trois vagues bandes transversales grises, peu ou duleuses, grises, espaces entre les bandes élytrales étant couverts d'une pilosité très fine et peu perceptible, grise brunâtre. Hanches postérieures à l'angle latéropostérieur arrondi au sommet. Pattes et palpes noirs.

200. *Trachys* (s. str.) *Dabaltha* n. sp. (Obenb. l. c. p. 90.)

Long.: 2.1, lat.: 1.2 mm. Hab.: Mashonaland.

Taille petite, ovale, assez convexe. Coloration du dessus d'un bronzé assez obscur et luisant, presque noirâtre. Coloration du dessous d'un bronzé obscur. Pubescence élytrale régulière, rare, brunâtre, fine, avec une ornementation argentée sur les élytres. Tête à peine déprimée antérieurement, peu avancée. Yeux obliques. Epistome peu large et chagriné. Le front est marqué d'une ligne médiane enfoncée; partie interoculaire du front est en trapèze assez atténué en avant. Antennes noires, normales, courtes. Prothorax aux angles antérieurs subarrondis. Prothorax environ trois fois plus large que long, ayant sa plus grande largeur dans la base, atténué en avant en ligne légèrement arquée, à bord antérieur faiblement échancré en arc bisinué, à lobe médian antérieur distinct. Bord postérieur légèrement élevé en carène. Sculpture thoracale subeffacée et peu distincte sous la pubescence grise. Saillie prosternale subétranglée au milieu et très atténuée en avant. Ecusson petit, noirâtre. Les élytres sont environ $1\frac{1}{2}$ fois aussi longs, que larges à la base, environ trois fois aussi longs que la tête et le prothorax réunis, atténués vers l'apex depuis le milieu, subparallèles, ayant la plus grande largeur environ dans les épaules, qui sont un peu élevées. Marge latéropostérieure des élytres inerme. Elytres à ponctuation fine, irrégulière, assez dense, mais suboblitérée, légèrement coriacée, sur le fond luisant. Carène humérale des élytres nulle. Apex élytral assez étroitement arrondi. Ornementation élytrale est composée des bandes transversales argentées, vagues et moins distinctes, les espaces entre elles étant couverts de pubescence semblable brunâtre; les points, formant cette pubescence, sont très fines, assez longs et courbés. Hanches postérieures à l'angle latéropostérieur arrondi. Pattes et palpes obscurs.

201. *Trachys* (s. str.) *spectatrix* n. sp. (Obenb. l. c. p. 90.)

Long.: 2.5, lat.: 1.7 mm. Hab.: Congo Belge: Luebo.

Taille allongée, assez peu convexe, subcunéiforme et ovale. Coloration

du dessus d'un noir bronzé, un peu violacé. Coloration du dessous noire. Pubescence du dessus dense, jaunâtre par places sur la tête et le prothorax, avec un dessin onduleux et argenté peu apparant sur les élytres. Tête très profondément excavée antérieurement, large, assez avancée. Epistome assez large et chagriné. Le front est marqué d'une ligne médiane enfoncée; partie interoculaire du front est en trapèze assez atténué en avant. Pilosité de la tête et du prothorax prédominante blanche ou grise, le vertex et la partie antérieure du prothorax à pubescence jaune; cette pubescence est, comme celle des élytres, fine, par trop dense et assez longue. Antennes noires et courtes, normales. Prothorax environ trois fois plus large qu'un long, ayant sa plus grande largeur dans la base, atténué en avant en ligne légèrement arquée, à bord antérieur fortement échancré en arc simple, à lobe median antérieur nul. Bord postérieur du prothorax légèrement et distinctement élevé en carène. Sculpture thoracale est peu distincte sous la pubescence générale. Ecusson petit, noirâtre. Les élytres sont environ $1\frac{2}{3}$ fois aussi longs, que larges à la base, environ trois fois aussi longs que la tête et le prothorax réunis, atténués vers l'apex depuis le milieu, subparallèles antérieurement, ayant la plus grande largeur environ dans les épaules, qui sont assez élevées. Marge latéropostérieure des élytres inerme. Ponctuation élytrale oblitérée, surface subcoriacée et luisante. Carène humérale des élytres nulle. Apex élytral assez largement arrondi. Ornementation élytrale est composée de trois bandes vagues transversales grises, avec quelques espaces à l'apparence glabre, couverts en réalité d'une pubescence peu visible noire. Hanches postérieures à l'angle latéropostérieur arrondi. Pattes et palpes d'un jaune clair. Ongles des tarses et les derniers articles des tarses noirs.

202. *Trachys* (s. str.) *erudita* n. sp. (Obenb. l. c. p. 90.)

Long.: 2.8, lat.: 1.8 mm. Hab.: Natal.

Taille assez robuste, ovulaire, subparallèle au milieu, assez convexe. Coloration du dessus d'un bronzé doré clair et luisant. Coloration du dessous bronzée. Pubescence d'un gris jaunâtre avec une ornementation élytrale onduleuse sur le fond à pilosité brunâtre. Tête vue de dessus, subplane, très large, peu avancée. Epistome large et chagriné. Le front est marqué d'une ligne longitudinale enfoncée; partie interoculaire du front est en trapèze assez atténué en avant. Antennes noires et normales, minces. Un point enfoncé au dessus de chaque cavité antennaire. Prothorax très large, atténué en avant en ligne légèrement arquée, convexe, marge basale étroitement relevée en carène; environ trois fois plus large que long, ayant sa plus grande largeur dans la base, convexe, luisant, à bord antérieur échancré en arc bisinué, à lobe median antérieur distinct et assez large. Sculpture thoracale est composée de mailles arrondies subeffacées et d'une ponctuation fine et éparse. Saillie prosternale assez étroite, atténuée en avant en ligne droite. Ecusson petite, bronzé. Les élytres sont environ $1\frac{2}{3}$ fois aussi longs, que larges à la base, environ trois fois aussi longs que la tête et le prothorax réunis, atténués vers l'apex depuis le milieu, subparallèles antérieurement, ayant la plus grande largeur environ dans les épaules, qui sont un peu élevées. Marge latéropostérieure des élytres inerme. Elytres longs et convexes, très luisants, à ponctuation irrégulière, forte, mais superficielle et peu profonde. Carène humérale des élytres nulle. Apex élytral assez largement arrondi. Ornementation élytrale est composée de trois vagues bandes transversales un peu condensées, parties intermédiaires étant à pubescence d'un jaune brunâtre, pilo-

sité des bandes étant plus condensée que l'autre. Hanches postérieures à l'angle latéropostérieur arrondi au sommet. Pattes et palpes d'un jaune clair. Ongles des tarses et les derniers articles des tarses noirs.

203. *Trachys* (s. str.) *Sternax* n. sp. (Obenb. l. c. p. 91.)

Long.: 2.4, lat.: 1.3 mm. Hab.: Congo belge.

Taille assez trapue, ovulaire, assez convexe. Coloration du dessus d'un bronzé noirâtre et très luisant. Coloration du dessous d'un bronzé obscur et luisant. Pubescence blanche, vague, assez éparse, très fine et assez, irrégulière. Tête vue de dessus subplane, peu avancée. Epistome petit et étroit, chagriné. Le front est marqué d'une ligne médiane enfoncée; partie interoculaire du front est en trapèze assez atténué en avant. Yeux placés très obliquement. Antennes noires, normales. Cavités antennaires simples. Prothorax convexe, aux côtés atténués en ligne presque droite; marge basale légèrement relevée en carène. Prothorax environ $2\frac{3}{4}$ fois plus large que long, ayant sa plus grande largeur dans la base, atténué en avant en ligne légèrement arquée, à bord antérieur échancré en arc bisinué, à lobe median antérieur distincte et large. Bord postérieur très distinctement relevé en carène fine et étroite. Sculpture thoracale est composée de mailles arrondis oblitérées sur le fond luisant. Saillie prosternale élargie au sommet et fortement atténuée en avant en ligne droite. Ecusson petit et noir. Les élytres sont environ $1\frac{2}{3}$ fois aussi longs, que larges à la base, environ trois fois aussi longs que la tête et le prothorax réunis, atténués vers l'apex depuis le milieu, subparallèles antérieurement, ayant la plus grande largeur environ dans les épaules, qui sont un peu convexes. Marge latéropostérieure des élytres inerme. Elytres convexes et luisants, à ponctuation oblitérée et comme effacée. Carène humérale des élytres nulle. Apex élytral assez largement arrondi. Ornementation élytrale est composée de trois vagues bandes transversales et onduleuses, avec les espaces intermédiaires couverts de pubescence jaunâtre; cette pubescence est formée de poils courbés et fins, peu denses, irrégulièrement espacés. Hanches postérieures à l'angle latéropostérieur arrondi au sommet. Pattes et palpes d'un jaune clair. Ongles des tarses et les derniers articles des tarses noirs.

204. *Trachys* (s. str.) *Gilli* n. sp. (Obenb. l. c. p. 91.)

Long.: 4.4, lat.: 2.5 mm. Hab.: Natal.

Taille très grande, ovulaire, robuste, convexe, assez atténuée postérieurement. Coloration du dessus d'un noir légèrement violacé, assez luisant. Coloration du dessous noire. Pilosité de la tête et prothorax rousse, avec quelques macules blanches; elle est formée de points courts et très fins, assez irrégulièrement agglomérée en groupes plus denses et ne couvrant pas entièrement la surface. Pubescence élytrale obscure, avec un dessin argenté, cette de la base élytrale un peu hérissée. Tête très large, excavée largement antérieurement, aux bords oculofrontaux arrondis. Epistome grand, large, transversal, chagriné. Le front est marqué au milieu d'une ligne longitudinale enfoncée; partie interoculaire du front est en trapèze assez atténué en avant; la surface du front est assez densément couverte de pilosité blanche, les points blancs faisant quatre petites macules isolées. Antennes courtes, minces, noires. Prothorax environ $3\frac{1}{2}$ fois plus large que long, ayant sa plus grande largeur dans la base, atténué en avant en ligne presque droite, à bord antérieur très largement et très profondément échancré en arc simple, à lobe median antérieur nul. Sculpture thoracale est indistincte sous la pilosité rousse, qui est

dense et un peu irrégulière; les points blancs sont agglomérés sur le prothorax en 11 petites macules argentées et isolées. Bord postérieur légèrement élevé en carène. Saillie prosternale étroite, atténué en avant en ligne droite. Ecusson petit, noir. Elytres très convexes et très robustes, luisants, assez atténués postérieurement. Les élytres sont environ $1\frac{1}{2}$ fois aussi longs, que larges à la base, environ trois fois aussi longs que la tête et le prothorax réunis, atténués vers l'apex depuis la base, presque subparallèles antérieurement, ayant la plus grande largeur environ dans les épaules, qui sont assez élevées. Marge latéropostérieure des élytres inerme. Les élytres sont fortement déclives vers l'extrémité, couverts de ponctuation assez forte, mais superficielle, sub-effacée sous la pilosité, qui est assez inégale; ils sont assez luisants dans les parties plus glabres. Carène humérale des élytres nulle. Apex élytral assez étroitement arrondi. Ornementation élytrale est composée de trois très étroites bandes argentées et très flexueuses, bordées antérieurement étroitement de pubescence rousse, qui fait encore quelques macules isolées, le fond étant couvert de pubescence fine obscure. Hanches postérieures à l'angle latéro-couvert de pubescence fine obscure. Pattes et palpes d'un roux testacé clair. Ongles des tarses et les derniers articles des tarses noirs.

Observation: Cette espèce et *Tr. crassata* m. qui est encore un peu plus grande, sont les plus grandes et les plus robustes espèces africaines, connues à moi.

205. **Trachys (s. str.) puberula** Fahr. Ins. Cafrar. I, 1851, p. 367.
Hab.: Gariep.

206. **Trachys (s. str.) lembana** Kerr. Rev. Zool. Afr. II, fasc. 1, 1912, p. 12.
Hab.: Congo belge.

207. **Trachys (s. str.) Isabellae** Obenb. Trabajos Mus. Nac. Cienc. Nat. Madrid 1921, Ser. Zool. Núm. 45, p. 15—16.
Hab.: Fernando Poo.

208. **Trachys (s. str.) sebakwensis** n. sp. (Obenb. l. c. p. 92.)

Long.: 2.5, lat.: 1.3 mm. Hab.: Sebakwe.

Taile assez allongée, assez grande, ovale, longitudinale. Coloration du dessus d'un cuivreux violacé assez clair; les élytres avec quelques macules plus bleuâtres et peu distinctes. Coloration du dessous d'un pourpré obscur. Pubescence élytrale formée d'une pubescence obscure, noirâtre, assez longue et vague, avec macules rousses et avec un dessin onduleux argenté. Tête large, à pubescence distincte, largement excavée en avant. Epistome large et chagriné. Le front est à peine excavé en avant; partie interoculaire du front est en trapèze assez fortement atténué en avant. Antennes noires, normales, courtes. Prothorax assez large, assez court, atténué en avant en ligne légèrement arquée, au bord postérieur à peine relevé, environ $3\frac{1}{2}$ fois plus large que long, ayant sa plus grande largeur dans la base, assez luisant et assez convexe, à bord antérieur échancré en arc et simple, à lobe médian antérieur nul. Sculpture thoracale est peu distincte sous la pubescence rousse. Saillie prosternale subparallèle entre les hanches, un peu dilatée antérieurement. Ecusson petit, bronzé. Elytres allongés, étroits et acuminés au sommet, peu convexes et assez peu luisants, environ $1\frac{2}{3}$ fois aussi longs, que larges à la base, environ trois fois aussi longs

que la tête et le prothorax réunis, atténués vers l'apex depuis la base, subparallèles antérieurement, ayant la plus grande largeur environ dans les épaules, qui sont un peu élevées. Marge latéropostérieure des élytres inerme. Carène humérale des élytres nulle. Apex élytral assez étroitement arrondi. Ornementation élytrale est composée de trois bandes flexueuses argentées, transversales sur le fond, couvert d'une pubescence obscure, noirâtre, assez longue et vague, avec fascies et macules diverses, peu nombreuses, rousses. Hanches postérieures à l'angle latéropostérieur subaigu. Pattes et palpes d'un jaune clair. Ongles des tarses et les derniers articles des tarses obscurs.

209. *Trachys* (s. str.) *plausibilis* n. sp. (Obenb. l. c. p. 92.)

Long.: 2.5, lat.: 1.5 mm. Hab.: Transvaal.

Taille large et courte, ovale, assez grande, assez robuste, assez convexe. Coloration du dessus d'un cuivreux violacé assez clair, et assez luisant, sur les élytres quelques vagues parties plus noirâtres. Coloration du dessous d'un bronzé pourpre obscur. Pubescence élytrale combinée, rousse obscure et grise, qui est plus riche que chez *Tr. sebakwensis* Obenb. Tête assez peu large, à peine excavée en avant, peu avancée. Epistome large et transversal, chagriné. Le front est marqué d'une ligne longitudinale enfoncée; partie interoculaire du front est en trapèze assez fortement atténué en avant. Antennes noires, normales, minces. Prothorax court, atténué en avant en ligne droite et oblique, assez convexe, assez luisant. Prothorax environ $3\frac{1}{2}$ fois plus large que long, ayant sa plus grande largeur dans la base, à bord antérieur échancré en arc large et presque simple, à lobe médian antérieur indistinct. Sculpture thoracale est peu distincte sous la pubescence, qui est de majeure partie grise, avec quelques entremêlés poils brunâtres. Saillie prosternale subparallèle entre les hanches, un peu dilatée postérieurement. Ecusson petit, noir. Elytres larges, ovales, peu acuminés, convexes et assez luisants. Les élytres sont environ $1\frac{1}{2}$ fois aussi longs, que larges à la base, environ $2\frac{3}{4}$ fois aussi longs que la tête et le prothorax réunis, atténués vers l'apex depuis le milieu, subparallèles antérieurement, ayant la plus grande largeur environ dans les épaules, qui sont un peu élevées. Marge latéropostérieure des élytres inerme. Ponctuation élytrale fine, irrégulière, superficielle. Carène humérale des élytres nulle. Apex élytral assez étroitement arrondi. Ornementation élytrale est composée de trois bandes flexueuses et transversales argentées sur le fond, couvert de pubescence obscure, peu apparente, mélangée de pilosité grise plus riche. Hanches postérieures à l'angle latéropostérieur subaigu. Pattes et palpes d'un jaune clair. Ongles des tarses et les derniers articles des tarses noirs.

210. *Trachys* (s. str.) *Giubbana* n. sp.

Long.: 2.5, lat.: 1.3 mm. Hab.: Somalia: Giubba.

Taille petite, ovale, assez convexe, assez acuminée postérieurement. Coloration du dessus d'un bronzé cuivreux très luisant et assez clair. Coloration du dessous d'un bronzé un peu plus obscur qu'en dessus. Pubescence de dessus dorée rousse, avec une ornementation élytrale argentée. Tête faiblement, mais distinctement excavée en avant, grande. Epistome large et chagriné. Le front est marqué d'une fine ligne longitudinale enfoncée; partie interoculaire du front est en trapèze, assez fortement atténué en avant. Pubescence de la tête et du prothorax est d'un doré roux, elle est fine, assez longue et pas trop dense, laissant voir le fond luisant, dont la sculpture est peu distincte. Antennes noi-

res, courtes, normales. Prothorax fortement atténué en avant en ligne légèrement arquée, assez large et assez convexe, environ trois fois plus large que long, ayant sa plus grande largeur dans la base, au bord postérieur très légèrement relevé, à bord antérieur très distinctement et profondément échancré en ligne légèrement bisinuée, à lobe médian antérieur faible, mais distinct. Sculpture thoracale est peu distincte sous la pilosité générale. Saillie prosternale subparallèle entre les hanches, subdilataée postérieurement. Ecusson petit, bronzé. Elytres assez longs, subparallèles dans la moitié antérieure, régulièrement convexes, environ $1\frac{3}{5}$ fois aussi longs, que larges à la base, environ trois fois aussi longs que la tête et le prothorax réunis, atténués vers l'apex depuis le milieu, subparallèles antérieurement, ayant la plus grande largeur environ dans les épaules, qui sont assez élevées. Marge latéropostérieure des élytres inerme. Ponctuation élytrale dense, assez forte, mais irrégulière. Carène humérale des élytres nulle. Apex élytral largement arrondi. Ornementation élytrale est composée de trois vagues bandes argentées et onduleuses, sans pubescence noire. Hanches postérieures à l'angle latéropostérieur subaigu. Pattes et palpes d'un jaune clair. Ongles des tarses et les derniers articles des tarses noirs.

211. *Trachys* (s. str.) *Lucia* n. sp. (Obenb. l. c. p. 93.)

Long.: 2.8, lat.: 1.8 mm. Hab.: Fernando Poo.

Taille allongée, ovulaire, assez peu convexe. Coloration du dessus d'un noir à peine bronzé et assez luisant, à pubescence dense. Coloration du dessous d'un noir un peu pourpré; couvert de pilosité fine rousse. Pubescence de la surface très densément couverte d'une pilosité assez longue, rousse, avec un dessin élytral blanc. Tête très grande et très large, assez peu avancée, faiblement excavée. Epistome très large et chagriné, assez court. Le front est marqué d'une ligne longitudinale impressionnée; partie interoculaire du front est en trapèze assez atténué en avant. Antennes noires et courtes, normales. Yeux très obliques. Prothorax fortement et obliquement atténué en avant, assez convexe, au bord postérieur élevé en carène. Prothorax environ $3\frac{1}{2}$ fois plus large que long, ayant sa plus grande largeur dans la base, assez luisant, à bord antérieur très fortement échancré en arc profond et simple, à lobe médian antérieur indistinct. Sculpture thoracale est subeffacée et peu distincte. Saillie prosternale subparallèles entre les hanches, subdilataée postérieurement. Ecusson petit, noir. Elytres convexes, étroits, étroitement atténués et arrondis au sommet, environ $1\frac{2}{3}$ fois aussi longs, que larges à la base, environ trois fois aussi longs que la tête et le prothorax réunis, atténués vers l'apex depuis le milieu, subparallèles antérieurement, ayant la plus grande largeur environ dans les épaules, qui sont assez élevées. Marge latéropostérieure des élytres inerme. Carène humérale des élytres nulle. Apex élytral étroitement arrondi. Ornementation élytrale est composée de fascies transversales, onduleuses, étroites, très flexueuses blanches, sur un fond couvert de pilosité assez longue et rousse. Hanches postérieures à l'angle latéropostérieur subarrondi. Pattes et palpes d'un jaune clair. Ongles des tarses et les derniers articles des tarses noirs.

212. *Trachys* (s. str.) *Xauaria* n. sp. (Obenb. l. c. p. 93.)

Long.: 2.6, lat.: 1.6 mm. Hab.: Natal.

Taille assez convexe, assez robuste, ovulaire, assez peu convexe. Coloration du dessus d'un violacé obscur et luisant, aux reflets bleuâtres. Coloration du dessous noire. Pubescence de dessus assez rare, régulière, fine. Tête assez lar-

ge, mais beaucoup moins large chez *T. Lucia* m., de forme analogue. Epistome grand, très large et chagriné. Le front est marqué d'une ligne médiane impressionnée; partie interoculaire du front est en trapèze assez fortement atténué en avant. Antennes normales, noires, minces. Prothorax atténué en avant en ligne arquée, au bord postérieur très distinctement élevé en carène mince. Prothorax environ $3\frac{1}{2}$ fois plus large que long, ayant sa plus grande largeur dans la base, assez grande et assez convexe, à bord antérieur très fortement échancré en arc profond et simple, à lobe médian antérieur nul. Sculpture thoracale est subéffacée et peu distincte sous la pubescence, dont le fond est très luisant. Saillie prosternale subparallèle entre les hanches, subdilataée postérieurement. Ecusson petit, noir. Élytres assez courts, parallèles antérieurement, avec les épaules assez élevées, environ $1\frac{1}{2}$ fois aussi longs, que larges à la base, environ $2\frac{3}{4}$ fois aussi longs que la tête et le prothorax réunis, atténués vers l'apex depuis le milieu de la longueur élytrale, ayant la plus grande largeur environ dans les épaules. Marge latéropostérieure des élytres inerme. Ponctuation élytrale fine et superficielle, subéffacée, un peu coriacée, en général peu distincte sous la pubescence. Carène humérale des élytres nulle. Apex élytral assez largement arrondi. Ornementation élytrale est composée de fascies transversales onduleuses et assez peu flexueuses, vagues et grises; pilosité étant en général fine et longue, dense et régulièrement couvrant toute la surface élytrale. Hanches postérieures à l'angle latéropostérieur subarrondi. Pattes et palpes d'un jaune clair. Ongles des tarses et les derniers articles des tarses noirs.

213. *Trachys* (s. str.) *Erythraea* n. sp.

Long.: 2.3, lat.: 1.1 mm. Hab.: Erythraea.

Taille ovulaire, petite, assez convexe et assez trapue. Coloration du dessus d'un bronzé luisant, un peu violacé sur les élytres. Coloration du dessous noirâtre et luisante. Pubescence de la tête et du prothorax d'un jaune pale, élytres à pubescence jaune claire, avec un dessin argenté. Tête très large, largement et peu profondément échancrée. Epistome assez large, chagriné. Le front est marqué d'une ligne longitudinale impressionnée; partie interoculaire du front est en trapèze assez atténué en avant. Antennes noires et normales, minces. Prothorax atténué en avant en ligne droite, distinctement un peu plus étroit que les élytres, convexe, environ trois fois plus large que long, ayant sa plus grande largeur dans la base, luisant, à bord antérieur échancré en avant en ligne un peu bisinuée, à lobe médian antérieur distinct. Bord postérieur du prothorax élevé en carène fine. Sculpture thoracale est subéffacée et peu distincte sur le fond luisant. Saillie prosternale subparallèle entre les hanches, subdilataée postérieurement. Ecusson petit, noir. Les élytres sont environ $1\frac{1}{2}$ fois aussi long, que larges à la base, environ $2\frac{1}{4}$ fois aussi longs que la tête et le prothorax réunis, atténués vers l'apex depuis le milieu, subparallèles antérieurement, ayant la plus grande largeur environ dans les épaules, qui sont un peu élevées. Marge latéropostérieure des élytres inerme. Ponctuation élytrale irrégulière, peu dense et fine, espacée, mais subéffacée et peu distincte, superficielle, sur le fond luisant. Carène humérale des élytres nulle. Apex élytral assez largement arrondi. Ornementation élytrale est composée des fascies flexueuses et transversales blanches, formées d'une pilosité un peu plus dense, que la pubescence foncière, qui est d'un jaune clair. Les fascies sont bien distinctes et à pilosité un peu plus dense que celle du fond élytral. Hanches

postérieures à l'angle latéropostérieur subarrondi. Pattes et palpes d'un jaune clair. Ongles des tarses et les derniers articles des tarses noirs.

214. *Trachys* (s. str.) *Pharameïs* n. sp. (Obenb. l. c. p. 93.)

Long.: 2.8, lat.: 1.8 mm. Hab.: Zouloulund.

Taille assez large, assez robuste, subparallèle, mais assez peu convexe. Coloration du dessus d'un noir légèrement violacé, très luisant. Coloration du dessous noire. Pubescence de dessus rousse, fine, courte et éparse, mais très régulière, avec un très vague dessin élytral blanc. Tête profondément excavée, assez peu large, peu avancée. Epistome large et chagriné. Le front est marqué d'une ligne longitudinale impressionnée; partie interoculaire du front est en trapèze assez atténué en avant. Antennes noires, normales. Prothorax très court, atténué en avant en ligne légèrement arquée, au bord postérieur relevé en carène; peu convexe, environ trois fois plus large que long, ayant sa plus grande dans la base, atténué en avant en ligne légèrement arquée, à bord antérieur échancré en ligne nettement bisinuée, à lobe médian antérieur distinct. Sculpture thoracale est composée de mailles arrondies fines, bien distinctes latéralement, mais subéffacées sur le disque. Le fond du prothorax est très luisant. Saillie prosternale subparallèle entre les hanches, très légèrement subdilaté postérieurement. Ecusson petit, bronzé noir. Elytres assez larges, peu convexes, subparallèles jusqu'au milieu, environ $1\frac{2}{3}$ fois aussi longs, que larges à la base, environ trois fois aussi longs que la tête et le prothorax réunis, atténués vers l'apex depuis le milieu de la longueur élytrale, ayant la plus grande largeur environ dans les épaules, qui sont assez élevées. Marge latéropostérieure des élytres inermes. Ponctuation élytrale dense, fine, irrégulière, mais très superficielle, sur le fond très luisant. Carène humérale des élytres nulle. Apex élytral largement arrondi. Ornementation élytrale est composée de quelques traces de vagues et étroites bandes transversales argentées sur le fond, couvert de pubescence rousse, fine, courte, éparse et très régulière. Hanches postérieures à l'angle latéropostérieur subarrondi. Pattes et palpes d'un jaune clair. Ongles des tarses et les derniers articles des tarses noirs.

215. *Trachys* (s. str.) *clathrifera* n. sp. (Obenb. l. c. p. 94.)

Long.: 2.9, lat.: 1.8 mm. Hab.: Congo belge.

Taille assez grande, assez robuste, ovalaire, subparallèle. Coloration du dessus d'un noir un peu bleuâtre ou violacé, luisant. Coloration du dessous d'un bronzé un peu violacé. Pubescence de la tête et du prothorax courte, éparse et rousse, obscure, extrêmement fine, ne couvrant pas le fond. Tête large, assez fortement excavée en avant, peu avancée. Epistome large, chagriné. Le front est marqué d'une fine ligne longitudinale enfoncée; partie interoculaire du front est en trapèze assez atténué en avant. Antennes noires, normales, minces. Prothorax aux angles antérieurs avancées et aigus; marge basale du prothorax un peu relevée en carène; il est trois fois plus large que long, ayant sa plus grande largeur dans la base, atténué en avant en ligne presque droite, à bord antérieur largement échancré en arc très distinctement bisinué, à lobe médian antérieur distinct. Bord postérieur, finement relevé en carène. Sculpture thoracale est subéffacée et peu distincte, surface luisante. Saillie prosternale parallèle et large. Ecusson petit, noir. Elytres subdilates au milieu de la longueur élytrale, assez robustes, peu convexes, environ $1\frac{2}{3}$ fois aussi longs, que larges à la base, environ $2\frac{2}{3}$ fois aussi longs que la tête et le prothorax réunis, atténués vers

l'apex depuis le milieu, suparallèles antérieurement, ayant la plus grande largeur dans le milieu de la longueur. Marge latéropostérieure des élytres inerme. Ponctuation élytrale fine et assez dense, irrégulière, superficielle et subéffacée. Carène humérale des élytres nulle. Apex élytral assez largement arrondi. Ornementation élytrale est composée de vagues et étroites fascies blanches, sur le fond couvert de pubescence noire, très fine et éparse, pubescence rousse sur les élytres étant limitée à la région suturale et à la région posthumérale latérale. Hanches postérieures à l'angle latéropostérieur subarrondi. Pattes et palpes jaunes. Ongles des tarses et les derniers articles des tarses noirs.

216. *Trachys* (s. str.) *meridiana* n. sp. (Obenb. l. c. p. 95.)

Long.: 2.4, lat.: 1.3 mm. Hab.: Africa mer. occ.

Taille courte, ovale et convexe; en ovale assez large. Coloration du dessus d'un bronzé brunâtre et assez obscur, luisant. Coloration du dessous d'un noir bronzé. Pubescence de dessus prédominante argentée, formant sur les élytres des bandes onduleuses et flexueuses. Tête très large, à peine excavée, distinctement pubescente. Epistome étroit et chagriné. Le front est étroit, marqué d'une ligne longitudinale enfoncée; partie interoculaire du front est en trapèze assez atténué en avant. Antennes normales, cavités antennaires rapprochées. Prothorax atténué assez faiblement en avant en ligne très légèrement arquée, assez convexe, environ trois fois plus large que long, ayant sa plus grande largeur dans la base, assez convexe et luisant, à bord antérieur largement et profondément échancré en arc simple, à lobe médian antérieur nul. Sculpture thoracale est composée de mailles arrondies fines, plus distinctes vers les côtés. Bord postérieur du prothorax étroitement relevé en carène. Prosternum à saillie médiane subétranglée entre les hanches, atténuée en avant. Ecusson petit, bronzé. Les élytres sont environ $1\frac{3}{5}$ fois aussi longs, que larges à la base, environ trois fois aussi longs que la tête et le prothorax réunis, atténués vers l'apex depuis la moitié de la longueur élytrale, ayant la plus grande largeur environ dans la base, parallèles dans la moitié antérieure. Marge latéropostérieure des élytres inerme. Ponctuation élytrale très fine, espacée, irrégulière, mais subéffacée et très superficielle, sur le fond luisant. Carène humérale des élytres nulle. Apex élytral assez étroitement arrondi. Ornementation élytrale est composée de trois bandes flexueuses, larges et fines, composées de poils épars, fins et argentés, parties intermédiaires étant couvertes de pubescence brunâtre semblable et de la même densité. Hanches postérieures à l'angle latéropostérieur subaigu. Pattes et palpes d'un noir profond et luisant.

217. *Trachys* (s. str.) *boera* n. sp. (Obenb. l. c. p. 95.)

Long.: 2.4, lat.: 1.4 mm. Hab.: Transvaal.

Taille ovale et allongée, assez parallèle, assez convexe. Coloration du dessus d'un bronzé brun et obscur, assez luisant. Coloration du dessous d'un bronzé obscur, noirâtre. Pilosité de la tête assez dense et irrégulière. Pubescence assez longue et assez dense, d'un brun grisâtre, avec une ornementation jaune pâle sur les élytres. Tête profondément déprimée au milieu, très large, peu avancée. Epistome relativement très large. Le front est marqué d'une ligne longitudinale médiane; partie interoculaire du front est en trapèze fortement atténué en avant. Antennes normales, cavités antennaires assez éloignées. Prothorax assez court, atténué assez faiblement en avant; bord postérieur

distinctement relevé en carène; il est environ $3\frac{1}{3}$ fois plus large que long, ayant sa plus grande largeur dans la base, atténué en avant en ligne presque droite, à bord antérieur largement échancré en arc eimple, à lobe médian antérieur nul. Sculpture thoracale est indistincte, subéffacée sous la pubescence et sur le fond luisant. Saillie médiane du prosternum subétranglée entre les hanches, atténuée en avant. Ecusson petit, noirâtre. Les élytres sont environ $1\frac{2}{3}$ fois aussi longs, que larges à la base, environ $1\frac{2}{3}$ fois aussi longs que la tête et le prothorax réunis, atténués vers l'apex depuis le milieu, subparallèles antérieurement, ayant la plus grande largeur environ dans la base. Marge latéropostérieure des élytres inerme. Ponctuation élytrale forte et irrégulière, mais assez peu enfoncée, distincte. Carène humérale des élytres nulle. Apex élytral assez étroitement arrondi. Ornementation élytrale est composée de trois larges et vagues bandes transversales d'un jaune pâle, les espaces entre elles étant couverts de pilosité d'un brun gris. Hanches postérieures à l'angle latéropostérieur arrondi. Pattes et palpes d'un roux clair. Ongles des tarses et les derniers articles des tarses noirs.

218. *Trachys* (s. str.) *Daphne* n. sp. (Obenb. l. c. p. 95.)

Long.: 2.7, lat.: 1.7 mm. Hab.: Natal.

Taille robuste, assez courte, large, assez peu convexe, assez déclivée en ayant en en arrière. Coloration du dessus d'un noir violacé et très luisant. Coloration du dessous noire. Pubescence de dessus fine, courte, épars, brune roussâtre, avec, sur les élytres, un dessin onduleux argenté. Tête très large, profondément excavée en avant, peu avancée. Epistome étroit et chagriné. Le front est marqué d'une ligne longitudinale enfoncée; partie interoculaire du front est en trapèze assez atténué en avant. Antennes noires et normales, minces. Yeux très obliquement placés. Prothorax orné de trois bandes longitudinales, très étroites, blanches; très large et court, environ $3\frac{1}{2}$ fois plus large que long, ayant sa plus grande largeur dans la base, assez convexe, bien luisant, à bord antérieur largement échancré en arc simple, à lobe médian antérieur nul. Sculpture thoracale est composée de mailles arrondies subéffacées et fines, plus distinctes vers les côtés. Côtés du prothorax fortement atténués en avant en ligne arquée; bord postérieur finement élevé en carène. Ecusson petit, noir. Les élytres sont environ $1\frac{1}{2}$ fois aussi longs, que larges à la base, environ $3\frac{1}{3}$ fois aussi longs que la tête et le prothorax réunis, atténués vers l'apex depuis le milieu de la longueur élytrale, ayant la plus grande largeur environ dans la base, subparallèles antérieurement. Marge latéropostérieure des élytres inerme. Ponctuation élytrale assez dense, assez forte, mais superficielle et irrégulière. Carène humérale des élytres nulle. Apex élytral largement arrondi. Ornementation élytrale est composée de trois bandes blanches étroites et très flexueuses, parties entre les fascies étant à peu près glabres. Les bandes sont bordées de pilosité fine et rousse. Cette pilosité est très fine et courte, ne couvrant pas le fond luisant. Hanches postérieures à l'angle latéropostérieur arrondi. Pattes et palpes d'un roux clair. Ongles des tarses et les articles derniers des tarses noirs.

219. *Trachys* (s. str.) *ukerewensis* n. sp.

Long.: 2.8, lat.: 1.7 mm. Hab.: Ukerewe. (Lgt. P. A. Conrads de la Soc. des Pères Blancs.)

Taille allongée, ovulaire, assez subparallèle. Coloration du dessus d'un cuivré pourpré et luisant, les élytres sont maculés de noir, mais ces macules,

se trouvant surtout sur les espaces à l'apparence plus glabre, ne sont pas trop distinctes. Coloration du dessous d'un pourpre noirâtre. Pubescence générale fine et assez dense, d'un roux doré, avec une ornementation élytrale blanche. Tête très large, légèrement déprimée au milieu. Epistome très large. Le front est marqué d'une ligne fine longitudinale impressionnée; partie interoculaire du front est en trapèze assez atténué en avant. Antennes normales, noires, cavités antennaires distantes. Prothorax atténué en avant en ligne oblique et droite, un peu plus étroit que la base des élytres, convexe, environ $3\frac{1}{2}$ fois plus large que long, ayant sa plus grande largeur dans la base, au bord postérieur élevé en carène fine, à bord antérieur très largement échancré en arc presque régulier, à lobe médian antérieur indistinct. Sculpture thoracale est composée de mailles arrondies, distinctes seulement vers les côtés. Ecusson petit, noirâtre. Elytres à l'apparence bicolore, partie suturale et le fond des fascies étant clair, les espaces intermédiaires étant, par places, beaucoup plus obscurs. Les élytres sont environ $1\frac{2}{3}$ fois aussi longs, que larges à la base, environ $3\frac{1}{3}$ fois aussi longs que la tête et le prothorax réunis, atténués vers l'apex depuis la base, subparallèles antérieurement, ayant la plus grande largeur environ dans les épaules, qui sont un peu élevées. Marge latéropostérieure des élytres inerme. Ponctuation élytrale dense, fine, mais irrégulière et très peu profonde, subéffacée et peu distincte sous la pubescence générale. Carène humérale des élytres nulle. Apex élytral assez étroitement arrondi. Ornementation élytrale est composée de trois bandes très flexueuses et argentées, sur le fond couvert de pubescence d'un roux doré, les espaces entre les bandes transversales étant plus foncées. Hanches postérieures à l'angle latéropostérieur aigu. Ongles des tarses et les derniers articles des tarses noirs.

220. *Trachys* (s. str.) *Lakshmi* n. sp. (Obenb. l. c. p. 95—96.)

Long.: 2.8, lat.: 1.8 mm. Hab.: Angola.

Taille ovalaire, un peu allongée et subacuminée postérieurement, convexe et un peu déclive postérieurement. Coloration du dessus d'un bronzé clair et luisant, uniforme et cuivreux, très luisant. Coloration du dessous bronzé cuivreux un peu plus obscur. Pubescence élytrale rousse, avec un dessin élytral gris jaunâtre. Tête large, légèrement déprimée au milieu, à peine excavée. Epistome large et chagriné. Le front est marqué d'une ligne médiane longitudinale; partie interoculaire du front est en trapèze assez atténué en avant. Antennes noires, normales, courtes. Prothorax régulièrement convexe, atténué en avant en ligne oblique, au bord postérieur élevé en carène fine, environ $3\frac{1}{2}$ fois plus large que long, ayant sa plus grande largeur dans la base, convexe et luisant, à bord antérieur fortement, largement et simplement échancré, à lobe médian antérieur nul. Sculpture thoracale est composée de mailles arrondies fines, bien distinctes même au milieu du disque. Saillie prosternale large et luisante, subparallèle antérieurement, dilatée dans la partie apicale. Ecusson petit, noirâtre. Elytres un peu plus larges que le prothorax, régulièrement convexes; ils sont environ $1\frac{1}{2}$ fois aussi longs, que larges à la base, environ $2\frac{2}{3}$ fois aussi longs que la tête et le prothorax réunis, atténués vers l'apex depuis le milieu, subparallèles antérieurement, ayant la plus grande largeur environ dans les épaules, qui sont un peu élevées. Marge latéropostérieure des élytres inerme. Ponctuation élytrale irrégulière, assez forte, peu dense, avec points entremêlés microscopiques et distincts. Carène humérale des élytres nulle. Apex élytral assez étroitement arrondi. Ornementation élytrale composée de trois fascies transversales et flexueuses jaunes, dont les inter-

est composée de trois fascies transversales et flexueuses jaunes, dont les intervalles sont couverts d'une pubescence rousse. Hanches postérieures à l'angle latéropostérieur aigu. Pattes et palpes d'un noir profond.

221. *Trachys* (s. str.) *zulukaffra* n. sp. (Obenb. l. c. p. 96.)

Long.: $2.13\frac{1}{4}$ 2.8, lat.: $1.11\frac{1}{3}$ 1.4 mm. Hab.: Zouloulouland.

Taille ovulaire, allongée, subparallèle, un peu atténuée postérieurement. Coloration du dessus d'un pourpre doré éclatant, très luisant. Coloration du dessous d'un pourpre cuivreux un peu plus obscur et luisant. Pubescence de dessus fine, brune roussâtre, formant sur les élytres, un dessin onduleux jaune et distinct. Tête très large, légèrement déprimée antérieurement, peu avancée. Epistome assez étroit et chagriné. Le front est marqué d'un sillon longitudinal enfoncée; partie interoculaire du front est en trapèze assez atténué en avant. Antennes noires, courtes, normales. Prothorax largement déprimé transversalement avant la base, avec le bord postérieur distinctement élevé en carène, environ trois fois plus large que long, ayant sa plus grande largeur dans la base, atténué en avant en ligne presque droite, à bord antérieur largement échancré en arc simple, à lobe médian antérieur nul. Sculpture thoracale est composée de mailles fines arrondies peu distinctes sous la pubescence, qui est, comme sur la tête d'un brun roussâtre, avec, dans la lobe scutellaire, une petite macule arrondie de poils jaunes. Saillie prosternale large, subparallèle, luisante, très légèrement subdilataée postérieurement. Ecusson petit, bronzé noir. Les élytres sont environ $1\frac{1}{2}$ fois aussi longs, que larges à la base, environ trois fois aussi longs que la tête et le prothorax réunis, atténués vers l'apex depuis le milieu, subparallèles antérieurement, ayant la plus grande largeur environ dans la base, subparallèles dans la moitié basale. Marge latéropostérieure des élytres inerme. Ponctuation élytrale fine et éparse, subeffacée et superficielle, peu distincte sous la pubescence générale. Carène humérale des élytres nulle. Apex élytral assez étroitement arrondi. Ornementation élytrale est composée de trois bandes flexueuses et étroites, fines, d'un jaune clair un peu doré, dont les intervalles et les espaces intermédiaires sont couverts d'une pubescence rousse et beaucoup plus obscure; pubescence de dessus étant en général composée de poils fins et un peu courbés, assez denses et assez régulièrement espacés, pilosité des bandes transversales étant plus condensée. Hanches postérieures au bord latéropostérieur aigu. Pattes et palpes d'un jaune clair. Ongles des tarses et les articles derniers des tarses noirs.

222. *Trachys* (s. str.) *Marogis* n. sp. (Obenb. l. c. p. 96.)

Long.: 2.2, lat.: 1.1 mm. Hab.: Africa mer. occ.

Taille allongée, convexe, ovulaire, subparallèle. Coloration du dessus d'un bronzé un peu verdâtre, assez obscur et luisant. Coloration du dessous d'un bronzé obscur et luisant. Pubescence d'un roux clair, assez dense et longue, avec une ornementation élytrale jaune pâle. Tête large, légèrement déprimée au milieu, peu avancée. Epistome assez large et chagriné. Le front est marqué d'une ligne médiane enfoncée; partie interoculaire du front est en trapèze assez atténué en avant. Antennes noires, courtes, normales. Prothorax large, convexe, déprimé largement et transversalement avant la base, qui est distinctement élevée en carène fine et étroite, environ $3\frac{1}{3}$ fois plus large que long, ayant sa plus grande largeur dans la base, atténué en avant en ligne presque droite, à bord antérieur échancré en ligne nettement bisinué, à lobe médian antérieur

distinct. Sculpture thoracale est composée de mailles arrondies fines, peu distinctes sous la pilosité générale, qui est, comme sur la tête, d'un jaune pâle avec quelques poils entremêlés roussâtres. Saillie prosternale subparallèle antérieurement, assez large, distinctement élargie postérieurement. Ecusson petit noir. Elytres assez longs et assez convexes, à pubescence assez régulière, environ $1\frac{2}{3}$ fois aussi longs, que larges à la base, environ trois fois aussi longs que la tête et le prothorax réunis, atténués vers l'apex depuis la base, subparallèles antérieurement, ayant la plus grande largeur environ dans les épaules, qui sont un peu élevées. Marge latéropostérieure des élytres inerme. Ponctuation élytrale irrégulière, fine et superficielle, subéffacée sous la pilosité générale, qui est formée de poils fins arqués. Carène humérale des élytres nulle. Apex élytral assez largement arrondi. Ornementation élytrale est composée de trois bandes transversales et flexueuses assez denses, d'un jaune pâle, les intervalles étant couverts de pubescence rousse, plus courte. Hanches postérieures à l'angle latéropostérieur aigu. Pattes et palpes d'un roux clair. Ongles des tarses et les derniers articles des tarses noirs.

223. *Trachys* (s. str.) *natalica* n. sp. (Obenb. l. c. p. 96.)

Long.: 2.8, lat.: 1.5 mm. Hab.: Natal: Port Natal.

Taille ovale, allongée, subparallèle, assez acuminée postérieurement, assez convexe. Coloration du dessus d'un bronzé cuivreux obscur, un peu violacé et pourpré; luisant. Partie antérieure du front d'un bronzé doré un peu verdâtre. Coloration du dessous d'un cuivreux assez obscur et luisant. Pubescence de dessus rousse, fine, éparsée et longue, avec une ornementation élytrale jaune pâle. Tête très large, déprimée longitudinalement au milieu. Epistome assez étroit et chagriné. Le front est marqué d'une ligne fine longitudinale enfoncée; partie interoculaire du front est en trapèze assez atténué en avant. Antennes obscures, normales, minces. Prothorax très large, faiblement obliquement atténué en avant en ligne droite, convexe, luisant, environ trois fois plus large que long, ayant sa plus grande largeur dans la base, à bord antérieur échancré en arc simple. Sculpture thoracale est composée de mailles arrondies fines et peu distinctes. Saillie prosternale large, plane, subparallèle, un peu dilatée postérieurement. Ecusson petit, obscur. Elytres à sculpture grossière, mais peu dense, formée de points fovéolés, disposés subsérielement. Les élytres sont environ $1\frac{2}{3}$ fois aussi longs, que larges à la base, environ trois fois aussi longs que la tête et le prothorax réunis, atténués vers l'apex depuis le milieu, parallèles antérieurement, ayant la plus grande largeur environ dans la base, subparallèles jusqu'au milieu. Marge latéropostérieure des élytres inerme. Carène humérale des élytres nulle. Apex élytral étroitement arrondi. Ornementation élytrale est composée de trois bandes transversales et flexueuses d'un jaune pâle sur le fond, couvert de pilosité rousse. Hanches postérieures à l'angle latéropostérieur arrondi. Pattes et palpes d'un jaune clair. Ongles des tarses et les derniers articles des tarses noirs.

224. *Trachys* (s. str.) *Lena* n. sp. (Obenb. l. c. p. 96.)

Long.: 2.7, lat.: 1.4 mm. Hab.: Africa or. port.

Taille ovale, allongée, assez convexe. Coloration du dessus d'un bronzé luisant cuivreux, élytres d'un bronzé plus violacé et plus obscur. Assez luisant. Coloration du dessous d'un bronzé un peu plus obscur qu'en dessus, luisant. Pubescence élytrale d'un noir gris avec un dessin jaune clair sur les élytres,

celle de la tête et du prothorax d'un jaune roussâtre. Tête large, largement et peu profondément excavée antérieurement. Epistome large et chagriné. Le front est marqué d'un fin sillon linéaire longitudinal; partie interoculaire du front est en trapèze assez atténué en avant. Antennes obscures, normales, minces. Prothorax environ trois fois plus large que long, ayant sa plus grande largeur dans la base, atténué en avant en ligne légèrement arquée, à bord antérieur largement échancré en arc subbisiné, à lobe médian antérieur assez distinct, mais peu avancée, au bord postérieur distinctement en carène fine. Sculpture thoracale est composée de mailles arrondies et fines, superficielles, distinctes même au milieu du disque. Saillie prosternale large, deux fois plus longue que large, parallèle, nullement dilatée au sommet. Ecusson petit, noirâtre. Les élytres sont environ $1\frac{3}{4}$ fois aussi longs, que larges à la base, environ $3\frac{1}{2}$ fois aussi longs que la tête et le prothorax réunis, atténués vers l'apex depuis le milieu, subparallèles antérieurement, ayant la plus grande largeur environ dans les épaules, qui sont un peu élevées. Marge latéropostérieure des élytres inerme. Ponctuation élytrale fovéolée, irrégulière, mais très superficielle et subéffacée, peu distincte sous la pilosité générale, qui est fine et courte, assez régulière. Carène humérale des élytres nulle. Apex élytral assez étroitement arrondi. Ornementation élytrale est composée de deux bandes transversales et flexueuses préapicales et d'une macule subsuturale, placée antérieurement, formées de pubescence jaune sur le fond, couvert de pilosité d'un noir grisâtre. Hanches postérieures à l'angle latéropostérieur subaigu. Pattes et palpes d'un roux clair. Ongles des tarses et les derniers articles des tarses noirs.

225. *Trachys* (s. str.) *Taxilla* n. sp. (Obenb. l. c. p. 97.)

Long.: 2.5, lat.: 1.5 mm. Hab.: Haute Uélé: Moto.

Taille allongée, ovulaire, subparallèle, assez convexe. Coloration du dessus d'un bronzé brun et obscur et assez luisant. Coloration du dessous d'un bronzé noir assez luisant. Pubescence de la tête et du prothorax d'un ocré grisâtre, celle des élytres noire ou grisâtre, avec un dessin clair. Tête assez peu large, largement et peu profondément excavée en avant. Epistome large et chagriné. Le front est marqué un sillon longitudinal fin et enfoncé; partie interoculaire du front est en trapèze assez atténué en avant. Antennes noires, normales, minces. Yeux obliques, bords oculofrontaux légèrement subcarénés. Prothorax à pubescence jaunâtre, un peu plus condensée en trois très vagues lignes longitudinales. Prothorax environ $3\frac{1}{2}$ fois plus large que long, ayant sa plus grande largeur dans la base, atténué en avant en ligne droite, à bord antérieur échancré en arc profond et simple, à lobe médian antérieur nul. Bord postérieur légèrement élevé en carène fine et mince. Sculpture thoracale est composée de mailles fines arrondies, peu distinctes. Saillie prosternale étroite, trois fois plus longue que large, parallèle antérieurement et dilatée vers le sommet. Ecusson petit, noirâtre. Les élytres sont environ $1\frac{2}{3}$ fois aussi longs, que larges à la base, environ trois fois aussi longs que la tête et le prothorax réunis, atténués vers l'apex depuis le milieu, subparallèles antérieurement, ayant la plus grande largeur environ dans les épaules, qui sont assez élevées. Marge latéropostérieure des élytres inerme. Ponctuation élytrale irrégulière, superficielle et subéffacée. Carène humérale des élytres nulle. Apex élytral assez étroitement arrondi. Ornementation élytrale est composée de trois assez vagues bandes flexueuses et transversales d'un jaune ocré grisâtre, sur le fond, qui, dans les espaces intermédiaires entre les fascies est couvert de pilosité noire

ou grisâtre, plus courte et moins apparente. Hanches postérieures à l'angle latéropostérieur subarrondi. Pattes et palpes obscurs, noirâtres. Ongles des tarses et les derniers articles des tarses noirs.

Observation: Un type de cette espèce se trouve dans la collection du Musée de Congo belge, l'autre dans la mienne.

226. *Trachys* (s. str.) *Cassiae* n. sp. (Obenb. l. c. p. 97.)

Long.: 3, lat.: 1.9 mm. Hab.: Mastronaland. Transvaal: Zoutpansberg — Thakoma.

Taille assez large, assez grande, en ovale assez large et robuste, trapue. Coloration du dessus d'un noir profond et assez luisant. Coloration du dessous noire. Pubescence de la tête et du prothorax subuniforme, jaune, élytres à pubescence noire avec un dessin argenté et avec une macule ou bordure scutellaire jaune. Tête largement creusée au milieu, assez peu avancée antérieurement. Epistome large et transversal, chagriné. Le front est marqué d'une ligne longitudinale enfoncée; partie interoculaire du front est en trapèze assez atténué en ayant. Antennes noires, courtes, normales. Prothorax environ $3\frac{1}{2}$ fois plus large que long, ayant sa plus grande largeur dans la base, atténué en avant en ligne presque droite, à bord antérieur largement et profondément échancré en arc simple, à lobe médian antérieur nul. Bord postérieur du prothorax distinctement relevé en carène fine. Sculpture thoracale est composée de mailles fines arrondies, très peu distinctes sous la pubescence du fond. Saillie prosternale large et subparallèle. Ecusson petit, noir. Les élytres sont environ $1\frac{3}{4}$ fois aussi longs, que larges à la base, environ trois fois aussi longs que la tête et le prothorax réunis, atténués vers l'apex depuis le milieu, subparallèles antérieurement, ayant la plus grande largeur environ dans les épaules, qui sont assez élevées. Marge latéropostérieure des élytres inerte. Les élytres sont assez peu convexes, trapus, à ponctuation irrégulière et assez fine, mais subéffacée et superficielle, peu distincte sous la pilosité générale, qui est fine et dense, assez régulière. Carène humérale des élytres nulle. Apex élytral largement arrondi. Ornementation élytrale est composée des bandes flexueuses argentées sur le fond à pilosité noire; partie suturale antérieure et scutellaire à pubescence dorée ou jaune, faisant une macule suturale plus ou moins développée ou une bordure oblique jaune en forme d'un »V« autour de la partie scutellaire des élytres. Hanches postérieures à l'angle latéropostérieur subarrondi. Pattes et palpes d'un brun ocré et obscur. Ongles des tarses et les derniers articles des tarses noirs.

227. *Trachys* (s. str.) *Garua* n. sp. (Obenb. l. c. p. 97.)

Long.: 3, lat.: 1.8 mm. Hab.: Ukerewe. (Eichelbaum.)

Taille assez étroite, peu large, ovulaire, assez robuste, allongée. Coloration du dessus d'un noir profond et luisant. Coloration de dessous noire. Pubescence de la tête et du prothorax subuniforme et jaune, les élytres avec une ornementation flexueuse et transversale argentée, avec la partie suturale antérieure bordée de jaune. Tête grande, large, largement creusée en avant, assez avancée antérieurement. Epistome large et chagriné. Le front est marqué d'une ligne fine longitudinale enfoncée; partie interoculaire du front est en trapèze assez atténué en avant. Antennes noires, normales. Prothorax environ quatre fois plus large que long, ayant sa plus grande largeur dans la base, assez faiblement atténué en avant en ligne droite, à bord antérieur très largement et

profondément échancré en arc simple à lobe median antérieur nul. Angles antérieurs très aigus et avancés. Bord postérieur très distinctement élevé en carène fine. Sculpture thoracale est peu distincte sous la pilosité générale. Saillie prosternale large et subparallèle. Ecusson petit, noir. Les élytres sont environ $1\frac{2}{3}$ fois aussi longs, que larges à la base, environ trois fois aussi longs que la tête et le prothorax réunis, atténués vers l'apex depuis le milieu, subparallèles antérieurement, ayant la plus grande largeur environ dans les épaules, qui sont assez élevées. Marge latéropostérieure des élytres inerme. Carène humérale des élytres nulle. Apex élytral assez étroitement arrondi. Ornementation élytrale est composée des bandes flexueuses argentées sur le fond, couvert de pubescence noire, partie suturale antérieure et scutellaire à pubescence dorée ou jaune faisant une macule suturale plus ou moins développée ou plutôt une bordure suturale, prolongée en ligne suturale et mince postérieurement et distincte jusqu'au milieu de la longueur élytrale. Hanches postérieures à l'angle latéropostérieur subaigu. Pattes et palpes d'un jaune roux très clair. Ongles des tarses et les derniers articles des tarses noirs.

228. *Trachys* (s. str.) *Agatha* n. sp.

Long.: 2.2, lat.: 1.2 mm. Hab.: Ukerewe (Eichelbaum).

Taille petite, assez trapue et robuste, assez convexe. Coloration du dessus d'un noir bronzé et légèrement violacé et luisant. Coloration du dessous noire. Tête et prothorax à pubescence rousse brunâtre, avec quelques poils argentés, celle des élytres à dessin spécial. Pubescence du dessus très fine, assez courte, mais assez dense, tricolore. Tête très large, largement excavée, assez avancée. Epistome assez étroit et chagriné. Le front est marqué d'une ligne médiane enfoncée; partie interoculaire du front est en trapèze assez atténué en avant. Antennes noires, minces, courtes. Prothorax aux angles antérieurs aigus et avancés; pubescence argentée formant trois vagues bandes longitudinales, environ $3\frac{1}{3}$ fois plus large que long, ayant sa plus grande largeur dans la base, atténué en avant en ligne oblique et droite, à bord antérieur largement échancré en arc simple, à lobe médian antérieur nul. Bord postérieur légèrement élevé en carène. Angles antérieurs assez aigus et assez avancés. Sculpture thoracale est indistincte sous la pilosité. Saillie prosternale subparallèle et étroite. Ecusson petit, noir. Elytres allongés, peu convexes, assez luisants, subparallèles et trapus, environ fois aussi longs, que larges à la base, environ $1\frac{2}{3}$ fois aussi longs que la tête et le prothorax réunis, atténués vers l'apex depuis le milieu, subparallèles antérieurement, ayant la plus grande largeur environ les épaules, qui sont assez élevées. Marge latéropostérieure des élytres inerme. Carène humérale des élytres nulle. Apex élytral assez largement arrondi. Ornementation élytrale est composée de trois étroites bandes argentées et à partie basale scutellaire à pubescence dorée, le fond étant couvert, sur la surface élytrale, de pubescence grise. Hanches postérieures à l'angle latéropostérieur arrondi. Pattes et palpes d'un roux jaune et très clair. Ongles des tarses et les derniers articles noirs.

229. *Trachys* (s. str.) *fidens* Kerr. in Wytsman, Genera Ins. fasc. XII, 1903, p. 310.

Hab.: Afr. or. angl.

230. *Trachys* (s. str.) *occisa* Kerr. in Wytsman, Genera Ins. fasc. XII, 1903, 310.

Hab.: Afr. or. angl.

231. *Trachys* (s. str.) *Althasia* n. sp.

Long.: 3, lat.: 1.9 mm. Hab.: Natal.

Taille assez robuste et assez peu allongée. Coloration du dessus d'un noir profond et luisant. Coloration du dessous noire et luisante. Pubescence élytrale blanche, celle de la tête et du prothorax très dense et jaune. Tête très large, largement excavée antérieurement. Yeux obliques. Epistome large et chagriné. Le front est marqué d'une ligne longitudinale enfoncée; partie interoculaire du front est en trapèze, atténué en avant. Antennes noires, minces, normales. Prothorax atténué en avant en ligne arquée, large, convexe, luisant, environ $3\frac{1}{2}$ fois plus large que long, ayant sa plus grande largeur dans la base, à bord antérieur très profondément échancré en arc simple, à lobe médian antérieur nul. Bord postérieur élevé en carène fine. Sculpture thoracale est composée de mailles fines arrondies assez distinctes. Saillie prosternale large et subparallèle entre les hanches, stries latérales parallèles. Ecusson petit, noir. Elytres sans pubescence jaune le long de la suture antérieure, au calus huméral peu saillant. Les élytres sont environ $1\frac{3}{5}$ fois aussi longs, que larges à la base, environ trois fois aussi longs que la tête et le prothorax réunis, atténués vers l'apex depuis, le milieu, subparallèles antérieurement, ayant la plus grande largeur environ dans les épaules, qui sont élevées. Marge latéropostérieure des élytres inerre. Ponctuation élytrale irrégulière, assez forte, peu dense, superficielle. Carène humérale des élytres nulle. Apex élytral assez largement arrondi. Ornementation élytrale est composée de trois vagues bandes transversales, flexueuses et argentées. Hanches postérieures à l'angle latéropostérieur arrondi. Pattes et palpes d'un jaune ocré assez obscur. Ongle des tarses et les derniers articles des tarses noirs.

232. *Trachys* (s. str.) *cheteniensis* Obenb. Sborník Ent. Odd. Nár. Mus. Praha, VI, 49, 1928, p. 20, fig. 3.

Hab.: Afr. or. angl.

233. *Trachys* (s. str.) *ugandica* n. sp. (Obenb. l. c. p. 98.)

Long.: 2.8, lat.: 1.3 mm. Hab.: Uganda.

Taille allongée, ovale, assez robuste, subparallèle. Coloration du dessus bicolore: tête et prothorax d'un noir violacé, élytres d'un noir bleuâtre, luisant. Coloration du dessous noire. Pubescence de la tête et du prothorax jaunâtre et fine, celle des élytres peu perceptible et grise. Tête largement excavée, assez avancée, bords oculofrontaux subcarénés. Epistome large et chagriné. Le front est marqué d'une ligne longitudinale enfoncée; partie interoculaire du front est en trapèze atténué en avant. Antennes noires, minces, fine et normales. Prothorax environ $3\frac{1}{2}$ fois plus large que long, ayant sa plus grande largeur dans la base, atténué en avant en ligne arquée, à bord antérieur échancré en ligne bisinuée, à lobe médian antérieur peu distinct. Bord basal fortement élevé en carène. Sculpture thoracale est composée de mailles fines arrondies et ombiliquées, assez distinctes sous la pubescence générale. Saillie prosternale large et subparallèle entre les hanches, stries latérales parallèles. Ecusson petit, noir. Les élytres sont environ $1\frac{2}{3}$ fois aussi longs, que larges à la base, environ $3\frac{1}{3}$ fois aussi longs que la tête et le prothorax réunis, atténués vers l'apex depuis le milieu de la longueur élytrale, ayant la plus grande largeur environ dans la base, parallèles jusqu'au milieu. Marge latéropostérieure des élytres inerre. Calus huméral peu saillant. Ponctuation élytrale dense, très

fine, irrégulière et subéffacée. Carène humérale des élytres nulle. Apex élytral assez largement arrondi. Ornementation élytrale est composée de trois vagues bandes transversales argentées, très peu denses. Hanches postérieures à l'angle latéropostérieur aigu. Pattes et palpes d'un roux clair. Ongles des tarses et les derniers articles des tarses noirs.

234. *Trachys* (s. str.) *marineanana* Obenb. Časopis Čsl. Spol. Ent. XXVII, 1930, p. 117—118.

Hab.: Cameroun.

235. *Trachys* (s. str.) *pulla* n. sp. (Obenb. l. c. p. 99.)

Long.: 2.7, lat.: 1.5 mm. Hab.: Cameroun: Duala (Alois David lgt.).

Taille petite et étroite, subcunéiforme, assez peu convexe, ovalaire. Coloration du dessus d'un noir un peu violacé sur les élytres, un peu plus bronzé sur la tête et prothorax. Luisant. Coloration du dessous noire. Pubescence de la tête et du prothorax fine et régulière, juune rousse, celle des élytres noire avec un dessin argenté. Tête largement excavée, assez grande, assez avancée. Epistome assez étroit et chagriné. Le front est marqué d'une ligne longitudinale enfoncée; partie interoculaire du front est en trapèze assez fortement atténué en avant. Pilosité de la tête uniforme, jaune, très régulière. Antennes normales, minces, noires. Prothorax avec une vague ligne blanche et longitudinale au milieu, luisant, assez convexe, environ $3\frac{1}{2}$ fois plus large que long, ayant sa plus grande largeur dans la base, atténué en avant en ligne légèrement arquée, à bord antérieur largement et profondément échancré en arc presque simple, à lobe médian antérieur indistinct. Bord postérieur élevé en carène. Sculpture thoracale est composée de mailles fines et guilières arrondies, bien distinctes sur le fond luisant. Saillie prosternale fortement étranglée entre les hanches, stries latérales étant parfois peu distinctes. Ecusson petit, noir. Elytres un peu plus larges que le prothorax, assez convexes et luisants, environ $1\frac{1}{2}$ fois aussi longs, que larges à la base, environ trois fois aussi longs que la tête et le prothorax réunis, atténués vers l'apex depuis le milieu de la longueur élytrale, ayant la plus grande largeur environ dans la base, parallèles jusqu'au milieu. Marge latéropostérieure des élytres inerme. Les épaules sont assez fortement élevées. Ponctuation élytrale fine, superficielle, irrégulière, peu distincte sous la pilosité. Carène humérale des élytres nulle. Apex élytral assez largement arrondi. Ornementation élytrale est composée de trois bandes flexueuses et peu condensées, argentées sur le fond, couvert de pilosité noire, suture élytrale étant, depuis la base jusqu'au milieu, bordée unisérialement de poils roussâtres. Hanches postérieures à l'angle latéropostérieur arrondi. Pattes noirs, lamelles des tarses et palpes brunâtres.

236. *Trachys* (s. str.) *Sjoestedti* Kerr. in Sjoestedt, Kilimandjaro—Meru Exp. 7, Col. 3, Bupr. 1905—1906, p. 28—29.

Hab.: Kilimandjaro.

237. *Trachys* (s. str.) *Alberti* Kerr. Revue Zool. Afr. II, fasc. 1, 1912, p. 15.

Hab.: Congo belge.

238. **Trachys (s. str.) Schultzei** Kerr. Ann. Soc. Ent. Belg. XLXI, 1907, p. 217—218.

Hab.: Afrique or.

239. **Trachys (s. str.) Folognei** Kerr. Revue Zool. Afric. II, fasc. 1, 1912, p. 14.

Hab.: Congo belge.

240. **Trachys (s. str.) Schoutedeni** Kerr. Revue Zool. Afric. II, fasc. 1, 1912, p. 12.

Hab.: Congo belge.

241. **Trachys (s. str.) zanzibarica** Kerr. Ann. Soc. Ent. Belg. XL, 1896, p. 314.

Hab.: Zanzibar.

Specie incertae sedis:

242. **Trachys (s. str.) Duvivieri** Kerr. Mém. Soc. Ent. Belg. I, 1892, p. 285.

Hab.: Congo belge.

243. **Trachys (s. str.) senegalensis** Gory, Monogr. Bupr. IV, Suppl. 1841, p. 351, T. 60, fig. 350.

Hab. Senegal.

244. **Trachys (s. str.) torrida** J. Thoms. Typi Bupr. Thomson, App. I A, 1879, p. 77.

Hab.: Benguela.

245. **Trachys (s. str.) juvenilis** Kerr. in Wytsman, Genera Ins fasc. XII, 1903, p. 310.

Hab.: Afr. or. angl.