

Doc. Dr. Jan Obenberger, Praha:

NOVÉ EXOTICKÉ DRUHY RODU AGRILUS SOL. Z AFRIKY (COL. BUPR.)

DE AFRICAE NOVIS GENERIS AGRILI SOL. SPECIEBUS EXOTICIS (COL. BUPR.)

V této práci podávám několik diagnos nových druhů kraseů z rodu *Agrilus* z tropické Afriky. Veškeré druhy tohoto rodu, jichž je známo několik tisíc, vyskytují se v teplých polohách po celém světě. Jich larvy žijí v rozmanitých dřevinách a dřevitých bylinách, dospělá zvířata sbírají se na padlém dříví nebo na listech rozmanitých stromů a keřů. Africká fauna Agrilů je velmi bohatá na četné překrásné druhy, ale veškeré její druhové bohatství ani zde nebude ještě dlouho vyčerpáno.

*

1. *Agrilus pseudocuspidatus* n. sp.

Long.: 3.5, lat.: 1.2 mm. Hab.: Ukerewe, P. A. Conrads lgt.

Corporis forma satis parallela, postice acuminata. Aspectu modice nitido. Colore corporis supra obscure griseocupreo. Corpore subtus satis nitido, eodem modo uti supra colorato. Pubescentia corporis aequali, nullo modo condensata, grisea, brevissima, parum densa. Capite satis globoso, convexo, vertice lato, subtilissime sparse punctato et strigoso. Fronte cuprea, glabra, nitida, subtiliter punctata, parte interoculari frontis latitudine paullo longiori, lateribus fere rectis, subparallelis. Antennis ab articulo 4^o serratis, brevibus, cupreis, compactis. Antennarum articulo tertio illo quarto haud brevior. Thorace longitudine circiter 1½ latiori, summum latitudinis in medio longitudinis attingente, margine anteriori fere recte truncato, disco aequaliter convexo, ante scutellum et oblique versus latera leviter depresso, subtiliter dense punctato et strigoso rugoso, in parte basali subparallelo, antice leviter rotundato. Carina prae humerali nulla. Carina laterali (marginali) recta, ab illa laterali antice satis fortiter divergente. Carina submarginali recta, cum illa basali in angulis basalibus iuncta. Scutello transverse carinato, magno, convexo, cupreo. Elytris latitudine baseos circiter 3⅔ longioribus, thorace capiteque unitis circiter 2¾ longioribus, a basi usque post medium subparallelis, dein versus apicem longe attenuatis, summum latitudinis circiter in parte postmedianam attingentibus, satis nitidis, satis remote squamuloso rugosis, sculptura valde aequali. Carina longitudinali costiformi elytrorum nulla. Carina humerali elytrali absente. Apice elytrorum anguste separatim (fere conjunctim) rotundato. Margine lateroapicali microscopice denticulato. Ornamento elytrorum nullo. Elytris aequaliter griseopilosis. Gulari lobo rotundato. Processu prosternali angusto, subparallelo, apice angustato. Corpore subtus valde nitido. Abdomine convexo, immaculato. Carina laterali segmentorum 1. et 2. basalium unitorum nullo modo sinuata. Parte laterodorsali detecta satis lata, desuper visibili. Sterniti basalis maris medio integro. Sterniti anali medio insignato, normali, apice rotundato. Pedibus brevibus, gracilibus, cupresentibus. Tarsorum posteriorum articulo basali illos fere tres articulos sequentes longitudine adaequante. Tarsorum unguiculis simpliciter dentatis.

Observatio: In gregem *A. cuspidati* Fahr. pertinens. Ab illo iam fronte magis angustiore, thorace antice magis angustato, lobo gulari rotundato etc. diversus.

2. *Agrilus Charaxes* n. sp.

Long.: 3.8—4.3, lat.: 0.8—1.2 mm. Hab.: Transvaal: Hartebeest Dam. 2. XI. 1938. Dr. Baum lgt.

Corporis forma elongata, gracili. Aspectu satis nitido. Colore corporis supra nigroaeneo, valde nitido, obscuro. Corpore subtus satis nitido, eodem modo uti superficie colorato. Pubescentia corporis, valde vaga et inconspicua, in elytris ornamentum parum conspicuum efficiente. Capite convexo, haud impresso, vertice lato, convexo. Fronte in mare aureocuprea, in femina obscura, transversa rugosa, satis plana, parte interoculari frontis latitudine $1\frac{1}{4}$ longiori, lateribus rectis et parallelis, superficie glabra. Antennis ab articulo 4^o serratis, satis gracilibus, obscuris. Antennarum articulo tertio et quarto longitudine subaequalibus. Thorace longitudine circiter $1\frac{1}{3}$ latiori, summum latitudinis in tertia parte anteriori attingente, margine anteriori bisinuato, lobo lato medio distincto, disco antice et postice leviter foveolatim depresso. Thoracis sculptura e rugis subobliquis densis (supra punctis impressis notatis) composita. Thoracis lateribus arcuatis, versus basim modice sinuatim attenuatis, angulis basalibus rectis. Carina praehumerali brevi, elevata, leviter convexa. Lateribus thoracis versus anticem oblique subdepressis. Carina laterali (marginali) recta, antice leviter deflexe arcuata. Carina submarginali fere recta, ab illa laterali antice satis divergente, ambobus in angulis posticis iunctis. Scutello transverse carinato. Elytris latitudine circiter $3\frac{1}{2}$ longioribus, thorace capiteque unitis circiter $3\frac{1}{2}$ longioribus, a basi usque medium parallelis, ibidem subdilatis, dein versus apicem longe attenuatis, summum latitudinis circiter in parte media longitudinis attingentibus, satis fortiter nitidis, thorace paullulo obscurioribus, satis dense, valde aequaliter squamuloso rugosis, sutura postice leviter elevata. Carina longitudinali costiformi elytrorum nulla. Carina humerali elytrali absente. Apice elytrorum utrimque anguste, subangulatim rotundato. Margine lateroapicali distincte denticulato. Ornamento elytrorum e fascia suturali angusta, post medium subinterrupta, grisea, valde vaga et parum conspicua composito. Gulari lobo distincte sinuato. Processu prosternali subparallelo, apice acuminato. Corpore subtus nitido. Abdomine immaculato. Carina laterali segmentorum 1. et 2. basalium unitorum nullo modo sinuata. Parte laterodorsali abdominis detecta angustissima. Sterniti basalis maris medio innotato. Sternito anali medio integro, normali, apice rotundato. Pedibus gracilibus, satis longis, obscure aeneis. Tarsorum posteriorum articulo basali illos duo articulos sequentes longitudine adaequante. Tarsorum unguiculis simpliciter dentatis.

Observatio: In gregem *A. cuspidati* Fahr. pertinens.

3. *Agrilus giubbicola* n. sp.

Long.: 3.2, lat.: 0.9 mm. Hab.: Somalia italiana: Giubba.

Corporis forma cylindracea, convexa, elongata. Aspectu satis nitido. Colore corporis supra griseocupreo, saavis sericeo. Corpore subtus griseocupreo, nitido, sparse albopiloso. Pubescentia corporis supra brevi, sparsa, aequali, argentea. Capite satis lato, robusto, convexo, oculis haud prominulis. Vertice

valde lato, punctato, striis nullis. Fronte lata, plane convexa, alutacea viridiaescente, subtiliter punctata, antice distinctis albo pilosa, parte interoculari frontis latitudine haud longiori, lateribus fere parallelis, rectis. Antennis ab articulo 4^o serratis, aeneis, satis compactis, satis fortibus. Antennarum articulo tertio illo quarto paullo brevior. Thorace longitudine circiter $1\frac{1}{3}$ latiori, summum latitudinis in tertia parte anteriori attingente, margine anteriori leviter bisinuato, lobo medio parum distincto, disco aequaliter convexo, postice leviter subdepresso; thoracis sculptura satis subtili, haud densa, regulari, striata. Lateribus thoracis leviter sinuatis et rotundatis, versus anticem et basim solum leviter attenuatis, angulis posticis obtuse rotundatis. Carina prae-humerali parum convexa, longe arcuata. Carina laterali (marginali) postice longe recta, dein antice arcuatim deflexa. Carina submarginali ab illa laterali antice valde divergente, recta, postice cum ea iuncta. Scutello, lato, transverse carinato, brevi, nitido. Elytris latitudine baseos circiter triplo longioribus, thoraceque capiteque unitis circiter $2\frac{1}{2}$ longioribus, a basi versus medium sinuatim subdilatatis, versus apicem longe arcuatim attenuatis, summum latitudinis circiter in parte media longitudinis attingentibus, modice nitidis, satis sparse, sed aequaliter squamosorugosis, rugis transversis praecipue antice distinctioribus. Carina longitudinali costiformi elytrorum nulla. Carina humerali elytrali absente. Apice elytrorum satis anguste separatim rotundato. Margine lateroapicali haud denticulato; ornamento elytrorum speciali nullo; elytris aequaliter, sed vere subtiliter, sparse, parum conspicue pubescentibus. Gulari lobo late rotundato. Processu prosternali lancettiformi, apice breviter acuminato. Corpore subtus nitido, aequaliter convexo. Abdomine immaculato. Carina laterali segmentorum 1. et 2. basaliu unitorum recta. Parte latero-dorsali abdominis detecta nulla. Sterniti basalis maris medio insignato. Sternito anali medio normali; apice simpliciter rotundato. Pedibus satis gracilibus, cuproaeneis, satis longis. Tarsorum posteriorum articulo basali illos tres articulos sequentes longitudine adaequante. Tarsorum unguiculis brevibus, simplicibus.

Observatio: Species illo *A. cuspidato* satis similis, sed divergens.

4. *Agrilus chalceas* n. sp.

Long.: 5, lat.: 1.3 mm. Hab.: Africa or. angl.

Corporis forma convexa, postice satis attenuata. Aspectu satis nitido, granuloso. Colore corporis supra cupreo. Corpore subtus cupreo, nitido. Pubescentia corporis argentea, parum conspicua, in elytris ornamenta efficiente. Capite plane convexo, oculis oblique versus anticem positus, vertice angusto, nullo modo impresso. Fronte angustula, subparallela, versus verticem leviter attenuata, pilis albis transverse dispositis, densis tecta, parte interoculari frontis latitudine duplo longiori, lateribus fere rectis et subparallelis. Antennis ab articulo 5^o serratis, satis brevibus, fortibus, compactis, cupreis, articulis 5—11 transversis. Antennarum articulo tertio et quarto longitudine subaequalibus. Thorace longitudine circiter $1\frac{1}{2}$ latiori, summum latitudinis in tertia parte anteriori attingente, margine anteriori leviter bisinuato, lobo medio parum distincto, disco satis aequaliter convexo. Thoracis sculptura satis dense et satis fortiter rugosa. Lateribus leviter rotundatis, versus basim leviter sinuatim attenuatis, angulis posticis acutis. Carina prae-humerali brevi, leviter arcuata; ambobus desuper visis, fere parallelis. Carina laterali (marginali) recta. Carina submarginali leviter sinuata, ab illa laterali antice valde diver-

gente, iam ante basim cum ea iuncta. Scutello lato, transverse carinato, cupreo, postice acuminato. Elytris latitudine baseos circiter $2\frac{3}{4}$ longioribus, thorace capiteque unitis circiter $2\frac{2}{3}$ longioribus, a parte humerali usque post medium subparallelis, dein versus apicem longe arcuatim attenuatis, summum latitudinis circiter in parte humerali attingentibus, satis nitidis, humeris leviter elevatis. Carina longitudinali costiformi elytrorum nulla. Carina humerali elytrali absente. Apice elytrorum satis anguste separatim rotundato et subtiliter dense denticulato. Margine lateroapicali denticulata. Ornamento elytrorum utrimque e macula pilosa grisea subsuturali in tertia parte basali atque e macula simili, in tertia parte apicali posita composito, macula basali pone suturam linea pilosa angustula usque versus scutellum producta. Gulari lobo late rotundato. Processu prosternali subparallelo, apice rotundato. Corpore subtus cupreo, sparse, parum conspicue, aequaliter griseopiloso. Carina laterali segmentorum 1. et 2. basaliū unitorum nullo modo sinuata. Parte laterodorsali abdominis detecta angustissima, supra griseopilosa. Sterniti basalis maris medio integro. Sternito anali medio insignato, apice late sinuato. Pedibus cupreis, satis gracilibus, longis.

O b s e r v a t i o : Propter elytrorum ornamentum facile dignoscendus.

5. *Agrilus auroornatus* n. sp.

Long.: 6.4, lat.: 1.5 mm. Hab.: Africa or. angl.

Corporis forma elongata, satis gracili. Aspectu nitido. Colore corporis supra laete cupreo, elytris versus apicem purpurascens. Corpore subtus cupreo, nitido. Pubescentia corporis supra lutea, valde subtili, in elytris ornamenta efficiente. Capite latissimo, oculis lateraliter positus, satis parum convexus. Fronte nitida cuprea, breviter trapezoidali, vertice latissimo, rugoso, medio levissime impresso. Parte interoculari frontis longitudine circiter $1\frac{1}{5}$ latiori, lateribus rectis, versus anticem valde oblique attenuatis. Antennis ab articulo 4^o serratis, aureoaeeneis, satis gracilibus. Antennarum articulo tertio illo quarto distincte longiore. Thorace longitudine circiter $1\frac{1}{3}$ latiori, summum latitudinis in tertia parte anteriori attingente, margine anteriori distincte bisinuato, angulis anticis acutis, disco medio lineatim impresso, lineatim impresso, linea lutea pilosa, notata. Thoracis sculptura e rugis transversis arcuatis composito. Thoracis lateribus versus anticem arcuatim, versus basim longe sinuatim attenuatis, angulis posticis rectis, subacutis. Carina praehumerali brevi, arcuata. Carina laterali (marginali) longe, leviter sinuata. Carina submarginali fere recta, antice ab illa laterali valde divergente, dein versus basim approximata, ne in basi quidem cum ea iuncta. Scutello parvo, transverse carinato, cupreo, nitido. Elytris latitudine baseos circiter $3\frac{2}{3}$ longioribus, thorace capiteque unitis circiter triplo longioribus, a basi usque versus medium subparallelis, versus apicem longe attenuatis, summum latitudinis circiter in tertia parte apicali (ubi subdilatis) attingentibus, valde nitidis, supra satis deplanatis. Elytris valde aequaliter squamulosorugulosis, sculptura, satis densa, aequali, mediocri. Carina longitudinali costiformi elytrorum nulla. Carina humerali elytrali absente. Apice elytrorum satis anguste separatim rotundatis. Margine lateropicali subtilissime denticulato. Ornamento elytrorum 1. e fascia lata praeapicali in tertia parte apicali posita, fere recta. 2. e fascia angusta valde flexuosa, in tertia parte anteriori posita, in maculas aliquot separatas divisa, secundum suturam linea angusta usque versus basim producta, pilis aliquot similibus in excavatione basali frontis-ornamento hoc

toto aureopiloso satis parum conspicuo. Gulari lobo late sinuato. Processu prosternali subparallelo, apice acuminato. Corpore subtus valde nitido, subtilissime, perparum conspicue griseo piloso. Abdomine immaculato. Carina laterali segmentorum 1. et 2. basaliū unitorum nullo modo sinuata. Parte laterodorsali abdominis detecta angustula, solum post medium longitudinis visibili. Sterniti basalis maris medio integro. Sternito anali medio innotato, apice late rotundato. Pedibus satis longis, cupreoaureis, nitidis. Tarsorum posteriorum articulo basali illos ambo articulos sequentes longitudine adaequante. Tarsorum unguiculis simpliciter dentatis.

Observatio: Species insignis, propter pubescentiam auream atque ornamentum valde characteristicum elytrorum facile dignoscenda.

6. *Agrilus protensitarsis* n. sp.

Long.: 6.5, lat.: 1.4 mm. Hab.: Natal: Durban.

Corporis forma elongata, cylindracea. Aspectu satis nitido. Colore corporis supra laete aeneocupreo, elytris magis cupreonitidis. Corpore subtus laete cupreo, nitido, albosericco. Pubescentia corporis supra luteogrisea, elytra satis sparse, sed totaliter tegente, parum conspicua. Capite valde lato, vertice desuper viso latissimo, late producto. Vertice lineatim medio impresso. Fronte laete viridiaenea, brevi, fortiter trapezoidali, pube alba in forma rosacea dense tecta, parte interoculari frontis latitudine haud longiori, lateribus versus anticem fortiter, primo fere recte, dein sinuatim attenuato; fronte plana, vertice subtilissime longitudinaliter strigosulo. Antennis ?. Thorace longitudine circiter $1\frac{1}{3}$ latiori, summum latitudinis in tertia parte anteriori attingente, margine anteriori modice bisinuato, lobo medio lato, disco fovea anteriori et antebasali notato. Thoracis sculptura e strigis parum densis subobliteratis composita. Lateribus modice depressis; lateraliter thorace antice solum leviter rotundato, versus basim leviter sinuatim attenuato. Carina prae-humerali forti, brevi, arcuata, ab ea laterali fortiter divergente. Angulis posticis rectis. Carina laterali (marginali) levissime sinuata. Carina submarginali levissime sinuata, ab illa laterali paullo distante, cum ea ne in basi quidem iuncta. Scutello latissimo, transverse carinato, brevi. Elytris latitudine baseos circiter quadruplo longioribus, thorace capiteque unitis circiter triplo longioribus, a basi usque fere versus medium subparallelis, versus apicem longe attenuatis, summum latitudinis circiter in parte media longitudinis attingentibus, modice nitidis, in superficie tota pilis luteogriseis subtilibus aequaliter tectis; in pube hac tribus agglomerationibus maculiformibus prope suturam positis, densioribus, valde vagis et parum conspicuis notatis. Carina longitudinali costiformi elytrorum nulla. Carina humerali elytrali absente. Apice elytrorum valde anguste separatim rotundato. Margine lateroapicali parum distincte denticulato. Ornamento elytrorum valde vago e maculis tribus satis parvis rotundis composito: prima in fovea basali, secunda prope suturam in tertia parte anteriori, tertia prope suturam in tertia parte posteriori posita. Gulari lobo late sinuato. Processu prosternali subparallelo, apice acuminato. Corpore subtus sparse subtiliter piloso, pilositate in sternitis abdominis utrimque sebcondensata. Abdomine satis convexo, nitido. Carina laterali segmentorum 1. et 2. basaliū unitorum nullo modo sinuata. Parte laterodorsali abdominis detecta desuper visibili nulla. Sterniti basalis maris medio integro. Sternito anali medio innotato, apice rotundato. Pedibus longis, aeneis,

gracilibus; tarsis longis. Tarsorum posteriorum articulo basali illos tres articulos sequentes longitudine adaequante. Tarsorum unguiculis fassis, dentibus internis inversis.

Observatio: Species propter sculpturam characteristicam et tarsorum formam distinctissima.

7. *Agrilus duplosignatus* n. sp.

Long.: 7, lat.: 2.2 mm. Hab.: Africa or. angl.

Corporis forma satis robusta, postice attenuata. Aspectu parum nitido. Colore corporis supra obscure aeneo, parum nitido, parte media apicali elytrorum nigra, obscura, leviter cyanescente, fascia obliqua in tertia parte apicali posita atque fasciola praeapicali simili, e capillis aureis composita, fundamento aeneo. Corpore subtus parum nitido, obscure violaceoaenescente. Pubescentia corporis supra ochracea. Fronte satis planata, vertice utrimque leviter bigibbosulo, parte interoculari frontis longitudine distincte latiore lateribus fere rectis, parallelis, fronte et vertice (fronte in parte superiori) lineatim impressa, dense ochraceo pilosa, vertice glabro, longitudinaliter ruguloso. Antennis ab articulo 4^o serratis, aeneis, satis longis, satis gracilibus. Antennarum articulo tertio et quarto longitudine aequalibus. Thorace longitudine circiter 1½ latiori, summum latitudinis in tertia parte apicali attingente, margine anteriori late bisinuato, lobo medio lato, brevi, disco medio late superficialiter sulcato. Thoracis sculptura vere densa, satis subtili, satis rudi. Thoracis lateribus postice fere rectis, leviter subsinuatis, antice leviter arcuatis. Thorace satis parum conspicue ochraceo pubescente. Carina praeumerali fere recta, distincta, brevi, ab illa laterali antice valde divergente. Carina laterali (marginali) late arcuatim sinuata, ab illa submarginali antice divergente. Carina submarginali fere recta, cum illa laterali ne in basi quidem iuncta. Scutello valde lato, carinato, brevi. Elytris latitudine baseos circiter 2⅔ longioribus, thorace capiteque unitis circiter 2½ longioribus, ab humeris in linea longe sinuata versus apicem longa attenuatis, summum latitudinis circiter in parte humerali basali attingentibus, satis parum nitidis. Humeris modice elevatis. Parte media anteriori aenea satis dense et satis aequaliter pilositate ochracea tecta. Superficie tota elytrorum aequaliter dense squammuloso rugosa. Carina longitudinali costiformi elytrorum nulla. Carina humerali elytrali absente. Apice elytrorum satis anguste, fere conjunctim rotundato. Margine latero-apicali minutissime denticulato. Ornamento elytrorum e fasciis duabus praeapicalibus supra descriptis composito, parte media obscura aspectu fasciae denudatae. Gulari lobo late rotundato. Processu prosternali parallelo, apice anguste rotundato. Corpore subtus convexo, griseo, breviter piloso, tribus ultimis sternitis aureopilosis. Abdomine valde convexo, dense subtiliter punctato, immaculato. Carina laterali segmentorum 1. et 2. basium unitorum nullo modo sinuato. Parte laterodorsali abdominis detecta satis lata, desuper visibili. Sterniti basalis maris medio convexo, normali. Sternito anali medio innotato, apice rotundato. Pedibus obscure aeneis, satis longis. Tarsorum posteriorum articulo basali illos duo articulos sequentes longitudine adaequante. Tarsorum unguiculis dentatis.

Observatio: Species satis robusta, propter colorationem et pilositatem superficiei valde insignis.

8. Agrilus Conradi n. sp.

Long.: 7.2, lat.: 1.8 mm. Hab.: Ukerewe. (P. A. Conrads.)

Corporis forma elongata, gracili. Aspectu satis nitido. Colore corporis supra nigroviolascente, ornamentis testaceis in capite, thorace elytris notato. Corpore subtus valde nitido, pilis griseis subtilibus satis dense tecto. Pubescentia corporis subtili, satis longa. Capite convexo, vertice angusto, fronte supra et vertice lineatim impressis. Fronte angusta, versus verticem supra attenuata, antice parallela, parte interoculari frontis latitudine circiter $1\frac{1}{2}$ longiori, lateribus antice rectis, parte frontis antice dense pilis testaceis tecta, vertice in parte anteriori macula simili notato. Antennis ab articulo 4° serratis, satis longis, articulis 5—11 transversis, nigris. Antennarum articulo tertio illo quarto distincte brevior. Thorace longitudine circiter $1\frac{1}{2}$ latiori, summum latitudinis in tertia parte anteriori attingente, margine anteriori profunde bisinuatim emarginato, disco leviter, indistincte sulcato, nitido. Thoracis sculptura subtili, e rugis densis nitidis composita. Parte laterali (oblique impressa) supra carinam praehumeralem posita in longitudine thoracis tota satis anguste, dense testaceo pilosa. Carina praehumerali distincta, parum convexa, usque fere ad anticem prolongata, antice illae laterali valde apposita. Carina laterali (marginali) fere recta, antice levissime sinuata. Carina submarginali leviter sinuata, antice et postice illae laterali approximata, cum ea nullo modo iuncta. Scutello transverse carinato. Spatio inter tres carinas thoracales glabro, sine ulla pilositate testacea. Elytris latitudine baseos iereiter $3\frac{1}{2}$ longioribus, thorace capiteque unitis circiter $3\frac{1}{4}$ longioribus, ab humeris in linea longe sinuata usque versus apicem passim attenuatis, summum latitudinis circiter in parte humerali attingentibus, satis nitidis, valde aequaliter et subtiliter, dense granulose sculptis, sutura postice leviter elevata. Carina longitudinali costiformi elytrorum nulla. Carina humerali elytrali absente. Apice elytrorum anguste separatim rotundato. Margine latero-apicali distincte denticulato. Ornamento elytrorum utrimque e maculis tribus, e pilis testaceis densis compositis, formato, scilicet: 1. macula basali in fovea basali posita, leviter secundum suturam prolongata. 2. Macula longa subsuturali simili (cum illa anteriori fere iuncta) elongata in tertia parte basali. 3. Macula suturali in tertia parte apicali posita. Apice elytrorum aliquot capillis albis valde sparsis obsito. Gulari lobo distincte sinuato. Processu prosternali parallelo, apice attenuato. Corpore subtus valde nitido, convexo, pilositate alba in medio coxarum posteriorum condensata. Abdomine piloso, sternitis tribus ultimis utrimque macula alba paullo densiore notata. Carina laterali segmentorum 1. et 2. basaliun unitorum nullo modo sinuata. Parte laterodorsali abdominis detecta satis lata, illa sterniti basali pilis densis cinamomeis tecta. Sterniti basalis maris medio integro. Sternito anali medio innotato, apice rotundato. Pedibus gracilibus, longis, nitidis, obscuris, griseo-pubescentibus. Tarsorum posteriorum articulo basali illos tres articulos sequentes longitudine paullo superante. Tarsorum unguiculis breviter dentatis.

Observatio: Denominatus in honorem collectoris quam optime meriti, missionarii, P. A. Conrads.