

187.

Dr. Josef Mařan:

**DVA NOVÉ DRUHY RODU ALLECULODES BORCH.****DUAE NOVAE SPECIES GENERIS ALLECULODES BORCH.****(Coleoptera: Alleculidae.)**

Rod *Alleculodes* Borch. byl popsán Borchmannem v r. 1925 (Treubia Vol. VI. Livre 3—4, 1925 p. 335). Je to rod velmi blízce příbuzný s rodem *Allecula* F., od něhož se liší posledním článkem pyskových makadel, který jest na přední straně více či méně vykrojen. Poslední článek čelistních makadel jest na vnější straně většinou konkavní. Špička mandibul jest široká, nevykrojená. Štít jest málo klenutý, uprostřed s více či méně zřetelným podélným vtiskem. Nohy jsou krátké a u ♂ vykazují sexuální rozdíly. První až čtvrtý článek předních tarsů má na spodní straně lamelly, které jsou postupně větší od prvního článku ke čtvrtému.

Borchmann uvádí v citované práci deset druhů tohoto rodu z východoasijské oblasti. Jsou to: *Alleculodes neptis* Borch. z Birmy, *All. varus* Borch. ze Sumatry, *All. discrepans* Borch. z Javy a Sumatry, *All. latipes* Borch. z okolí Singaporu, *All. sukliensis* (Sukli), *All. genualis* Borch. a *All. glos* Borch. z Bornea, *All. sauteri* Borch. z Formosy a *All. opaca* Borch. a *All. proavia* Borch. z Honkongu. Týž autor v r. 1932 popsal další dva druhy tohoto rodu z okolí Singaporu. Jsou to: *All. socia* Borch. a *All. analis* Borch. (The Philippine journal of Science, Vol. 48, 1932, p. 344). Pravděpodobně náleží k tomuto rodu i *Allecula maxima* Pic.

Další dva nové druhy tohoto rodu nalezl jsem v materiálu sbíraném Drem Jiřím Baumem v Zadní Indii. Je to *All. uniseriatus* m. n. z Batu Pahat Malacca, velmi význačný druh, který se ode všech známých zástupců tohoto rodu liší mezirýžím krovek, která jsou uprostřed opatřena jedinou řadou zřetelných, dlouhými chloupky opatřených teček. Druhý druh *All. baumi* m. n. z okolí Singaporu jest blízce příbuzný s *All. socia* Borch., jest však větší, má jiný poměr tykadlových článků a na předních tarsech jsou i u ♀♀ všechny články opatřeny lamellami. Podrobné popisy uvádím v latinském textu.

***Alleculodes uniseriatus* m. n. sp.**

Elongatus, convexiusculus, subnitidus, supra sparse longe pilosus, rufo-brunneus, capite postice pronotoque obscuriore, palpis, antennis pedibusque unicoloribus rufis. Capite densissime pupilato-punctato. Labro transverso, longitudine fere 3× latiore, antice medio haud perspicue exciso, minus dense subtilius punctato, longius piloso. Clypeo haud convexo, antice recte truncato, postice linea lata haud profunda semicirculari limitato. Fronte (♂) sat angusta inter oculos cca  $\frac{1}{3}$  diametri oculi, temporibus sat longis, dimidio diametri oculi longioribus. Palpis maxillaribus articulo ultimo intus fortius quam extus dilatato. Palpis labialibus articulo ultimo antice profunde exciso. Antennis longis, dimidium corporis superantibus, fere filiformibus, articulo 3. articulis 1. + 2. simul sumptis aequilongo, articulo 4. quam 3. distincte longiore, 2. + 3. simul sumptis aequilongo, articulis reliquis inter se fere aequilongis, articulo ultimo praecedenti parum brevior.

Pronoto latitudine aequilongo, parum convexo, parum nitido, densissime crebrius pupilatim punctato, sparse piloso, lateribus fere subparallelis, tantum antice rotundatim attenuatis, basi et lateribus marginato, margine antico medio interrupto, linea media vix perspicua, angulis posticis rectis, impressionibus antebasalibus utrinque parum distinctis. Scutello breve, subtransverso, minutissime micrisculpturato, medio longitudinaliter modice impresso, parum piloso. Elytris oblongo-elongatis, pone medium parum ampliatis, apice attenuatis, humeris sat prominulis (apice in sutura subrotundatim angulatis) fortiter striato-punctatis, punctis apicem versus laevioribus sed bene distinctis, interstitiis parum convexis, fere subplanis, omnibus medio uniseriatim punctato-pilosis, his pilis valde longis. Epipleuris ad basin abdominis fortiter attenuatis, dein ab apice segmenti primi parum dilatatis deinceps pone dimidium segmenti tertii apicem versus sensim attenuatis, antice subtus seriebus tribus punctorum crebrium praeditis, ceterum sparse minutissime punctato-pilosis. Abdomine segmento 1.—3. minute mediocriter dense punctato, subtilius piloso, segmentis duobus ultimis medio multo sparsius punctatis, segmento 3. et 4. lateribus modice haud profunde sinuato, segmento ultimo apice normaliter rotundato, parum convexo nullo modo impresso.

Pedibus parum crassis, femoribus medio parum incrassatis, femoribus anticis nullo modo denticulatis, femoribus posticis segmentum quintum abdominis attingentibus. Tibiis anticis bicurvatis, medio dente sat magno prominulo, tibiis mediis modice arcuatis, medio perparum dilatatis, posticis in parte anteriore preparum intus, in parte posteriore fortius extus arcuatis. Tarsis anticis articulis 1.—4. subtus lobatis, mediis articulis 1.—4. (1.—2. parum), posticis 3. lobato. Tarsis posticis articulo 1. reliquis simul sumptis parum brevior. Oedeago apice acuto. Long. 11 mm.

Differt a ceteris speciebus huius generis manifestissime elytris interstitiis medio uniseriatim punctatis.

Typus 1 ♂ Batu Pahat Malacca, Dr. Jiří Baum leg. in Mus. Nat. Prae-gae conservatur.

#### ***Alleculodes Baumi* m. nov. sp.**

Long. 15 mm. Elongatus parum convexus, subnitidus, dense sat longe rufo-pilosus, nigro-brunneus, pedibus nigro-brunneis, antennis brunneis, articulis, duobus primis exceptis, apice nigricantibus. Capite antice crebre, postice densius atque laevius punctato. Labro transverso medio haud profunde exciso, dense sat longe rufopiloso. Clypeo antice glabro, convexo, dein crebrius sat dense punctato, postice linea transversali lata parum distincta limitato, lateribus rotundato. Fronte in ♂ angusta, fere tantum  $\frac{1}{4}$  diametri oculi; in ♀  $\frac{1}{3}$  diametri oculi. Temporibus latitudine oculi multo brevioribus. Palpis maxillaribus articulo ultimo minus lato, extus et intus fere aequaliter dilatato. Palpis labialibus articulo ultimo antice sat profunde exciso. Mandibulis apice late truncatis, supra denticulo parvo parum prominulo. Antennis mediocriter longis, dimidium corporis superantibus, articulis apicem versus parum dilatatis, articulo 3. articulis 1. + 2. simul sumptis  $\frac{1}{3} \times$  longiore, articulo 4. tertio cca  $\frac{1}{3} \times$  longiore, in ♂ articulis 2. + 3. simul sumptis aequilongo; in ♀ articulo 4. articulis 2. + 3. simul sumptis parum longiore, articulis reliquis inter se fere aequilongis, laevissime incurvatis, articulo ultimo tenui praecedenti perparum longiore.

Pronoto longitudine in ♂ parum, in ♀ fere  $\frac{1}{3} \times$  latiore, parum convexo, haud nitido, microsculpturato, laeviter mediocriter dense, haud profunde punctato denseque piloso, linea media minute indicata, parum perspicua, impressionibus basalibus utrinque modice impressis, lateribus basin versus modice, tertia in parte antica fortius rotundatim attenuatis, ante basin minutissime subsinuatis, angulis posticis rectis, basi utrinque sat fortiter sinuata, distincte marginata, margine laterali bene distincto, margine antico medio late interrupto. Scutello linguiformi, elongato-ovato, apice rotundato. Sparsius punctato, dense piloso.

Elytris elongatis, in ♂ in humeris latissimis ad apicem attenuatis, in ♀ pone medium modice ampliatis, sat profunde striato-punctatis, punctis antice fortioribus, apicem versus laevioribus, interstitiis convexis utrinque pone strias serie punctorum laevium praeditis, postice interstitiis 2., 4., 6., 8., 9. (duobus ultimis etiam antice) supra sat dense punctatis. Humeris modice prominulis, normaliter formatis. Epipleuris in humeris latissimis, apicem versus normaliter attenuatis, antice subtus punctis paucis crebrioribus praeditis, ceterum tantum minutissime punctato-pilosis. Abdomine segmentis 1.—3. densissime minute punctatis, lateribus paulo longius pilosis, segmento 4.—5. medio nitido fere glabro, tantum punctis paucis disjunctis ornato, segmento 3. et 4. lateribus distincte late sinuato, segmento ultimo in utroque sexu pone basin transverse haud profunde, in parte anteriore apicali late profundius impresso, apice subtruncatim rotundato.

Pedibus crassis, femoribus medio valde incrassatis, femoribus posticis segmentum abdominis quartum attingentibus, femoribus anticis intus haud denticulatis. Tibiis anticis sat fortiter curvatis, medio dilatatis, tibiis mediis modice arcuatis, posticis rectis. Tarsis anticis in ♂ articulo 1.—4. late lobato, tarsis mediis articulo 1.—4., posticis articulo 3. lobato — in ♀ tarsis anticis articulis 1.—4., mediis 3.—4., posticis 3. lobato. Tarsis posticis in utroque sexu articulo primo reliquis simul sumptis haud longiore. Oedeago apice rotundato.

Species haec nova speciei *All. socia* Borch. valde similis, differt ab ea descriptione sensu longitudine majore (15 mm, in *socia* 11—13.5 mm) abdomine lateribus tantum paulo longius pilosis, antennis articulo tertio brevior, fronte angustiore, tibiis mediis arcuatis, tarsis anticis et in ♀ articulis 1.—4. lobatis (in *socia* 2.—4.) tarsis posticis articulo primo reliquis simul sumptis haud longiore, nec non pronoto laevius punctato. Ab *All. analis* Borch. differt species nostra antennis articulo 4. brevior, pronoto antice medio nullo modo marginato, segmento ultimo abdominis subrotundato, nullo modo sinuato femoribusque anticis intus haud denticulatis. Ab *All. latipes* Borch. descriptione sensu iam pronoto antice medio imarginato, linea media pronoti incompleta, interstitiisque alio modo sculpturatis differt.

Typi 1 ♂, 1 ♀ Singapore 1929, Dr. Jiří Baum leg. in Coll. Mus. Nat. Pragae conservantur.