

Fr. Gregor, Brno:

**DE NONNULLIS ICHNEUMONIDARUM A DOM. DR. VLASTA
KÁLALOVÁ-DI LOTTI IN MESOPOTAMIA SPECIEBUS COLLECTIS
NOVIS.**

**O NĚKOLIKA NOVÝCH DRUZÍCH LUMKŮ Z BAGDADU
ZE SBĚRŮ PÍ. DR. VLASTY KÁLALOVÉ-DI LOTTI.**

Paní Dr. Kálalová di Lotti působila jako lékařka v Bagdadu v Mesopotamii. Neomezila se jen na lékařskou činnost, ale všímala si tamnější přírody a darovala Národnímu Museu v Praze mnoho různého entomologického materiálu, který obsahuje mnoho cenných věcí. Mezi lumky, které jsem určoval Národnímu Museu, našel jsem také několik kusů z jejích sběrů. Protože jsem je nemohl z nedostatku cizí literatury určit, poslal jsem je Dr. Romanovi se žádostí, aby je určil. Ukázalo se, že jsou mezi nimi dva nové druhy. Samečka od nového druhu r. *Amblyteles* určil jako *Barichneumon* sp., ale když jsem jej důkladně prohlédl a srovnal s novou samičkou uved. rodu, shledal jsem, že se jedná o ♂ k tomuto novému druhu. Soudím tak zvláště ze žilnatiny křídel, neobyčejně zúžené hlavy, zvláštní barvy zadečku atd. Dr. Roman dále zjistil *Criptus Bovei* var., *Stenareus* sp. (rod dosud jen z Evropy uváděný a zdá se, že jde o nový druh). Druh *Euriophion nigripennis* Cam. jsem určil sám. Z těch několika kusů je již vidět, jak zvláštní je lumčí fauna Iraku, dosud naprosto neznámá.

***Amblyteles bagdadensis*, ♀♂, sp. n.**

Totum corpus leniter albidovillosum.

Capite glabro, sparse punctato, fronte tamen densius punctata. Genis satis dilatatis, lenius punctatis. Facie valde transversa, gibbum in medio gerente. Clypeo minus conspicue separato, glabro, paucipunctato, antice praeciso. Labro superiore longis cillis luteis instructo. Capite retrorsum valde attenuato. Oculis magnis, in summam frontem prominentibus. Ocellis magnis, inter se distantibus, ocello anteriore irregularis costis circumdato.

Antennis brevibus, thoracis finem non attingentibus, tenuibus, setaceis, e 35 articulis compositis. Articulo primo plus quam 2× latitudine longiore, articulo nono quadrato.

Thorace plano, fere cylindrico, bis altitudine longiore, postice parum attenuato, dense punctato. Mesopleuris atque pronoto nitidioribus, subtiliter punctatis. Scutello plano, impunctato, nitidissimo. Propodeo crasse punctato, fere reticulato, postice cavato. Areolatione perspicua. Area superomedia 1½ latitudine longiore, sparse et irregulariter rugulosa. Area basalis brevi. Costula tenui, post medium posita. Stigmatibus grandibus, longe linearibus. Area petiolari divisa.

Abdomine oblonge ovato, antice, praecipue in articulo secundo, crasse punctato, in medio parum ruguloso. Gastrocoelis mediocriter grandibus, antice conjunctis, obliquis. Postpetiolo lato, in lateribus punctato, in medio parum ruguloso, tenuibus carinis instructo. Segmento II longitudine parum latiore, tertio bis longitudine latiore. Abdomine leniter obtuso, terebra parum prominente, crassa, rotundata (ex lateribus visa).

Pedibus rarum validis, coxis III scopula carentibus.

Ramellos alarum innotato, area pentagonali, nervo recurrente post medium posito. Radio ad finem leniter incurvato. Nervello postfurcali, obliquo. Nervulo opposito inconspicue infracto.

Capite, thorace, coxis, trochanteribus nigris. Mandibulis palpis, scapo subtus, antennarum basi subtus, tegulis, stigmatibus brunneis. Orbitis interioribus in fronte usque ad verticem alboluteis, partim brunnescentibus. Articulis antennarum 9.—13. alboannulatis. Scutello postice albo. Pedibus (praeter coxas atque trochanteres) brunneorubris. Apice tibiaram III obscuriore, articulis tarsorum IIII maculam grandem albidoluteam gerentibus.

L. ♀ 9 mm, ♂ 9.5 mm.

Patria: Bagdad (Irak). Leg. Dr. Kálalová di Lotti. Type col. Nár. Museum Pragae.

Goniocryptus Kálalae, sp. n., ♀.

Capite brevi, antice triangulari, vix latitudine thoracis, retrorsum valde attenuato, antice crasse punctato, postice post ocellos nitido, fere impunctato prater genas parum punctatas. Facie valde transversa, haud nitida, in medio longitudinaliter elevata. Clypeo haud separato, parvo, rotundato. Genis grandibus. Mandibulis brevibus, latis, punctatis, dentibus paribus. Antennis tenuibus (apices formae typice fractae). Scapo oblique praeciso, articulo primo minimum $4\times$ latitudine longiore, secundo parum brevior primo, sequentibus successive brevioribus, octavo cca $2\times$, quindecimo circa $1\frac{1}{2}\times$ latitudine longioribus. Oculis grandibus, valde elongatis.

Thorace convexo, $\frac{1}{2}$ altitudinis longiore, glabro, crasse punctato (praecipue in lateribus et propodeo), mesonoto tantum nitidiore. Parapsidibus solum antice innotatis. Propodeo convexo, postice parum excavato, costa transversa completa, costa posteriore in medio interrupta. Punctis propodei ad rugationem linealem inclinantibus. Speculo perspicuo, spiraculis longe ellipticis.

Petiole longo, glabro nitidoque, plano, postice incurvato, paulatim retrorsum dilatato, in apice rotundato. Postpetiolo fere transverso, spiraculis haud prominentibus. Abdomine late lanceolato, nitido, subtiliter et sparse punctato, thoracis latitudine angustiore. Segmentis postice tumentibus. Segmento secundo parum latitudine longiore, postice ter latiore quam antice, segmento tertio $\frac{1}{3}$ longitudinis latiore. Terebra longitudinem segmenti tertii attingente.

Alis satis brevibus vix apicem tertii segmenti attingentibus. Areola grandi, antice haud convergente, subtransversa, nervo recurrente parum post medium posito. Ramello brevi. Stigmate angusto, parvo. Nervello parum postfurcali, fere verticali, nervulo opposito parum sub medio infracto.

Penibus anterioribus tenuibus, posterioribus longis, coxis tenuibus, apicibus tibiaram III crassitudine coxorum. Spina tibiaram III satis longa, medium metatarsi attingente. Tarso tibia longiore, articulo V longitudinem tertii atque quarti attingente. Unguiculis parvis, tenuibus.

Totus rufobrunneus, thorace obscuriore, capite magis obscuriore, supra et postice fere nigro. Palpis claris. Antennis perspicuo annulocarentibus. Apicibus tibiaram III et tarsorum III obscurioribus. Apice abdominis (art. V et VI) fere nigro. Alis brunnescentibus, stigmate et nervis nigrobrunneis.

Leg. Kálalová di Lotti, ad cuius honorem novam speciem denomonavi.

Long. 9 mm. 1 ♀ Bagdad (Irak). Coll. Nár. Museum Pragae.

Var. nigra v. n. ♀.

Caput, antennae, coxae, trochanteres, basis coxarum I et II, analis pars abdominis, plurima pars tibiatarum III, tarsi III colore nigro. Propodeo sub coxis III, basali parte antennarum subtus brunneo, articulis VIII—IX antennarum supra albis. Mandibulis in medio brunneis, facie in lateribus prope antennis macula brunnea ornatum. Nervis alarum stigmatibusque nigris. Postpetiolo latitudine longiore, spiraculis perspicue prominentibus. Crandior, 1 ♀, 10 mm. Bagdad.

Euryophion nigripennis var. **bagdadensis**, v. n. ♀

Mihi tantum brevis descriptio Schmiedeknechti (Op. Ichn. p. I. 427) nota est, quae fortasse novam speciem indicare videtur, nam haec forma jem dimidio longitudinis (14 mm) differt. Colore brunneorubro sunt solum: Thoracis partes (mesonotum cum scutello), abdominis partes (apex postpetioli, segmentum II praeter nigram basin, segmentum III antice). Pedes rubri, coxae nigrae. — *Euryophion nigripennis* Cam. anno 1906 ex Natal (Africa merid.) descriptus est.

1 ♀ Bagdad (Irak). Typus Nár. Museum, Pragae.

Dr. Roman, qui Ichneumonides supra indicatas determinavit et cui hic ego gratias ago, etiam formas *Cryptus Bovei* var., *Stenaraeus* sp. inter specimina ex Bagdad invenit.
