

199.

Doc. Dr. Jan Obenberger:

GENERIS BUBASTES CAST. ET GORY REVISIO NOVA (COL. BUPR.)
NOVÁ REVISE RODU BUBASTES CAST. ET GORY (COL. BUPR.)

V této práci podávám novou revisi austrálských kraseů z rodu *Bubastes* Cast. et Gory. Už ve svých dřívějších pracích zabýval jsem se opětovně tímto velmi zajímavým rodem, který je omezen na austrálskou pevninu, kde žije zřejmě velký počet jeho druhů, z nichž některé jsou velmi krásné, skvělých barev a nádherného lesku. Je zajímavé, že tyto druhy přicházejí ve sbírkách většinou jen ojediněle — patrně nezná se ještě biologie těchto krásných a jistě i zajímavých způsobem žijících kraseů. Několik rodů kolem rodu *Bubastes* tvoří velmi zajímavou zvláštní podčeleď, kterou označil jsem svého času jako *Bubastini* Obenb. Veškeré rody žijí v tropech, v Australii a ve východní Africe, jediný rod *Paratassa* Wars. s druhem *Caroli* Mars. žije v Alžíru, kde dospělí brouci sedají na květy jako *Anthaxie*. Druhy rodu *Bubastes* nahrazují asi v Australii zástupce rodu *Sphenoptera*, který Australii chybí. Druhy rodu *Bubastes* jsou značně nesnadné a proto bylo nutno podati celou novou revisi tohoto rodu, aby bylo lze spolehlivě určití nově objevené a zde popisované druhy. Některé, zvláště bronzové druhy tohoto rodu jsou značně uniformní a většina znaků je jednak na hlavě, kde záleží na šířce čela, úpravě epistomatu, poměru tykadlových článků a šířce prostoru mezi očima, dále na tvaru a skulptuře štítu, jehož tečkování je pro různé druhy charakteristické, a na tvaru a délce postranního žebérka štítu. Tvar prosternálního výběžku a jeho struktura, dále přední kraj prosterna, jež je buď neovroubené nebo ovroubené, skulptura krovek, kde jsou buď podélné žláby, a více méně vyvinutá žebérka nebo kde skulptura může býti stejnoměrná, kde jsou na konci dva hroty nebo jen jediný atd. poskytují hlavní použitelné znaky v tomto velmi zajímavém a ve sbírkách stále vzácném rodě. Veškeré nové druhy zde zastoupené jsou uloženy v mé sbírce.

*

In opusculo praesente revisionem specierum generis *Bubastes* Cast. et Gory dono. Species haec iam a me anno 1928 revisae sunt, sed species novae aliquot sine tabella analytica difficiliter determinarentur, qua de caussa hoc loco tabella nova generis *Bubastes* completa datur. Species omnes generis *Bubastes* in Australia inveniuntur. Typi specierum novarum hic descriptorum omnes in collectione mea depositi sunt.

Specierum revisio.

- 1 (20) Elytris metallicis, viridibus, aureis vel (raro) cyaneis. Corpore sub-
 tus cyaneo, laete viridi, aeneo vel cupreo, solum apud *B. viridicupreum*
Obenb. obscure cupreoviolaceo. Superficie saepe valde nitida
 (solum apud *B. viridicupreum* *Obenb.* obscuriore et minus nitida).
- 2 (3) Capite et prothorace viridi vel viridicyaneo, elytris aureoviridibus
 vel cupreis, corpore subtus splendide viridicupreo, sternito anali vio-
 laceo; pedibus cupreis; frontis latitudine diametro brevi oculi duplo
 latiore. Thorace fere in tertia parte anteriore longitudinis summum

- latitudinis attingente, angulis posticis acutis. Corpore subtus aspectu glabro. Australia occidentalis. **1. Bubastes Leai** Carter.
- 3 (2) Alio colore. Thorace saepissime eodem colore cum elytris vel cum maiore parte elytrorum. Sternito anali eodem modo uti altera parte abdominis colorato.
- 4 (11) Superficie splendide bicolori, nitida. Parte suturali elytrorum cyanea.
- 5 (8) Parte lata dorsali elytrorum cyanea, partibus thoracis et elytrorum lateralibus aureo- vel aeneomarginatis. Corpore subtus aeneo vel aureorubido, pedibus aeneis vel purpureoviolaceis. Fronte longitudinaliter depressa. Thorace longitudine $1\frac{1}{3}$ latiore, in basi vel paullo ante basim summum latitudinis attingente, foveola antescutellari punctiformi notato. Australia occidentalis.
- 6 (7) Species maior: 20.5×6.5 mm. Splendide smaragdineus, capite aureo, vertice viridi, thorace et elytris aureomarginatis, parte dorsali elytrorum secundum suturam splendide cyanea. Corpore subtus rubroaureo, pedibus violaceis. Parte interoculari frontis latitudine $1\frac{1}{4}$ longiori. Antennis violaceis. Thorace usque ad medium parallelo. Processu prosternali angusto, nitido, sparse, subtiliter punctato. Elytris solum valde leviter subcarinatis. Corpore subtus calvo, pedibus fortibus, tibiis posterioribus externe luteosetosis. Australia occidentalis.
- **2. Bubastes Van Rooni** Obenb.
- 7 (6) Corpore minore: $16-18 \times 5.6$ mm, cylindraceo, calvo. Parte anteriori capitis thorace, elytris splendide cyaneis, epistomate, antennis, macula triangulari capitis, margine laterali thoracis et elytrorum, pedibus, corpore subtus aeneis. Thorace in basi summum latitudinis attingente, lateraliter leviter rotundato, versus anticem angustato; prosterno densissime punctato. Elytris satis profunde subsulcatis, parte anteriori elytrorum leviter subrugosa. Australia occidentalis.
- **3. Bubastes formosa** Carter.
- 8 (5) Solum parte angusta suturali elytrorum cyanea, superficie altera viridi vel viridiaurea, corpore subtus pedibusque viridibus. Fronte concava. Angulis posticis thoracis acutis.
- 9 (10) Corpore subtus breviter albopiloso. Capite viridi vel cupreo, thorace medio aeneo, lateraliter viridi, elytris aureis vel cupreis, versus latera virescentibus. Margine basali elytrorum cyaneoviridi. Antennis et tarsis rubrocupreis, scutello cyaneo. Fronte in medio acute impressa. Lateribus thoracis leviter subdilatis. Elytris latitudine plus quam triplo longioribus, corpore subtus confertim punctato, punctis a sterno versus apicem abdominis passim subtiliore. ♂ 14×4 , ♀ 17×6 sterno versus apicem abdominis passim subtilioribus. ♂ 14×4 , ♀ 17×6 mm. Drysdale River, Cue. Australia.
- **4. Bubastes suturalis** Carter.
- 10 (9) Corpore subtus calvo, solum coxarum posteriorum parte externa pilis aliquot brevibus subtilibus notata. Uti *B. suturalis* coloratus, sed colore fundamentaliter viridi, partibus mediis elytrorum et parte dorsali thoracis aureis. Antennis nigrocyaneis, tarsis aureoviridibus, scutello virescente. Fronte medio sulculo subtilissimo, parum conspicuo signata. Thoracis lateribus parallelis, solum a tertia parte anteriori versus anticem satis leviter attenuatis. Elytris latitudine haud triplo

longioribus. Corpore subtus nitidissimo, subtiliter, haud dense punctato, processu prosternali angusto, nitidissimo, sparsissime punctato. ♂♀ 12×3.5 mm. Croydon. Australia.

..... 5. **Bubastes Strandi** Obenb.

- 11 (4) Corpore supra concolore, solum lateribus thoracis et elytrorum nonnumquam rufescentibus vel cuprescentibus, sed dein superficie tota multo minus nitida, obscuriore, surdior, semper sine ulla coloratione cyanea in parte suturali elytrorum.

- 12 (13) Processu prosternali dense punctato. Corpore subtus obscuro, cupreo-violaceo, dense punctato, corpore supra densissime punctato, viridi vel aeneoviridi, lateraliter late rubromarginato. Processu prosternali a latere viso distincte erecte piloso. Corpore robustiore, fortiore, minus nitido. Queensland bor. 6. **Bubastes viridicupreus** Obenb.

- 13 (12) Processu prosternali solum sparse punctato. Corpore angustiore, graciliore. Elytris et thorace sine ullo margine rufescente.

- 14 (15) Thoracis dorso valde sparse punctato. Processu prosternali calvo, laevi. Partibus pro-, meso- et metathoracis lateralibus squamulis adhaerentibus subtilibus planis tectis. Medio thoracis linea subtili impressa distincta notato. Parte interoculari frontis longitudine circiter 1½ latiore: oculis parvis. Corpore supra splendide smaragdineo, subtus aureoviridi. 18.5×6 mm. Australia meridionalis.

..... 7. **Bubastes persplendens** Obenb.

- 15 (14) Thoracis dorso stria media nulla; superficie thoracis duplo densius, confertim, fortius punctata. Minus nitidus. Processu prosternali a latere viso laevi et calvo, vel pilis subtilibus erectis sparsis tecto.

- 16 (17) Superficie cyanea. Confertim punctatus. Labro desuper visibili, luteo. Fronte inusitatim angusta, parte interoculari frontis latitudine fere 1½ longiori, nullo modo impresso. Processu prosternali a latere viso distincte, subtiliter, breviter, erecte piloso. Corpore subtus obscure cyaneo, parum conspicue pilis subtilibus griseis, sparsis, tenuibus tecto. 14.5×4.5 mm. Australia occidentalis.

..... 8. **Bubastes sphenoidea** Cast. et Gory.

- 17 (16) Viridicyaneus vel aureoviridis, fronte medio longitudinaliter impresso, multo latiore. Formae angustiores; subtilius punctatae, nitidiores. Labrum desuper invisibile.

- 18 (19) Cyaneoviridis. Corpore subtus subtilissime, sparse punctato, fere laevi, solum lateraliter, sub thorace, partibus sternalibus breviter, adhaerenter, parum conspicue albosquamuloso. Processu prosternali laevi, calvo. 13×4 mm. Australia meridionalis.

..... 9. **Bubastes splendens** Blackburn.

- 19 (18) Aureoviridis. Corpore subtus densissime, fortiter punctato. Australia occ. et mer. 10. **Bubastes occidentalis** Blackburn.

- 20 (1) Species obscuriores, colore griseo, nigrescente, griseocupreo, olivaceo, griseoolivaceo, rarius obscure viridi. Corpore subtus obscuro, solum raro cyaneo (*cylindricus* M'Leay) vel viridi (*vagans* Blackb.).

- 21 (22) Corpore subtus obscure viridi, superficie bicolori: Capite et thorace obscure viridibus, elytris obscure cupreopurpureis, apicibus femorum, tibiarum, tarsis laete cupreis. Corpore subtus sparse griseopiloso. Fronte nullo modo depresso, vertice solo linea subtili impressa longi-

- tudinali notato. Thorace longitudine $1\frac{1}{3}$ latiore. Australia meridionalis. 11. **Bubastes vagans** Blackburn.
- 22 (21) Corpore subtus obscure brunneocupreo, aeneo, cupreo, solum in specie sola *B. cylindrico* M'Leay cyaneo, saepe nitore violaceo. Superficie semper unicolori.
- 23 (28) Thorace angusto, saepe cylindraceo vel conspicue prolongato, latitudine paullo longiore vel longitudine et latitudine aequali.
- 24 (25) Corpore subtus cyaneo. Vide: 14. **Bubastes cylindricus** M'Leay.
- 25 (24) Corpore subtus obscure aeneo vel obscure cupreo, supra brunneoolivaceo. Oculis parvis.
- 26 (27) Epistomate in eodem plano cum fronte posito. Articulis tertio et quarto antennarum eadem longitudine. Prosterno brevi et convexo. Femoribus anticis et mediis valde incrassatis, articulo basali tarsorum illos sequentes longitudine superante. Elytrorum lateribus obscure purpureomarginatis. Thorace linea media impressa parum conspicua notato, lateribus leviter sinuatis, angulis posticis fere rectis. Elytris solum quattuor striis distinctioribus notatis, striis alteris solum vestigialibus. Corpore subtus solum cum vestigiis pubescentiae squammiformis. Species maior: 18×5.75 mm. Australia. 12. **Bubastes bostrychoides** Théry.
- 27 (26) Epistomate sub plano frontis (inferius) posito. Articulo tertio antennarum illo quarto distinctissime brevior. Prosterno normali, normaliter convexo. Pedibus omnibus simplicibus, femoribus nullis incrassatis, articulo basali tarsorum eadem longitudine, uti articulus secundus. Elytris unicoloribus, postice haud magis cupreis vel rufescentibus. Thorace sine linea media impressa, lateraliter postice recto, angulis posticis acutis, acuminatis, versus posticem prolongatis. Elytris striiformiter subsulcatis, sulculis superficialibus omnibus aequaliter distinctis. Corpore subtus distinctissime adhaerenter, breviter piloso. Species minor. 16.5×5 mm. Australia occidentalis. 13. **Bubastes olivinus** Obenb.
- 28 (23) Thorace transverso, latitudine semper maiore, longitudinem superante.
- 29 (30) Oculis parvulis, temporibus magis conspicuis. Vide: 25 (24)
- 30 (29) Oculis normalibus, multo maioribus, saepe maximis, marginem anteriorem thoracis fere attingentibus, temporibus brevissimis vel inconspicuis.
- 31 (32) Corpore subtus, nitido, cyaneo. Thorace longitudine solum paullulo latiore, cylindraceo, elongato, quattuor parvis foveolis punctiformibus notato, quarum duabus in medio, duabus ante basim dispositis. Corpore subtus lateraliter sparse albopiloso. Capite et thorace obscure aeneis, elytris obscure violaceo micantibus cum reflectionibus purpureis, apice bidentatis. Angustus, cylindraceus, nitidus. Australia occidentalis. 14. **Bubastes cylindricus** M'Leay.
- 32 (31) Corpore subtus nullo modo cyaneo; colore partes corporis inferioris obscuriore, cupreo, aeneo vel violaceo, saepe fere nigro.
- 33 (38) Corpore subtus squamulis parvis albis adhaerentibus, lateraliter saepe condensatis tecto—abdomine a latere visu nullis pilis erectis obsito.

- Corpore subtus dense punctato. Squamulis abdominis illis nonnullarum familiae *Curculionidarum* specierum similibus.
- 34 (35) Prothorace fortiter rotundato, subgloboso, lato; antennis in parte basali purpureis, dein coeruleis, corpore subtus aeneo. Elytris distinctius substriatis, confertim punctatis, lateraliter fere nullo modo denticulatis, apicibus solum obtuse bidentatis. Obscure aeneus. 14×5 mm. Australia. 15. **Bubastes globicollis** J. Thomson.
- 35 (34) Thorace lateraliter usque ad tertiam partem anteriorem parallelo; forma angustiore, magis cylindracea, antennis nigris. Obscure rubro-cupreus, parum nitens, corpore subtus obscure cupreo, violascente. Striis elytrorum solum vestigialibus, perparum indicatis, elytris postice lateraliter distinctissime crenulatis, utrimque satis acute bidentatis. Sternito anali latitudine distincte longiori.
- 36 (37) Minor, angustior, gracilior, magis cylindraceus, magis parallelus. Thoracis punctis confertissimis, duplo quam punctis elytrorum fortioribus. Elytris haud substriatis, apicibus paullo latioribus. Wolfram Camp. Australia. 16. **Bubastes euryopiloides** Obenb.
- 37 (36) Maior, robustior, latior; punctis elytrorum subtilioribus, minus confertis, illis thoracis solum parum subtilioribus. Elytris versus apicem distinctius sinuatim attenuatis. Apicibus elytrorum angustioribus: 16a. **B. euryopiloides v. crassulus** Obenb.
- 38 (33) Corpore subtus vel erecte piloso, vel pilososquamuloso, scilicet: squamis elongatis, longis, albis, piliformibus tecto, squamis his pilis deplanatis similibus atque a typo squamularum latarum specierum praecedentium valde diversis. In speciebus aliquot sectionis huius corpore subtus fere glabro, sed semper squamis normalibus latis et rotundatis deficientibus.
- 39 (42) Corpore subtus *squamis piliformibus* (= pilis *deplanatis*) tecto. Thorace a basi usque ad tertiam partem anteriorem parallelo. Elytris apice acute bidentato. Processu prosternali dense, sed subtiliter punctato.
- 40 (41) Maior: 18×5.5 mm, robustior, colore satis claro, aeneo. Spatio interoculari frontis lato, longitudine circiter 1¼ latiore, versus antecem leviter subdilato. Oculis minoribus. Carina laterali thoracis recta atque usque ad tertiam partem anteriorem thoracis distincta. Antennis gracilioribus, articulis singulis minus transversis. Striis elytrorum distinctioribus, elytris postice fortius acuminatis. Epistomate in medio haud distincte sinuato. Queensland. 17. **Bubastes aeneus** Obenb.
- 41 (40) Minor: 13.5×4 mm, angustior, rubrocupreus. Spatio interoculari frontis angusto et parallelo, latitudine circiter 1⅓ longiore. Oculis maioribus. Carina thoracis laterali brevi et sinuata, medium thoracis longitudinis haud attingente. Antennis robustioribus, articulis sex penultimis magis transversis. Elytris haud longitudinaliter striatis, versus apicem minus attenuatis. Epistomate in medio fortius sinuato. Queensland. 18. **Bubastes niveiventris** Obenb.
- 42 (39) Corpore subtus solum pilis simplicibus, cylindricis, parum erectis, a latere bene visibilibus tectis vel corpore subtus calvo et glabro.

- (Species in elytris fascia nigra laterali notatae vel margine elytrali nigro, vide sub: 48 (51).
- 43 (76) Margine anteriori prosterni marginato. Colore superficiei paullo laetiore. Denticula laterali apicis elytrorum vel praesente, vel absente. Pilositate corporis inferioris magis erecta, a latere bene visibili.
- 44 (47) Processu prosternali laevi, sparse punctato. Carina laterali thoracis brevi et recta. Corpore subtus glabro, sine ullo vestigio pilositatis. Sculptura sterniti analis rugulosa.
- 45 (46) Maior: 19.3×6 mm; supra satis laete brunneaeneus, viridinitens, subtus rubropurpureus, cyaneoviridiscens. Oculis minoribus, angustioribus, longioribus, parte interoculari frontis latiore, longitudine et latitudine fere aequali. Capite et thorace subtilius punctatis. Dente externo apicis elytrorum distincto, acuto. Punctis sterniti basalis satis sparsis et subtilibus. Rugis sterniti analis concentricis, secundum ellipsam centralem dispositis. Epistomate multo distinctius sinuato. Australia occidentalis. 19. **Bubastes Germari Obenb.**
- 46 (45) Minor: 14.5×4 mm; satis obscure rubrocupreus. Oculis lateraliter leviter prominulis, maioribus et latioribus, magis rotundatis. Parte interoculari frontis angusta et parallela, latitudine circiter $1\frac{1}{2}$ longiore; capite et thorace fortius punctatis. Dente lateroapicali elytrorum obtuso, indistincto. Sternito basali dense et fortiter punctato. Rugulis sterniti basalis minus regularibus. Epistomate haud sinuato, fere recte transverse truncato. Australia. 20. **Bubastes Kirbyi Obenb.**
- 47 (44) Processu prosternali dense piloso, dense punctato. Corpore subtus pilis parum conspicuis, subtilibus, simplicibus, saepe parum conspicuis tecto.
- 48 (51) Elytris late, distincte nigromarginatis vel fasciis nigris notatis. Brunneocupreus. Antennis et tarsis metallicis vel ochraceis.
- 49 (50) Antennis obscure purpureis, pedibus obscure metallicis. Elytris fasciis nigris parum distinctis notatis. Satis elongatus, versus apicem conice angustatus. Elytris lateraliter nullo modo denticulatis, apicibus obtuse bidentatis. Thorace convexo, lateraliter rotundato. 15×5 mm. Australia. 21. **Bubastes inconsistans J. Thoms.**
- 50 (49) Antennis valde conspicue brevibus, luteis, nullo modo metallicis, apicibus tibiarum et tarsis luteis. Elytris late nigromarginatis, parte elytrorum dorsali sine ullo vestigio fasciarum nigrescentium. Elongatus, cylindraceus, fortiter parallelus, elytris postice subtilissime, sed distincte crenulatis, apice conjunctim rotundato, sine ullo vestigio denticulae lateroapicalis. Thorace usque versus tertiam partem anteriorem parallelo. 17.5×4.6 mm. Queensland borealis. 22. **Bubastes Thomsoni Obenb.**
- 51 (48) Elytris sine ullo vestigio fasciarum nigrarum longitudinalium in parte dorsali vel marginis nigri. Pedibus antennisque semper metallicis.
- 52 (53) Thorace valde magno, lato, robusto, rotundato. Parte interoculari frontis longitudine et latitudine fere aequali, capite de antice viso angusto, parvo, convexo. Colore superficiei olivaceoviridi, nigrescente. Corpore subtus brevissime, subtiliter, erecte piloso. Processu proster-

nali densissime, grosse punctato. Epistomate recte, transverse truncato. Medio frontis leviter impresso. Dente lateroapicali elytrorum fortiter obtusato. Corpore robusto et forti. Australia occidentalis.....

.....23. **Bubastes laticollis** Blackb.

- 53 (52) Thorace normali, nullo modo incrassato, rarius solum lateraliter rotundato. Obscure cupreus, leviter purpurascens, parum nitens.
- 54 (75) Thorace lateraliter nullo modo fortiter rotundato, versus basim haud subsinuato vel angustato, unicolore, solum apud *B. Odewahni* Obenb. lateraliter late cupreomarginato.
- 55 (64) Parte interoculari frontis latiore, scilicet minime latitudine et longitudine aequali. Forma robustiore. Colore obscure viridiaeneo vel cuprascente, parum nitido, violaceonitente. Epistomate leviter sinuato.
- 56 (59) Apice elytrorum conjunctim anguste subrotundato, dente lateroapicali nullo, dente suturali brevi.
- 57 (58) Maior, magis rugosus. Capite et thorace fortiter et subrugose punctulatis, in thorace intervallis punctorum subrugose elevatis, thorace aspectu granuloso; thorace a latere viso valde convexo, longiore, latitudine illa longitudine solum paullo maiore. Spatio interoculari frontis longitudine et latitudine aequali. Punctis sterniti basalis atque mesosterni et coxarum posteriorum eadem forma et magnitudine. Thorace a latere viso convexiore. Aspectu magis ruguloso, striis et carinulis elytrorum magis elevatis, distinctioribus. New South Wales.

.....24. **Bubastes Australasiae** Obenb.

- 58 (57) Minor, multo nitidior, sculptura capitis et praecipue thoracis multo subtiliore, punctis thoracis aequalibus, intervallis punctorum nullo modo elevatis, planis. Thorace brevior et latior, ante scutellum foveola parva notata. Elytris magis parallelis, magis cylindraceis, versus apicem longius acuminatis, multo subtilius sculptis, sculptura seriali magis superficiali. Spatio interoculari frontis latiore, longitudine circiter $1\frac{1}{4}$ latiore. Punctis sterniti basalis multo densioribus punctis coxarum posteriorum, distincte subtilioribus. Thorace a latere viso solum parum convexo. Aspectu nitidior, magis aequali. Australia borealis.25. **Bubastes septentrionalis** n. sp.
- 59 (56) Elytrorum apice utrimque satis late truncato, dente lateroapicali distinctissimo, oculta. Capite et thorace multo subtilius quam apud *B. Australasiae* Obenb. punctato. Thorace brevi et satis lato. Parte interoculari frontis satis lata, longitudine circiter $1\frac{1}{4}$ latiore.
- 60 (63) Carinis longitudinalibus elytrorum distinctioribus (illos 6—7 suturalibus distinctis), virescentibus, nitidis, angustis. Punctis capitis densis et subtilibus. Corpore supra cupreoaeneo, obscuro. Sculptura striiformi elytrorum distinctiore. Forma robustiore et validiore. Punctis superficiei multo subtilioribus et densioribus. Epistomate multo latius et profundius sinuato. Sternito basali medio subtiliter, satis dense punctato.
- 61 (62) Obscure cupreus, carinulis elytrorum virescentibus, parte laterali thoracis laete rubida. Punctis thoracis lateraliter fortioribus, thorace ipso magis ruguloso, lateribus postice subparallelis, dente lateroapicali elytrorum fortiore, acutiore, ab illo suturali multo magis distante. Corpore subtus obscure cupreo, violaceo iridescente. Tarso-

rum posteriorum articulo basali multo longiore, longitudine articulum secundum distincte superante. Articulo tertio antennarum illo articulo quinto distincte longiore. Elytrorum carinulis virescentibus, punctis purpurascentibus. Corpore longiore. Queensland.

..... 26. **Bubastes Odewahni** Obenb.

- 62 (61) Cupreus, unicolor, elytrorum striis et punctis concoloribus. Punctis thoracis lateraliter subtilioribus, thorace minus ruguloso, lateribus magis rotundatis, concoloribus, dente lateroapicali elytrorum parvo, dentibus ambobus apicalibus magis approximatis. Corpore subtus laete cupreo, nitido. Tarsorum posteriorum articulis primo et secundo longitudine aequalibus. Articulo tertio antennarum et articulo quinto longitudine aequalibus. Australia occidentalis: River Chapman.

..... 27. **Bubastes Chapmani** n. sp.

- 63 (60) Carinis longitudinalibus elytrorum indistinctis, punctis superficiei multo grossioribus, magis confertis, punctis capitis fortibus et minus densis. Forma convexiore, magis cylindracea, postice magis acuminata. Brunneoaeneus, nitidior. Sculptura striiformi elytrorum subevanescente, elytris versus latera grosse et confertim punctatis, punctis hic vere densis et subconfluentibus. Epistomate fere recte truncato, solum medio leviter incise sinuato. Articulis tarsorum brevibus, illis ambobus primis longitudine fere aequali. Articulis tertio et quinto antennarum longitudine aequali. Dente lateroapicali elytrorum valde acuto, distincto. Sternito basali medio fortiter, satis confertim punctato. Corpore subtus cupreoaeneo, nitido. Australia occidentalis: River Carnarvon. 28. **Bubastes Carnarvonensis** n. sp.

- 64 (55) Parte interoculari frontis multo angustiore, latitudine semper longiore; colore superficiei obscure cuprea, sine ullo nitore virescente. Epistomate transverso, recte truncato, haud sinuato.

- 65 (68) Dente lateroapicali elytrorum nullo.

- 66 (67) Oculis desuper visis fortiter prominentibus. Fronte valde angusta et longa, latitudine duplo longiore. Corpore subtus laete coeruleoviolaceo, violascente, valde nitido. Angustior, gracilior, sculptura striiformi elytrorum distinctiore. Sternito basali densius et fortius punctato, punctis mesosterni et coxarum posteriorum simili. Margine elytrorum in regione coxarum posteriorum sinuato, ibidem nullo modo anguloso. New South Wales. 29. **Bubastes Achardi** Obenb.

- 67 (66) Oculis desuper visis nullo modo prominentibus. Fronte minus angusta, latitudine circiter solum $1\frac{3}{5}$ longiori. Corpore subtus obscuro, griseonigro, minus nitido. Robustior, latior, sculptura striiformi elytrorum minus distincta. Sternito basali medio multo subtilius quam coxae posteriores vel mesosternum punctato. Margine laterali elytrorum in regione coxarum posteriorum angulum obtusum efficiente. Queensland. 30. **Bubastes obscurus** Obenb.

- 68 (65) Dente lateroapicali elytrorum praesente vel angulo obtuso distincte indicato.

- 69 (72) Dente lateroapicali elytrorum solum angulo obtuso indicato vel paullo prominente. Abdomine valde inconspicue piloso, fere glabro, pilis minutissimis et sparsis. Spatio interoculari frontis minus angusto.

- 70 (71) Maior: 15.5×4.8 . Thorace et capite confertim, simpliciter, subtiliter

- punctatis. Fronte distincte angustiore et longiore: spatio interoculari frontis latitudine circiter $1\frac{1}{4}$ longiore. Tarsorum posteriorum articulo basali illo articulo sequenti distincte longiore, in elytris carinis planis angustis longitudinalibus laevigatis bene indicatis, quamquam angustulis et parum prominulis. Articulo tertio antennarum illo articulo quinto distincte longiore. Dente externoapicali elytrorum obtuso, apicibus elytrorum in sutura distincte divergentibus. Carina laterali thoracis late curvata atque fere usque ad angulos anticos producta, vere longa. Processu prosternali fortiter sparse punctato. Corpore supra obscure cupreo, subtus laete cupreo, nitido, punctis elytrorum confertis, subtilibus. Australia.....31. **Bubastes Blackburni** n. sp.
- 71 (70) Minor: 12×3.3 . Thorace et capite confertim valde grosse, foveolatim punctatis. Fronte brevior: spatio interoculari longitudine et latitudine fere aequalibus, fronte grosse, foveolatim, sparsius punctata. Tarsorum posteriorum articulo basali et secundo longitudine aequalibus. In elytris carinulis longitudinalibus nullis, striis perparum indicatis, superficie elytrorum tota grossius, confertim, subrugose punctata. Articulo tertio antennarum illo articulo quinto paullulo brevior. Apicibus elytrorum nullo modo divergentibus, dentibus lateroapicatis parvulis obtusis. Carina laterali thoracis recta, brevi, ne in medium quidem longitudinis thoracis producta, partibus lateralibus et epipleuralibus thoracis grossissime foveolatim sculptis. Processu prosternali valde grosse, haud dense punctato. Corpore supra parum nitido, aeneocupreo, lateribus thoracis et elytrorum magis rubidis, corpore subtus pedibusque laete cupreis. Australia bor.....32. **Bubastes Carteri** n. sp.
- 72 (69) Dente lateroapicali elytrorum acuto, distinctissimo, prominente. Abdomine multo distinctius piloso, pilis griseis praecipue lateraliter distinctioribus; spatio interoculari frontis magis angusto.
- 73 (74) Robustior, maior, obscure cupreus, sine nitore violaceo. In elytris solum striis longitudinalibus leviter indicatis, interstitiis nullo modo laevigatis vel obscuratis. Punctis frontis multo grossioribus, minus densis. Dentibus apicalibus elytrorum minus acutis, minus productis. Punctis elytrorum multo confertioribus, densioribus, subaequalibus, subrugulosis. Corpore subtus laete, rubrocupreo, unicolore, nitido, sine ullo nitore violaceo vel cyaneo. Pedibus fortius punctatis. 16×5 mm. Australia.....33. **Bubastes Erbeni** n. sp.
- 74 (73) Gracilior, minus robustus, aspectu nigro vel nigrescente, nitido, fundamento punctorum superficiei, praecipue in parte laterali violaceocupreo, interstitiis punctorum vel serierum elytrorum laevigatis et nigris. Punctis frontis duplo minoribus, confertis, dentibus apicalibus elytrorum valde productis et acutis. In elytris sculptura seriali valde distincta, sulculis angustis, interstitiis praecipue antice satis latis, laevigatis, nigris, nitidissimis, aspectu toto multo nitidior. Punctis elytrorum minus confertis, minus densis; corpore subtus valde nitido, violaceo cupreo, parte apicali sterniti utriusque atque pedibus fortiter laete cyaneoninentibus. Pedibus subtilibus punctatis. 1.5×4 mm. Australia occidentalis.....34. **Bubastes Boisduvali** n. sp.

- 75 (54) Thorace satis magno, sed satis fortiter rotundato atque versus basim distinctissime attenuato. Spatio interoculari frontis longitudine et latitudine circiter aequali. Lateribus thoracis satis late rubrocupreo-marginatis. Obscure aeneus, leviter cupreo- vel viridimicans. Antennis brevissimis, tertiam partem thoracis haud attingentibus. Epistomate valde plane sinuato. Dente lateroapicali elytrorum totaliter absente. Margine laterali elytrorum in regione coxarum posteriorum angulo parvo rotundato notato. Australia occidentalis. 35. **Bubastes Saundersi** Obenb.
- 76 (43) Prosterni margine anteriori linea marginali nulla. Valde obscurus, nigrescens, leviter cupreonitens. Dente lateroapicali elytrorum totaliter absente. Pilositate corporis inferioris fortius adhaerente. Queensland. 36. **Bubastes simillimus** Obenb.
- 77 (78) Thorace lateraliter fortiter rotundato, versus basim distinctissime attenuato. Spatio interoculari frontis longitudine $1\frac{1}{3}$ latiore. Epistomate fortius sinuato. Antennis brevioribus, tertiam partem anteriorem thoracis longitudinis haud attingentibus. Thorace magis globoso, magis convexo, basi thoracis fortius bisinuata, angulo antiscutellari fortiori, angulis posticis thoracis acutioribus, fortius productis. Maior. 37. **Bubastes borealis** Obenb.
- 78 (77) Thorace lateraliter solum parum rotundato, versus basim haud vel solum leviter rotundato; spatio interoculari frontis multo angustiore, longitudine latitudinem haud adaequante. Epistomate solum levissime sinuato. Antennis longioribus, medium thoracis longitudinis attingentibus. Thorace minus convexo, basi thoracis multo minus fortiter bisinuata, sinu antescutellari latiore et minus forti, angulis posticis thoracis minus acuminatis atque versus posticem minus productis. 38. **Bubastes australis** Cast. et Gory.
- Species in certae sedis, mihi ignota.

*

C o n s p e c t u s

Specierum generis *Bubastes* Castelnau & Gory.

1. **Bubastes Leai** Carter. Australia occidentalis
Carter, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales, Vol. XLIX, pars 4, 1904, p. 528.
2. **Bubastes Van Rooni** Obenb. Australia occidentalis
Obenberger, Archiv f. Naturg. Abt. A. 92. Jg., Heft 9—11, 1926
(1928), p. 188, 196, 199.
3. **Bubastes formosa** Carter. Australia occidentalis
Carter, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales, Vol. XL, Part 1, 1915, p. 79.
4. **Bubastes suturalis** Carter. Australia occ. bor.
Carter, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales, Vol. XL, Part 1, 1915, p. 79.
5. **Bubastes Strandii** Obenb. Australia: Croydon
Obenberger, Ann. Soc. Ent. France, LXXXIX, 1920, p. 105, fig. 8.

6. **Bubastes viridicupreus** Obenb. Queensland borealis
Obenberger, l. c. 1922, p. 83, 86.
7. **Bubastes persplendens** Obenb. Australia meridionalis
Obenberger, l. c. 1920, p. 107, fig. 10.
= *splendens* Cart. p. p. non Blackb.
8. **Bubastes sphenoidea** Cast. et Gory. Australia occidentalis
Cast. et Gory, Monogr. Bupr. I. 1836, p. 2, T. 1, fig. 1.
9. **Bubastes splendens** Blackburn. Australia meridionalis
Blackburn, Trans. Roy. Soc. S. Austral. 1891, p. 294.
10. **Bubastes occidentalis** Blackburn. Australia occid. et mer.
Blackburn, l. c. p. 293.
11. **Bubastes vagans** Blackburn. Australia meridionalis
Blackburn, l. c. 1892, p. 212.
12. **Bubastes bostrychoides** Théry. Australia
Théry, Mém. Soc. Ent. Belg. Vol. XVIII. 1910, p. 17 (Neraldus).
13. **Bubastes olivinus** Obenb. Australia occidentalis
Obenberger, l. c. 1920, p. 99, fig. 1.
= *bostrychoides* Carter, non Théry, l. c. 1924, p. 528, (nota).
14. **Bubastes cylindricus** M'Leay. Australia occidentalis
M'Leay, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales, Vol. III, 1888, p. 1228.
15. **Bubastes globicollis** J. Thoms. Queensland
J. Thomson, Typi Bupr. Mus. Thoms., app. Ia, 1879, p. 14.
16. **Bubastes euryaspiloides** Obenb. Wolfram Camp. Australia
Obenberger, l. c. 1922, p. 82 (sub: *cylindricus* var.)
var. **crassulus** Obenb. Archiv f. Naturg. Abt. A, 92.Jg., Heft 9—11,
1926 (1928), p. 192. Australia
= *cylindricus* Obenb. (non M'Leay) l. c. 1920, p. 100, fig. 2.
17. **Bubastes aeneus** Obenb. Queensland
Obenberger, l. c. 1922, p. 83, 86.
18. **Bubastes niveiventris** Obenb. Queensland
Obenberger, l. c. 1922, p. 82, 85.
19. **Bubastes Germari** Obenb. Australia occidentalis
Obenberger, l. c. 1926 (1928), p. 200.
20. **Bubastes Kirbyi** Obenb. Australia
Obenberger, l. c. 1926 (1928), p. 200—201.
21. **Bubastes inconsistans** J. Thoms. Australia meridionalis
J. Thomson, l. c. 1879, p. 14.
= *inconstans* Blackb. N. W. Victoria
Blackburn, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales, III. 1888, p. 1414.
22. **Bubastes Thomsoni** Obenb. Queensland borealis
Obenberger, l. c. 1926 (1928), p. 201.
= *inconsistans* Obenb. (non J. Thoms.) l. c. 1920, p. 102, fig. 4.
23. **Bubastes laticollis** Blackb. Australia occidentalis
Blackburn, l. c. 1888, p. 415.
24. **Bubastes Australasiae** Obenb. New South Wales
Obenberger, l. c. 1922, p. 82, 86.

25. *Bubastes septentrionalis* n. sp.

Hab.: Australia borealis. Long.: 18, lat.: 5.5 mm.

Species elongata, cylindrica, parallela, convexa, sericea, parum nitida, obscura, unicolor. Capite convexo, desuper viso nullo modo impresso, subgloboso, oculis nullo modo prominulis. Fronte nullo modo excavata, lateribus frontis versus anticem leviter subdilatis, punctura frontis et thoracis densa, satis subtili, conferta, simplici. Antennis brevibus, nigrocupreis, articulis 3, 4, 5 fere eadem longitudine. Spatio interoculari frontis longitudine circiter $1\frac{1}{4}$ latiore. Thorace lato, regulariter et aequaliter convexo, usque ad medium parallelo, dein versus anticem regulariter arcuatim rotundato, a latere viso parum convexo, ante scutellum foveola parva notato, confertim subtiliter, versus latera fortius punctato, carina laterali arcuata, longa, fere usque ad angulum antenorem producta, prosterno antice marginato, processu prosternali satis fortiter, sed sparse punctato. Elytris parallelis, cylindratis, versus apicem satis longe acuminatis, densissime punctatis, sculptura subtili, subaequali, striis vestigialibus, interstitiis solum antice in parte discali paullo indicatis, apicibus subacutis, dente suturali breviter subrotundato, dente lateroapicali nullo. Corpore subtus nigro-brunneo, convexo, satis nitido, subtiliter, aequaliter punctato, sparse, adhaerenter, inconspicue obscure piloso, pilis adhaerentibus, punctis sterniti basalis multo quam in coxis posterioribus densioribus; tarsorum posteriorum articulo basali longitudine articulum sequentem leviter superante.

26. *Bubastes Odewahni* Obenb. Queensland
Obenberger, l. c. 1926 (1928), p. 201.**27. *Bubastes Chapmani* n. sp.**

Hab.: Australia occidentalis: River Chapman. Long.: 19.5, lat.: 5.5 mm.

Species robusta, elongata, cylindrica, convexa, crassula. Cupreus, unicolor, elytrorum striis bene indicatis, sed interstitiis concoloribus. Capite valde convexo, desuper viso globulari, oculis nullo modo lateraliter prominentibus, fronte lata, nullo modo excavata, spatio frontis interoculari versus anticem leviter dilatato, longitudine et latitudine fere aequali, valde dense subtiliter punctato, epistomate late sinuato. Antennis brevibus, articulo tertio et illo quinto longitudine-aequalibus. Thorace convexo, lato, longitudine circiter $1\frac{1}{4}$ latiore, in medio summum latitudinis attingente, aequaliter convexo, lateribus rotundatis, versus basim solum leviter versus anticem fortiter rotundatim attenuatis, aequaliter, vere dense, satis fortiter punctato, ante scutellum foveola parva rotunda signato, carina laterali recta, brevi, acuta, versus anticem solum usque circiter $\frac{3}{5}$ posteriores producta. Prosterno antice marginato, confertim satis fortiter punctato, processu prosternali dense et satis subtiliter punctato. Elytris robustis et parallelis, subtiliter et superficialiter circiter decemsulcatis sulculis lateralibus subobliteratis, interstitiis haud laevigatis, solum sparsius punctatis, angustis. Elytris apice dente suturali acuto atque dente brevi lateroapicali munitis. Sculptura elytrorum densa, aequali, conferta. Corpore subtus laetius cupreo, nitidiore, inconspicue, satis sparse, adhaerenter obscure piloso, abdomine convexo. Tarsorum posteriorum articulo basali articulum secundum longitudine haud superante.

28. Bubastes Carnarvonensis n. sp.

Hab.: Australia occidentalis: River Carnarvon. Long.: 17, lat.: 5 mm.

Species convexa, cylindracea, satis nitida, leviter sericea, postice valde acuminata. Brunnneo-aeneus, unicolor, corpore subtus nitidior. Capite convexo, globulari, oculis desuper visis nullo modo prominentibus; epistomate fere recte truncato, medio solum leviter incise sinuato. Fronte nullo modo concava vel depressa, parte interoculari frontis longitudine paullo latiore, lateribus versus anticem leviter dilatatis, capite et thorace dense et fortiter, confertim punctatis, punctis superficiei totius grossis, sed aequalibus; thorace aequaliter convexo et sculpto, a latere viso nullo modo gibbiformi vel convexo, longitudine circiter $1\frac{1}{3}$ latiore, usque fere ante medium parallelo, dein versus angulos anticos arcuatim attenuato, margine antico fere recte truncato, carina laterali leviter sinuata atque usque ad tertiam partem anteriorem distincta, dein evanescente; prosterno antice recte truncato et marginato, processu prosternali dense et fortiter punctato; scutello parvo, elytris latitudine triplo longioribus, parallelis, versus apicem satis longe attenuatis, apice nullo modo divavicato, dente suturali acuto, dente lateroposteriori parvo, sed distincto et acuto, elytris confertim, satis fortiter, dense punctatis, punctis versus latera densioribus, sculptura seriali parum distincta, sulculis parum indicatis, interstitiis nullo modo laevigatis, indistinctis, punctis lateraliter subconfluentibus. Corpore subtus aeneocupreo, nitido, dense satis subtiliter punctato, abdomine convexo, sparse, inconspicue, griseopiloso, sternito, basali medio dense et satis fortiter punctato. Tarsorum posteriorum articulo basali et secundo longitudine aequalibus, antennis brevibus, aeneis, antennarum articulis 2, 3, 4 longitudine subaequalibus.

29. Bubastes Achardi Obenb......New South Wales
Obenberger, l. c. 1920, p. 104, fig. 6.**30. Bubastes obscurus Obenb.**.....Queensland bor.
Obenberger, l. c. 1922, p. 83, 86.**31. Bubastes Blackburni n. sp.**

Hab.: Australia. Long.: 15.5, lat.: 4.8 mm.

Species elongata, cylindracea, convexo, subtiliter, sculpta, sericeomicans, cuprea, satis nitida. Capite et thorace confertim, simpliciter punctatis, punctis his mediocribus; punctis elytrorum illis thoracis triplo subtilioribus. Capite lato, convexo, oculis desuper visis leviter prominentibus; epistomate leviter sinuato. Spatio interoculari frontis latitudine circiter $1\frac{1}{4}$ longiore. Fronte plana, nullo modo excavata vel impressa. Antennis satis longis, gracilibus, articulo tertio antennarum illo articulo quinto distincte longiore. Thorace longitudine circiter $1\frac{1}{4}$ latiore, usque versus medium parallelo, dein versus anticem arcuatim attenuato, angulis posticis, acutis et satis productis, carina laterali leviter arcuata et usque ad fere angulos anticos producta; prosterno antice marginato, processu prosternali satis dense punctis mediocribus punctato. Elytris latitudine $2\frac{2}{3}$ longioribus, parallelis, iam a medio versus apicem longe attenuatis, apice breviter bidentato, dente externo parvo et subobtusio, apice suturali leviter divaricato;

superficie elytrorum densissime, subtilissime punctulata, striis satis distinctis, interstitiis angustis, antice et in parte discali distinctioribus, laevigatis; corpore subtus laete cupreo, nitido, fere inconspicue, sparse piloso; tarsorum posteriorum articulo basali illo articulo sequenti distincte longiore. Memoriae Dom. Blackburn, entomologo atque faunae Australiae investigatori experto in honorem denominatus.

32. Bubastes Carteri n. sp.

Hab.: Australia bor. Long.: 12, lat.: 3.3 mm.

Species convexa, elongata, parallela, subcylindrica, satis gracilis, sericeo-micans, parum nitida, aeneocuprea, lateribus thoracis et elytrorum magis rubidis, corpore subtus pedibusque laete cupreis. Capite convexo, satis lato, oculis lateraliter (desuper visis) paullulo prominentibus. Thorace et capite valde grosse, foveolatim, aequaliter punctatis, punctis elytrorum illis thoracis plus quam duplo subtilioribus. Fronte plana, nullo modo excavata vel impressa, brevi, spatio interoculari longitudine et latitudine fere aequalibus, epistomate solum leviter, late sinuato. Thorace longitudine circiter $1\frac{1}{6}$ longiore, usque ad tertiam partem anteriore parallelo, dein versus angulos anticos leviter suboblique attenuato, aequaliter convexo, valde grosse punctato, carina laterali obliqua, brevi, medium longitudinis thoracis haud attingente. Elytris latitudine circiter triplo longioribus, parallelis, versus apicem longe attenuatis, apicibus breviter obtuse utrimque bidentatis, dente externo valde obtuso et parum conspicuo. Superficie aequaliter convexa, interstitiis, elytrorum cariniformibus nullis, his omnibus oblitalis, sulculis longitudinalibus solum leviter indicatis, superficie elytrorum tota grosse, versus latera subrugose punctata. Apicibus elytrorum nullo modo divergentibus. Processu prosternali valde grosse, haud dense punctato. Corpore subtus pedibusque laete cupreis, tarsorum posteriorum articulo basali et secundo longitudine aequalibus. Antennis brevibus, articulo tertio illo articulo quinto paullulo brevior.

In honorem Dom. H. J. Carter, entomologo, de investigatione faunae Coleopterorum Australiae optime merito, in honorem denominatus.

33. Bubastes Erbeni n. sp.

Hab.: Australia. Long.: 16, lat.: 5 mm.

Species elongata, modice robusta, postice subacuminata, convexa, cylindracea, satis obscure cuprea, subtus laetius cuprascens et nitidior. Capite lato, oculis desuper visis lateraliter leviter prominulis, fronte desuper visa medio leviter concava, subdepressa; fronte satis sparse, grosse punctata, epistomate late sinuato. Antennis nigroaeneis, modice longis, articulis 3, 4, 5 longitudine subaequalibus. Thorace longitudine circiter $1\frac{1}{4}$ latiore, usque fere ad tertiam partem anteriorem parallelo, dein versus anticem rotundatim attenuato, superficie aequaliter convexa, supra subplana, fortiter dense punctata, carina laterali recta atque usque ad medium thoracis longitudinis producta; prosterno antice marginato, processu prosternali sparse, sed fortiter punctato. Elytris latitudine $2\frac{2}{3}$ longioribus, versus apicem longe attenuatis, apicibus gracilibus, distincte bidentatis, dente suturali brevi, dente lateroposteriori acuto, sed parum producto, superficie elytrorum confertim punctis satis subtilibus (illis thoracis circiter duplo

minoribus) tecta, striis longitudinalibus valde indistinctis, vestigialibus, interstitiis nullo modo laevigatis. Corpore subtus laete rubrocupreo, unicolore, sine ullo nitore violaceo vel cyaneo, sparse pilis griseis, versus latera magis condensatis, adhaerentibus tecto. Tarsorum posteriorum articulo basali illo secundo distincte longiore.

Dom. E r b e n, viatori bohémico, in honorem denominatus.

34. Bubastes Boisduvali n. sp.

Hab.: Australia occidentalis. Long.: 14.5, lat.: 4 mm.

Species obscura, nitida, purpureoiridescens; superficie nigra et in intervallis punctorum laevigata, punctis ipsis cupreoviolascentibus. Convexus, elongatus, parallelus, postice longe attenuatus; capite lato, oculis lateraliter satis prominulis, desuper e magna parte visibilibus, fronte angusta, desuper visa distincte concava et plane longitudinaliter impressa, spatio interoculari frontis latitudine $1\frac{1}{3}$ longiori, parallelo, epistomate late sinuato. Antennis satis longis et gracilibus, articulis 3, 4, 5 longitudine subaequalibus. Prosterno marginato, processu prosternali medio satis sparse, sed satis subtiliter punctato. Punctis frontis densis, subtilibus, thorace longitudine circiter $1\frac{1}{4}$ latiore, lateribus usque ad tertiam partem anteriorem parallelis, dein versus anticem arcuatim attenuatis, dorso subplano, ante scutellum foveola rotunda notato, vere dense, medio subtilius, versus latera fortiter punctato, carina laterali subsinuata, atque fere ad angulos anticos producta. Elytris latitudine circiter $2\frac{2}{3}$ longioribus, parallelis, convexis, iam a medio longitudinis versus apicem longe attenuatis, apicibus acute bidentatis, superficie dense, confertim, subtiliter punctulata, sulculis longitudinalibus parum profundis, sed distinctis, intervallis sublaevigatis, angustis, praecipue antice laevigatis et nigris, distinctis. Corpore subtus valde nitido, violaceocupreo, parte apicali sterniti utriusque, pedibus fortiter laete cyaneonitentibus. Pedibus subtiliter punctatis. Tarsorum posteriorum articulo basali et secundo longitudine aequalibus.

Memoriae entomologi Dom. Boisduval, qui in opere suo »Voyage d'Astrolabe« primo nonnullas Buprestidarum Australiae species descripsit, in honorem denominatus.

35. Bubastes Saundersi Obenb. Australia occidentalis
Obenberger, l. c. 1926 (1928), p. 202.

36. Bubastes simillimus Obenb. Queensland
Obenberger, l. c. 1922, p. 81, 84.

37. Bubastes borealis Obenb. Queensland
Obenberger, l. c. 1926 (1928), p. 202.
= *globicollis* Obenb. (non J. Thoms.) l. c. 1920, p. 105, fig. 7.

38. Bubastes australis Cast. et Gory. Australia
Cast. et Gory, Monogr. Bupr. II. 1839, p. 34, T. 9, fig. 52
(*Sphenoptera*).