

207.

Dr. Karel Všečeka:

**NOVÁ RASSA OD BEMBIDIUM DALMATINUM DEJ.
(COL. CARABIDAE.)**

**EINE NEUE RASSE DES BEMBIDIUM DALMATINUM DEJ.
(COL. CARABIDAE.)**

Na různých místech jižní Syrie, Libanonu a v Palestině sbíral jsem *Bemb. dalmatinum*, které ve srovnání s dosud známými formami tohoto druhu nekrylo se plně se žádnou z nich. Podrobnější studium ukázalo, že jde o novou rasu, která je jakýmsi spojovacím článkem mezi formou nominální a severoafriickým *B. dalmatinum Dudichi* Cs. (= *africanum* Net.). Protože v uvedené oblasti, pokud mohl jsem zjistiti, vyskytuje se *B. dalmatinum* jedině a výhradně ve zmíněné formě, má tudíž tato stejný nárok na samostatné označení, jako ostatní rasy dříve již známé. Podle místa výskytu navrhuji pro ni název:

***Bembidium (Peryphus) dalmatinum levantinum* n. ssp.**

Nová forma shoduje se zbarvením povrchu, noh, tykadel, a makadel s *B. dalm. Dudichi* Cs. Liší se však krovkami mnohem jemněji tečkovaně rýhovanými, při čemž oči jsou větší a vypouklejší než je tomu u této rasy. Moje kusy pocházejí od Damašku (Syrie), Hamany, Chtaury (Libanon) a Haify (Palestina).

Rozdílnost *B. dalm. levantinum* n. ssp. ve srovnání s ostatními jednobarevnými rasami druhu, vysvitne nejlépe z připojené tabulky:

- | | | |
|---------|---|--------------------------------------|
| 1 (12) | Krovky kovově modré, jednobarevné. | |
| 2 (9) | Stehna alespoň částečně černě zbarvená. | |
| 3 (4) | Oči plošší (Kavkaz). | dalmatinum fraxator Mén. |
| 4 (3) | Oči vypouklejší. | |
| 5 (6) | Stehna, vyjímaje kolena, celá černá. (Abruzzy). | dalmatinum fuliginosum Net. |
| 6 (5) | Stehna jen u kořene černě zbarvená. | |
| 7 (8) | Rýhy krovečné jemnější. (Balkán a přilehlé oblasti, — nejzápadnější naleziště Pola, nejsevernější Párkány.) | dalmatinum dalmatinum Dej. |
| 8 (7) | Rýhy krovečné zřetelně hrubší (sev. Istrie, Itálie, Francie). | dalmatinum latinum Net. |
| 9 (2) | Stehna celá červenožlutá. | |
| 10 (11) | Rýhy krovečné jemné (Syrie, Libanon, Palestina). | dalmatinum levantinum n. ssp. |
| 11 (10) | Rýhy krovečné hrubé. (Tunis, Alžír, Španělsko, již. Francie.) | dalmatinum Dudichi Cs. |
| 12 (1) | Krovky kovově modré, před špicí po jedné červenožluté skvrně. (Kavkaz, Persie, Armenie.) | dalmatinum Haupti Rtt. |
| | (Anatolie.) | dalmatinum lacrimans Net. |

Bembidium (Peryphus) dalmatinum levantinum n. ssp.

Mit *B. dalm. Dudichi* Cs. (= *africanum* Net.) in der Färbung der Oberseite, der Füße, Fühler und Palpen übereinstimmend. Die Flügeldecken jedoch mit viel feineren Punktstreifen. Die Augen sind grösser und noch gewölbter als bei *B. dalm. Dudichi*. Die neue Form sammelte ich in Syrien (Damaskus), Libanon (Chtaura, Hamana) und Palästina (Haifa).

Von den übrigen einfärbigen Rassen des *B. dalmatinum* ist *B. dalm. ssp. levantinum* folgendermassen zu trennen:

- 1 (12) Flügeldecken einfärbig metallisch blau.
 - 2 (9) Schenkel wenigstens teilweise schwarz.
 - 3 (4) Augen flacher. (Kaukasus.) **dalmatinum fraxator** Mén.
 - 4 (3) Augen gewölbter.
 - 5 (6) Schenkel mit Ausnahme der Spitze schwarz. (Abruzzen.)
..... **dalmatinum fuliginosum** Net.
 - 6 (5) Schenkel nur in der Basalhelfte geschwärzt.
 - 7 (8) Flügeldeckenstreifen feiner. (Balkanhalbinsel und anschliessendes Gebiet, — westwärts bis Pola, nördlich bis Párkány.)
..... **dalmanitum dalmatinum** Dej.
 - 8 (7) Flügeldeckenstreifen merklich gröber. (Nordstrien, Italien, Frankreich.) **dalmatinum latinum** Net.
 - 9 (2) Schenkel einfärbig rötlichgelb.
 - 10 (11) Flügeldeckenstreifen fein. (Syrien, Libanon, Palästina.)
..... **dalmatinum levantinum n. ssp.**
 - 11 (10) Flügeldeckenstreifen grob. (Tunis, Algier, Spanien, Südfrankreich.)
..... **dalmatinum Dudichi** Cs.
 - 12 (1) Flügeldecken metallisch blau mit je einem rötlichgelben Fleck vor der Spitze. (Kaukasus, Persien, Armenien.)
..... **dalmatinum Haupti** Rtt.
und (Anatolien.) **dalmatinum lacrimans** Net.
-