

Doc. Dr. J. Obenberger:

## DE NOVIS GENERIS TAPHROCERUS SOL. SPECIEBUS.

### NOVÉ DRUHY KRASCŮ Z RODU TAPHROCERUS SOL.

V roce 1924 v tomto Sborníku uveřejnil jsem revisi rodu *Taphrocerus*. Už ale v roce 1934, tedy za deset let, byl jsem nucen (Sborník ent. odd. Praha XII, 94, 1934, p. 5—62) uveřejniti nové zpracování tohoto rodu, což bylo nutno už s ohledem na četné nové druhy, které mezitím se objevily a pak pro některé drobné změny v nazírání systematickém. Průběhem času v nově získávaných materiálech nalezl jsem ještě další nové a neznámé, z části velmi zajímavé druhy a v této práci podávám jejich diagnosy.

Rod *Taphrocerus* obsahuje vesměs drobné, podlouhlé, neotropické krasečky celkem velmi uniformního vzhledu, které jsou velmi úzce spojeny s rody *Brachys* a *Cylindromorphoides* rovněž z neotropické oblasti, a které ve střední a jižní Americe zastupují rod *Aphanisticus* ze Starého Světa. Systematika těchto druhů je značně složitá a nesnadná. Velmi mi posloužilo, že mohl jsem soustřediti skoro všechny známé druhy ve své sbírce, takže bylo lze celkem velmi přesně zařaditi i takové druhy, jejichž postavení jinak mohlo by se zdáti nejistým. Tato zvířata žijí v pralesích a savanách na listech různých rostlin a často se vyskytují hromadně.

In opusculo hoc meo diagnoses specierum novarum generis *Taphrocerus* dono. Cuius generis monographiam loco hoc (Sborník Ent. odd. Praha XII, 94, 1934, p. 5—62) editam apud species describendas in contradictionibus citatis indico. Species generis *Taphrocerus* una cum generibus *Brachys* et *Cylindromorphoides* in foliis plantarum diversarum regionis neotropicae vivunt atque saepe frequenter inveniuntur.

#### *Taphrocerus carinulosus* n. sp.

Long.: 3.4, lat.: 1 mm. Hab.: Amazonas.

Corporis forma satis robusta, elongata. Aspectu valde nitido. Colore corporis supra nigerrimo. Corpore subtus nigro, nitido. Fronte desuper visa haud impressa. Pubescentia corporis alba, in elytris in tertia parte praeapicali fasciam rectam efficiente. Capite ampliato, robusto, fronte desuper visa fere plana, oculis magnis, parum prominulis. Fronte sparse griseopilosa, valde lata, subtiliter punctata, epistomate glabro, latissimo, parte interoculari frontis longitudine  $1\frac{2}{3}$  latiori, lateribus versus anticem leviter obliquatis. Temporibus satis longis, diametro longitudinali temporis illo diametro oculi solum circiter duplo brevior. Antennis ab articulo quinto (incl.) serratis nigris, satis angustis, e articulis 10 compositis. Antennarum articulo tertio illo quarto aequali. Thorace longitudine circiter  $2\frac{1}{4}$  latiori, summum latitudinis paullo post medium longitudinis attingente, margine anteriori recte truncato, disco satis convexo. Superficie nitidissima. Thoracis sculptura e punctis sparsis areolatis composita. Thorace ante basim late profunde, suboblique, transverse depresso, ante apicem subtilius transverse impresso. Carina praehumerali thoracis in distincta. Carina laterali (marginali) sinuata. Carina submarginali antice ab illa laterali satis distante. Scutello satis magno. Elytris latitudine baseos circiter  $2\frac{1}{2}$  longioribus, thorace capiteque unitis circiter  $2\frac{1}{2}$  longioribus, a  $\frac{2}{5}$  an-

terioribus versus apicem longe attenuatis, summum latitudinis circiter in  $\frac{2}{5}$  anterioribus attingentibus, valde nitidis, dorso subplano; elytris satis grosse, satis superficialiter foveolato punctatis, sculptura hac iam in medio longitudinis subevanescente, humeris satis elevatis. Carina humerali elytrali elytrorum sinuata, distinctissima, longa, a basi fere usque ad apicem prolongata. Apice elytrorum satis anguste, conjunctim rotundato. Margine lateroapicali integro, nullo modo serrato. Ornamento elytrorum e fascia transversa recta praeapicali in tertia parte apicali posita atque utrimque e punctis tribus pilosis vagis in medio longitudinis positis composito. Corpore subtus nitidissimo. Abdomine satis convexo. Pedibus modice longis.

**Observatio:** Propter carinam longam, formam robustam etc. facile dignoscendus. In tabella mea generis huius (l. c.) prope illum *T. simillimum* Obenb., — contradictiones 48 (47) locandus.

### **Taphrocerus Šusterai n. sp.**

Long.: 4, lat.: 1.2 mm. Hab.: Costa Rica: Tucurrique.

Corporis forma gracili, postice acuminata. Aspectu nitidissimo, glabro. Colore corporis supra in capite, thorace, scutello aeneo, in elytris laete cyaneo. Corpore subtus nigro, nitido. Pubescentia corporis supra et subtus nulla. Capite satis magno, satis producto, oculis leviter prominulis. Fronte desuper visa medio distincte canaliculata. Parte interoculari frontis longitudine fere  $1\frac{3}{4}$  latiori, lateribus versus anticem leviter attenuatis, clypeo latissimo, brevi. Diametro (breviori) transverso oculi longitudinem temporis (postocularis) plus quam triplo maiore. Antennis nigris. Thorace longitudine circiter  $2\frac{1}{2}$  latiori, summum latitudinis in tertia parte basali attingente, margine anteriori recte truncato, in tertia parte basali subanguloso, disco modice convexo, postice haud, antice late arcuatim, superficialiter impresso. Thoracis sculptura e punctis sparsis satis subtilibus composita. Thoracis lateribus in parte basali fere parallelis, dein subangulosis et versus anticem oblique, fere recte angustatis et attenuatis. Carina praehumerali thoracis nulla. Carina laterali (marginali) postice satis sinuata. Carina submarginali ab illa laterali antice satis distante. Scutello aeneo, lato subcordiformi. Elytris latitudine baseos circiter  $2\frac{1}{2}$  longioribus, thorace capiteque unitis circiter  $2\frac{2}{3}$  longioribus, a  $\frac{2}{5}$  anterioribus versus apicem longe, recte attenuatis, summum latitudinis circiter in  $\frac{2}{5}$  anterioribus attingentibus, valde nitidis, seriatim foveolato punctatis, sculptura hac iam ante medium subevanescente, lateribus antice leviter sinuosis, disco satis plano. Humeris satis elevatis. Carina humerali elytrali longa, satis acuta, a basi usque fere ad apicem distincta. Apice elytrorum anguste separatim rotundato, valde distincte denticulato. Margine lateroapicali solum postice denticulato. Ornamento elytrorum fere invisibili — elytris aspectu glabro, solum in quarta parte apicali pilis aliquot parum distinctis griseis, fasciam vagam flexuosam transversam efficientibus.

**Observatio:** In honorem Dom. Clarissimi Oldřich Šustera, hymenopterologi excellentissimi, de systemate Psammocharidarum quam maxime merito animo amicali denominatus. Species haec in tabella mea citata prope *T. agriliformem* Obenb. (contradictiones 13 [14]) locanda est. Species iam propter colorem vere facile dignoscenda.

**Taphrocerus catacaustus n. sp.**

Long.: 3.2, lat.: 0.9 mm. Hab.: Manaos (Brasilia).

Corporis forma satis gracili, elongata. Aspectu nitido, satis laevi. Colore corporis supra nigerrimo, nitido. Corpore subtus nigro, nitido. Pubescentia corporis solum in ornamento vago griseo elytrali praesente. Capite satis magno, oculis convexis, leviter prominulis, medio antice leviter plane impresso. Fronte satis brevi, subalutacea, sparse, irregulariter, parum conspicue griseopilosa, parte interoculari frontis longitudine  $1\frac{1}{2}$  latiori, lateribus leviter sinuatis. Temporibus a latere observatis brevibus, diametro oculi brevi longitudinem temporum quadruplo superante. Antennis nigris. Thorace longitudine circiter  $2\frac{1}{2}$  latiori, summum latitudinis in tertia parte basali attingente, margine anteriori fere recte truncato, disco utrimque ante basim oblique depresso, post marginem anteriorem leviter transverse impresso, utrimque in basi leviter foveolato. Carina praehumerali thoracis indistincta. Carina laterali (marginali) a latere visa leviter sinuata. Scutello parvulo, nigro. Elytris latitudine baseos circiter  $2\frac{1}{2}$  longioribus, thorace capiteque unitis circiter  $2\frac{2}{3}$  longioribus, a basi usque ad medium sinuatis, dein versus apicem longe attenuatis, summum latitudinis circiter paullo ante medium attingentibus, valde nitidis. Carina longitudinali costiformi elytrorum a basi fere usque ad apicem distincta, acuta. Humeris satis elevatis. Apice elytrorum satis angusto, conjunctim rotundato. Margine lateroapicali elytrorum leviter serrato. Ornamento elytrorum e fascia vaga flexuosa interrupta in elytrorum longitudine media atque e fascia praeapicali obliqua, in tertia parte posteriori posita, ambobus valde vagis et e pilis griseis compositis formata. Elytris foveolatim seriatim punctatis, sculptura hac poste medium subevanescente, postice indistincta. Pedibus nigris.

Observatio: Species haec nova prope *T. simillimum* Obenb. (l. c. sub contradictionibus 48 (47) locanda est.

**Taphrocerus inusitatus n. sp.**

Long.: 3.7, lat.: 1 mm. Hab.: Cayenne.

Corporis forma elongata, satis gracili. Aspectu satis nitido. Colore corporis supra cupreo, satis nitido, capite et thorace paullo, propter superficiem alutaceam sericeonitidis. Superficie tota pilis sparsis, brevibus, albosericeis, irregulariter tecta. Corpore subtus cupreo, nitido. Pubescentia corporis sparsa, parum conspicua. Capite valde lato, magno, fronte desuper visa solum paullo impressa. Fronte lata, medio lineatim impressa, sparse albo pubescente, parte interoculari frontis longitudine  $1\frac{2}{3}$  latiori, lateribus rectis et fere parallelis. Temporibus satis longis, diametro brevi oculorum longitudinem temporum solum circiter  $2\frac{1}{2}$  superante. Antennis brevibus, nigris. Thorace longitudine circiter duplo latiori, summum latitudinis in basi summa attingente, margine anteriori recte truncato, lateribus fere satis, disco antice solum leviter transverse depresso, ante basim utrimque leviter foveolato, parte media fere aequali, impressionibus lateralibus superficialibus. Carina praehumerali nulla, in loco carinae haec superficie solum leviter pliciformi. Carina laterali (marginali) sinuata. Scutello parvo, cupreo. Elytris latitudine baseos circiter triplo longioribus, thorace capiteque unitis circiter  $2\frac{1}{2}$  longioribus, a basi usque ante mediam sinuatis, dein versus apicem longe attenuatis, summum latitudinis circiter in parte basali summa attingentibus, satis nitidis, modice convexis, punctatis, sculptura hac foveolato-seriata in parte apicali diminuta, sed bene distincta. Carina longitudinali costiformi elytrorum nulla. Humeris. Ornamento elytro-

rum e fascia vaga media flexuosa subinterrupta atque fascia praeapicali simili griseis composito. Elytris vage, breviter, sparse albopilosis. Parte elytrali inter ambo fascias elytrales paullo magis nitida.

**Observatio:** Species haec nova prope speciem *T. sulcifrons* Fisher (l. c. contradictiones 108 [109]) locanda est.

***Taphrocerus pseudovolitans* n. sp.**

Long.: 3.8, lat.: 1.1 mm. Hab.: Brasilia: Santa Catharina.

Corporis forma modice robusta, elongata. Aspectu valde nitido. Colore corporis supra olivaceoaeneo, parte apicali elytrorum (ab illa fascia media interrupta) magis violascente. Corpore subtus obscure aeneo, nitido. Pubescentia corporis grisea, vaga, sparsissima, fere indistincta, solum in elytris ornamenta efficiente. Capite valde lato, fronte desuper visa valde distincte impressa, oculis modice prominulis. Fronte valde lata, sparse punctata et vage, sparse griseo-pilosa, medio impressa, alutacea, parte interoculari frontis longitudine  $1\frac{1}{3}$  latiori, lateribus leviter sinuatis. Diametro brevi oculorum longitudine longitudinem temporum solum duplo superante. Antennis ab nigris. Thorace longitudine circiter  $2\frac{1}{4}$  latiori, summum latitudinis in quarta parte basali attingente, margine anteriori recte truncato, lateribus obliquis, disco post anticem et ante basim transverse depresso, parte basali thoracis brevi subparallela, lateribus versus anticem fortiter attenuatis. Carina praeumerali nulla. Carina laterali (marginali) postice sinuata. Scutello laevi, aeneo. Elytris latitudine baseos circiter  $2\frac{1}{2}$  longioribus, thorace capiteque unitis circiter  $2\frac{2}{3}$  longioribus, a basi usque ante medium sinuatis, dein versus apicem longe attenuatis, summum latitudinis circiter in basi attingentibus, valde nitidis, supra satis deplanatis, vage, irregulariter, haud fortiter seriato punctatis, punctis versus apicem diminutis et subevanescentibus, punctura postice fere indistincta. Spatio inter ambo fascias elytrales magis violascente, magis nitido. Carina longitudinali costiformi elytrorum nulla. Apice elytrorum anguste conjunctim rotundato. Margine lateroapicali distincte serrulato. Ornamento elytrorum e fascia valde flexuosa, in medio longitudinis elytrorum posita, in maculas tres divisa atque e fascia recta transversa praeapicali, ambobus e pilis griseis compositis formato.

**Observatio:** Species haec prope *Taphroc. grossum* Obenb. (l. c., contradictiones 158 [157]) locanda est.

***Taphrocerus Erbeni* n. sp.**

Long.: 3.1, lat.: 0.8 mm. Hab.: Venezuela (Dom. Erben legit.).

Corporis forma elongata, angusta. Aspectu glabro, nitido. Colore corporis supra nigroaeneo, nitido, pilis nullis. Corpore subtus nigro, nitido. Capite valde lato, glabro, fronte desuper visa medio distincte impressa, oculis satis convexis. Fronte medio impressa, glabra, superficialiter, vere sparse punctata, parte interoculari frontis longitudine  $1\frac{1}{2}$  latiori, lateribus oblique versus anticem attenuatis. Diametro brevi oculorum longitudine temporum longitudinem fere quadruplo superante. Antennis nigroaeneis. Thorace longitudine circiter  $2\frac{1}{4}$  latiori, summum latitudinis in tertia parte basali attingente, margine anteriori recte truncato, lateribus rectis, attenuatis, disco utrimque, late oblique depresso, post marginem anteriorem anguste transverse impresso, parte brevi basali subparallela. Superficie vage et irregulariter sparse punctata. Carina praeumerali nulla. Carina laterali postice sinuata. Scutello subcordiformi. Elytris latitudine baseos circiter  $2\frac{2}{3}$  longioribus, thorace capiteque unitis circiter  $2\frac{1}{2}$

longioribus, a basi usque ante medium sinuatis, ibi subdilatatis, dein versus apicem longe recte attenuatis, summum latitudinis circiter in parte basali attingentibus, satis nitidis, seriatopunctatis, punctura hac antice foveoliformi et forti, versus apicem evanescente. Carina longitudinali costiformi elytrorum nulla. Humeris modice elevatis. Apice elytrorum anguste separatim rotundato. Margine lateroapicali postice distincte serrato. Ornamento elytrorum nullo.

**Observatio:** Dom. Erben, investigatori bohémico atque de entomologia Musaei Pragae bene merito in honorem denominatus. Species haec prope illum *Taphr. riparium* Obenb. (l. c., contradictiones 305 [306]) locanda est.

### **Taphrocerus tetragraptus n. sp.**

Long.: 2.9, lat.: 0.8 mm. Hab.: Costa Rica: Raventazon.

Corporis forma satis gracili, modice elongata. Aspectu nitido. Colore corporis supra nigerrimo, ornamentis elytrorum pilis albosericeis compositis. Corpore subtus nigro, nitido. Pubescentia corporis supra solum in ornamentis distincta, partibus alteris glabris. Capite magno, valde lato, fronte desuper visa distincte medio impressa. Fronte satis angusta, medio impressa, oculis modice convexis, modice prominulis, parte interoculari frontis longitudine solum  $1\frac{1}{3}$  latiori, lateribus oblique versus anticem attenuatis. Diametro brevi oculorum longitudinem temporum fere quadruplo superante. Antennis nigris. Thorace longitudine circiter  $2\frac{1}{4}$  latiori, summum latitudinis in  $\frac{2}{5}$  posterioribus attingente, margine anteriori recte truncato, lateribus postice subparallelis, dein subangulosis, versus anticem longe oblique attenuatis, disco postice utrimque late oblique depresso, post marginem anteriorem transverse anguste impresso, parte basali vage albopilosa. Carina praehumerali nulla. Carina laterali (marginali) postice sinuata. Scutello parvo, cordiformi. Elytris latitudine baseos circiter  $2\frac{1}{2}$  longioribus, thorace capiteque unitis circiter fere triplo longioribus, a basi usque ante medium sinuatis, dein versus apicem longe recte attenuatis, summum latitudinis circiter in parte basali attingentibus, valde nitidis, humeris elevatis, seriato punctatofoveolatis, a medio versus apicem sculptura hac evanescente. Carina longitudinali costiformi elytrorum indistincta. Apice elytrorum satis anguste conjunctim rotundato. Margine lateroapicali haud serrulato. Ornamento elytrorum e (utrimque) fascia obliqua lata alba, recta, in medio longitudinis posita atque e fascia simili praeapicali, ambobus densis et in sutura late interruptis, composito. Macula parvula simili rotunda alba in sexta parte basali prope suturam posita. Fasciis obliquis elytralibus e pilis vere densis, claris, albosericeis compositis.

**Observatio:** Species haec prope illum *T. plagiatum* Obenb. (l. c., contradictiones 111 (110)) locanda est.

### **Taphrocerus peruvianus n. sp.**

Long.: 2.9, lat.: 0.8 mm. Hab.: Peruvia mer.

Corporis forma elongata, sub cylindrica, satis robusta. Aspectu satis sericeo; capite et thorace subalutaceis. Colore corporis supra obscure aeneo. Corpore subtus aeneonigro, nitido. Pubescentia corporis brevissima, sparsa, fere microscopica, sed aequali, in elytris subseriata. Capite valde lato, magno, oculis prominulis, fronte desuper visa late sinuatim depressa. Fronte lata, fere glabra parte interoculari frontis longitudine  $\frac{1}{2}$  latiori, lateribus. Diametro brevi (transversali) oculorum longitudinem temporum fere quadruplo superante. Antennis nigris. Thorace longitudine circiter triplo latiori, summum latitu-

dinis in  $\frac{2}{5}$  posterioribus attingente, margine anteriori recte truncato, lateribus in  $\frac{2}{5}$  posterioribus obtuse subangulosis, versus basim levius, versus anticem fortius oblique attenuatis. Superficie thoracis grosse et sparse, irregulariter punctata, haud depressa, post marginem anteriorem anguste transverse depressa. Carina prae humerali nulla. Carina laterali (marginali) postice leviter sinuata. Scutello subcordiformi. Elytris latitudine baseos circiter  $2\frac{1}{2}$  longioribus, thorace capiteque unitis circiter  $2\frac{1}{2}$  longioribus, a basi usque fere ad medium leviter sinuatis, dein versus apicem longe recte attenuatis, summum latitudinis circiter in basi summa attingentibus, modice nitidis leviter subcoriaceis, aequaliter convexis, seriatopunctatis, punctis satis subtilibus, postice subevanescentibus. Carina humerali elytrali nulla. Humeris satis elevatis. Apice anguste separatim rotundato et subtiliter denticulato. Ornamento elytrorum nullo.

Observatio: Species haec prope *T. loretanum* Obenb. (contradictiones 180 (179) pertinet.

### **Taphrocerus Schmidtii n. sp.**

Long.: 3.2, lat.: 0.9 mm. Hab.: Costa Rica: San José. La Caja. (Dom. Schmidt lgt.)

Corporis forma elongata, gracili, satis robusta. Aspectu glabro. Colore corporis supra nigroaeneo, capite thoraceque magis aenescentibus. Corpore subtus aeneonigro. nitido. Pubescentia corporis nulla. Capite valde lato, fronte desuper visa medio distincte sinuatim impressa. Fronte satis lata, antice anguste albopilosa, sparse subtiliter punctata, parte interoculari frontis longitudine  $1\frac{1}{2}$  latiori, lateribus fere rectis. Diametro brevi oculorum longitudinem temporum fere quadruplo superante. Antennis nigris. Thorace longitudine circiter  $2\frac{1}{3}$  latiori, summum latitudinis in  $\frac{2}{5}$  posterioribus attingente, margine anteriori recte truncato, disco postice late utrimque oblique depresso, post marginem anteriorem anguste impresso, subalutaceo, in  $\frac{2}{5}$  posterioribus subanguloso, versus basim fere parallelo, angulis posticis rectis, versus anticem oblique attenuato. Carina prae humerali nulla. Carina laterali (marginali) postice leviter sinuata. Scutello subtriangulari. Elytris latitudine baseos circiter  $2\frac{1}{2}$  longioribus, thorace capiteque unitis circiter  $2\frac{2}{3}$  longioribus, a basi usque versus medium subparallelis, dein versus apicem longe recte attenuatis, summum latitudinis circiter in parte basali attingentibus, valde nitidis, valde aequaliter, sed satis plane convexis, superficialiter seriatim foveolatopunctatis, punctura hac post medium subevanescente. Carina longitudinali costiformi elytrorum nulla. Apice elytrorum satis anguste conjuncti rotundato. Margine lateroapicali elytrorum subtiliter serrato. Ornamento elytrorum nullo.

Observatio: Dom. Schmidt in honorem denominatus. Species haec prope speciem *T. pauligena* Obenb. (l. c. contradictiones 265 [264]) locanda est.

### **Taphrocerus San-Joséi n. sp.**

Long.: 3.4, lat.: 1.1 mm. Hab.: Costa Rica: La Caja. San José. Dom. Schmidt lgt.

Corporis forma satis robusta, postice attenuata. Aspectu glabro et nitido. Colore corporis supra nigroaeneo, nitido. Corpore subtus obscure aeneo, nitido. Pubescentia corporis distincta nulla. Capite robusto, producto, oculis parum prominulis. Fronte desuper visa medio distincte impressa. Fronte laevi-



gata, fere impunctata, antice dense pilis luteis marginata, parte interoculari frontis longitudine  $1\frac{1}{2}$  latiori, lateribus versus anticem satis fortiter oblique attenuatis. Diametro brevi oculorum longitudinem temporum quadruplo superante. Antennis nigroaeneis. Thorace longitudine circiter  $2\frac{1}{2}$  latiori, summum latitudinis in  $\frac{2}{5}$  posterioribus attingente, margine anteriori recte truncato, disco postice utrimque oblique late et satis profunde depresso, post marginem anteriorem transverse anguste impresso, nitido, sparse irregulariter punctato, in  $\frac{2}{5}$  posterioribus summum latitudinis attingente, ibidem subanguloso, parte laterali basali fere subparallela, parte anteriori oblique et recte, satis fortiter versus anticem attenuata. Carina praehumerali nulla, margine laterali postice leviter sinuato. Elytris latitudine baseos circiter  $2\frac{1}{3}$  longioribus, thorace capiteque unitis circiter triplo longioribus, a basi usque ante medium fere parallelis, dein versus apicem longe, recte attenuatis, summum latitudinis circiter in parte basali attingentibus, satis nitidis, superficialiter seriatim punctatis, aequaliter convexis, sculptura in parte posteriori valde diminuta, postice evanescente. Carina longitudinali costiformi elytrorum nulla. Apice elytrorum anguste conjunctim rotundato et denticulato. Margine lateroapicali elytrorum postice subtiliter serrulato. Ornamento elytrorum nullo.

**Observatio:** Species haec prope speciem *T. pauligena* Obenb. (l. c. contradictiones 265 [264]) locanda est.

### **Taphrocerus melanochalceus n. sp.**

Long.: 3.4, lat.: 1 mm. Hab.: Costa Roca.

Corporis forma satis robusta, elongata. Aspectu glabro, recte pilis valde sparsis griseis subseriatim tectus. Colore corporis supra nigroaeneo, paullo virescente. Corpore subtus aeneonigro, nitido. Pubescentia corporis valde inconspicua et solum postice, versus apicem elytrorum distinctiore. Capite satis lato, desuper viso antice late, distincte sinuatim impresso. Fronte lata, nitida, sparse griseo pilosa, subtiliter sparse punctata, parte interoculari frontis longitudine  $1\frac{1}{2}$  latiori, lateribus versus anticem oblique attenuatis. Diametro brevi oculorum longitudinem temporum plus quam quadruplo superante. Antennis nigris. Thorace longitudine circiter  $2\frac{1}{4}$  latiori, summum latitudinis in  $\frac{2}{5}$  posterioribus attingente, margine anteriori recte truncato, post cum transverse depresso, disco postice utrimque late oblique depresso, lateribus in  $\frac{2}{5}$  posterioribus summum latitudinis attingentibus, ibidem subangulosis, versus basim fere parallelis, leviter sinuatis, versus anticem oblique, sinuatim, satis fortiter attenuatis. Carina praehumerali nulla. Carina laterali (marginali) postice subsinuata. Scutello parvo. Elytris latitudine baseos circiter  $2\frac{1}{2}$  longioribus, thorace capiteque unitis circiter  $2\frac{2}{3}$  longioribus, a basi usque ante medium subsinuatis, dein versus apicem longe, fere recte attenuatis, summum latitudinis circiter in parte basali attingentibus, valde nitidis, humeris elevatis, disco aequaliter convexo, subfoveolatim, satis dense, satis fortiter seriatopunctato, punctis post medium valde diminutis, postice evanescentibus, superficie valde laevigata. Carina longitudinali costiformi elytrorum nulla. Apice elytrorum satis anguste conjunctim rotundato et denticulato. Margine lateroapicali elytrorum postice serrulato. Ornamento elytrorum nullo.

**Observatio:** Species haec in vicinatem illius *T. pauligena* Obenb. (l. c. contradictiones 265 [264]) locanda est.