

Dr. Stephan Breuning, Wien:

**NONNULLAE SPECIES NOVAE CERAMBYCIDARUM.
AC NOVA NATIO GENERIS CARABUS L.**

1. *Paracedemon* gen. nov. (Tragocephalarum).

Statura ex longo rotunda, antennis gracilibus, corpore tertia parte longioribus, infra sparse ciliatis, articulo primo perlongo, clavato, articulo tertio primo paullulum longiore, quarto distincte longiore; articulo quarto quinto multo longiore tuberculis antenniferis inter se distantibus, paullulum elevatis; oculis fortiter emarginatis, lobis inferioribus latitudine distincte longioribus; mandibulis regulariter curvatis; fronte transversa; pronoto transverso, convexo, basi leviter trieobato, ante basin et post marginem anticum leviter constricto, spina minuta conica, acuta in medio lateris instructo; elytris elongatis, convexis, pronoto distincte latioribus, apice rotundatis; capite nec retractibile, sternis laminiformibus, metasterno longo, pedibus mediocriter longis, femoribus clavatis, tibiis intermediis extus medio leviter sinuatis, unguiculis divergentibus.

Typ. *ruber* nov. Affinis genere *Cedemon* Gah.

***Paracedemon ruber* nov.**

Lobis inferioribus oculorum genis plus quam duplo longioribus, capite ac pronoto densissime ac subtilissime punctulatis; elytris dense subtiliter punctatis; ultimo segmento abdominali depressione media posteriore instructo.

Ruber, tomento subtili flavescente tecto; antennis nigro-fuscis, articulo tertio dimidio basali tomento griseo, articulo quarto dimidio basali tomento albo, articulo octavo (basi excepta) tomento albescente tecto (articulo ultimo in typo unico deficiente); tarsis nigrescentibus, tomento griseo-albo tectis.

Long. 9 mm, Larg. $3\frac{2}{3}$ mm.

Typ 1 ♀ Madagascar in Museo Praguense.

2. *Egesina* (Sg. s. str.) *albolineata* nov.

Fuscae Fish. proxima affinisque, sed differt antennis corpore paullulum longioribus, lobis inferioribus oculorum duplo longioribus quam latis, genis paullulum brevioribus. Niger, paullulum aeneo nitens, tomento obscure fusco tecto, aequis signis albis ornatus, sed vitta secunda elytrorum secundum suturam usque ad apicem elytrorum ducta (nec ad marginem lateralem reducta); metepisternis tomento denso albo tectis; femoribus posticis tomento albescente in parte laterali tectis.

Long. $5\frac{1}{2}$ mm, Larg. $1\frac{1}{2}$ mm. Typ Malacca: Cap in Museo Praguense.

3. *Rucentra celebensis* nov.

Antennis corporis longitudine; lobis inferioribus oculorum genis parum brevioribus, fronte rectangula, latitudine latiore, sparsim subtiliter punctato, occipite ac pronoto dense subtiliter punctatis; pronoto aequae longo ac lato; elytris paullulum post medium fortiter dilatatis, apice anguste rotundatis, dense mediocriter grosse punctatis, punctis apicem versus subtilioribus; metasterno sparsim subtiliter punctato; segmento ultimo ventrali depressione media post-basali rotunda instructo.

Ruber, capite, pronoto et subtus tomento subtili griseo-albo tecto, subtilissime in disco pronoti; elytris tomento fulvo tectis, imprimis dimidia apicali dense fusco marmoratis; in utroque elytro macula parva alba mediana discalis (margine laterali paullulum appropinquata) ac macula transversalis praeapicalis paullulum major, fulvo alba (suturae appropinquata); pedibus tomento subtili fulvo tectis; articulo quarto antennarum et sequentibus basi albo annulatis. Long. $6\frac{1}{2}$ —8 mm, Larg. $2\frac{1}{4}$ — $2\frac{3}{4}$ mm. Typ 1 ♂ Celebes meridionalis: Lompobatang, leg. Sarasin in Museo Praguense. Paratyp 1 ♀ dtto.

4. *Sybra* (Sg. s. str.) **malaccensis** nov.

Statura valde elongata, antennis corporis longitudine, articulo tertio quarto paullulum brevior, lobis inferioribus oculorum genis duplo longioribus, fronte ac pronoto dense subtiliter punctatis, elytris apice emarginatis (angulo exteriori in dentem brevem triangularem producto).

Rufus, tomento fulvo tecto; medio verticis utrinque macula elongata fusca; utrinque medio thoracis vitta lata longitudinali nigrofusca, in parte exteriori posteriori anguste albo marginata; scutello, marginibus exceptis, nigro-fusco; in utroque elytro una macula lata elongata nigro-fusca prope scutellum (in parte laterali anguste albo marginata), nonnullae vittae nigrae in disco, nonnullae maculae oblongae nigrae in tertio apicali, una macula minutissima alba posthumeralis (margine laterali appropinquata) ac nonnullae maculae albae oblongae in tertio apicali; articulo quarto antennarum ac segmentibus sequentibus apicem versus infuscatis. Long. $10\frac{1}{2}$ mm, Larg. 3 mm. Typ Malacca: Gap in Museo Praguense.

5. *Diadelia* (Sg. s. str.) **lineata** nov.

Statura elongata, antennis apicem elytrorum tribus ultimis articulis superantibus, articulo primo ac quinto tertio multo longioribus, articulo quarto tertio fere duplo longiore, oculorum lobis inferioribus genis dimidio longioribus, fronte valde transverso, sparsim subtiliter punctato, vertice ac thorace parum dense, subtiliter punctatis; thorace convexo, spina parva, conica, acuta, paulo post medium lateris sita, paullulum recurvata, instructo; elytris parallelis, apice oblique leviter truncatis (angulo suturali rotundato, marginali acuto), dense, subtiliter usque ad initium partis quartae apicalis, punctatis.

Rufus; tomento griseo-fusco tecto; elytris nonnullis vittis angustis regularibus, clarioribus, instructis, nonnullis punctis cingulo minutissimo fusco obscuro cinctis; in utroque elytro tribus maculis majoribus fuscis vagis (prima postbasali, suturae appropinquata, secunda mediana obliqua — ad suturam descendente, — tertia praeapicali — ad marginem lateralem descendente); dimidia parte basali articuli quarti antennarum ac segmentorum sequentium tomento fulvo-griseo tecta. Long. 8 mm, Larg. $2\frac{1}{2}$ mm. Typ Madagascar: Antalaba in Museo Praguense.

6. *Diadelia* (Sg. s. str.) **obenbergeri** nov.

Statura valde elongata; antennis apicem elytrorum tribus ultimis articulis superantibus, scapo et articulo quinto tertio multo longiore, articulo quarto tertio fere duplo longiore, oculorum lobis inferioribus genis plus quam duplo longioribus, fronte transverso, sparsim subtiliter punctato, parte anteriore verticis ac prothorace parum dense, subtiliter punctatis; prothorace in medio lateris spina parva conica acuta instructo; elytris parallelis, apice ex-

cavatis (angulo suturali distincto, laterali in dentem brevem triangularem acutum producto) dense ac subtiliter usque post medium punctatis.

Rufus, tomento fuvo obscuro tecto; elytris macula lata triangulari postscutellari fusca (in utroque elytro usque ad callum humeralem pertinente) instructis; in utroque elytro fascia fusca praeapicalis a sutura valde oblique reducta; antennis fuscis, dimidia basali articuli tertii ac basi articulorum sequentium flavo annulatis. Long. $4\frac{1}{2}$ —7 mm, Larg. $1\frac{1}{3}$ — $1\frac{3}{4}$ mm.

Typ Madagascar: Hte. Vallée de Sambirano in Museo Praguense. 9 Paratypi: Madagascar: Antelaba, Ampanefema, Vohémar aequae in Museo Praguense.

7. *Diadelia* (Sg. s. str.) **brunneofasciata** nov.

Statura valde elongata, antennis apicem elytrorum duobus ultimis articulis superantibus; scapo articulo tertio paullo longiore, articulo quinto tertio multo longiore, articulo quarto tertio fere duplo longiore, lobis inferioribus oculorum genis duplo longioribus, fronte transversa, impunctato; parte anteriori verticis ac thorace parum dense subtiliter punctatis; thorace spina parva, conica, acuta, in medio lateris instructa; elytris parallelis, apice oblique truncatis (angulo suturali rotundato, laterali acuto), parum dense subtiliter usque ad apicem punctatis, nonnullis punctis crassioribus interspersis.

Rufus, tomento griseo tecto et dense (elytris exceptis) maculis minutis fuscis tectus; scutello vitta lata mediana fusca instructo; elytris macula lata triangulari fusca postscutellari (in utroque elytro usque ad callum humeralem pertinente) instructis; praeterea in utroque elytro una macula magna fusca mediana vaga (suturae appropinquata) ac macula fusca obliqua praeapicalis discalis; articulo quarto antennarum ac articulis sequentibus ad apicem parum infuscatis. Long. 12 mm, Larg. $3\frac{1}{2}$ mm. Typ 1 ♀ Madagascar: Environs de Rogez in Museo Praguense.

Carabus (Sg. *Eucarabus*) **odoratus** n. **kamtschatensis** nov.

Odorato n. sahlbergi Dej. affinis, sed differt, thorace multo latiore, elytris latioribus, ovalibus, medio fortiter dilatatis, intervallis omnibus fortiter dissolutis (intervallis primariis non facile distinctis); supra obscure coeruleo-violaceus, elytris anguste viride marginatis. Long. 20 mm, Larg. $8\frac{1}{2}$ mm. Typ 1 ♀ Sibiria orientalis; Gub. Penzinskaja, Schestakovo in coll. Sterba.
