

Dr. Josef Mařan:

## DVA NOVÉ DRUHY ČÍNSKÝCH ALLECULIDŮ. DE NOVIS ALLECULIDARUM SPECIEBUS CHINENSIBUS.

Podávám tu popisy dvou nových druhů z čeledi *Alleculidae* ze sběrů J. Klappericha v jižní Číně v provincii Fukien. Větší část sběrů Klapperichových z čeledi *Alleculidae* byla zpracována již F. Borchmannem v Ent. Blätter 1941, 37, p. 23, 26—28. V materiálech, které mi byly svěřeny k zpracování, zjistil jsem dva další nové druhy. Je to nový druh rodu *Borboresthes* (*B. minutulus* m.), nejmenší z dosud známých druhů, dosahující délky toliko 5—5,5 mm. V materiálu jsou dva samičí exempláře z lokality Shaowu-Fukien (500 m n. m), nalezené 12. VI. 1937 a 4. VII. 1937; další exemplář tohoto druhu, nalezený na téže lokalitě 21. V. 1937, je immaturní a silně defektní. Druhým druhem je nový zástupce rodu *Cistelopsis*, který nazývám k počtě nálezce *Cistelopsis Klapperichi* m. 5 exemplářů tohoto druhu (2 ♂♂, 3 ♀♀) pocházejí rovněž z lokality Shaowu-Fukien.

Materialia *Alleculidarum* in China meridionali a clariss. J. Klapperich collecta, magna ex parte iam a clariss. F. Borchmann determinata atque descripta sunt. (Ent. Blätter 1941, 37, p. 23, 26—28). In materialis, quae mihi ad determinandum commissa sunt alteras duas novas species accurate cognovi, quarum descriptiones in hoc opusculo afferro.

### ***Borboresthes minutulus* m. nov. spec.**

Species parva. Long. 5—5,5 mm. Niger vel nigro-brunneus, subnitidus, convexus, sat dense griseopilosus, labro, clypeo antice, palpis, antennis pedibusque rufis.

Capite transverso, labro antice fere recte truncato, medio haud exciso, minute, minus dense punctato, rufo-piloso. Clypeo parum convexo, antrorsum parum attenuato, antice sparsius, postice densius sat crebre punctato, a fronte linea transversa parum distincta limitato. Fronte inter oculos lata, parum convexa, crebrius punctata, griseopilosa. Temporibus brevibus, 1/2 latitudinis oculi brevioribus, collo modice sed distincte constricto. Palpis maxillaribus articulo ultimo apice modice excavato, intus distincte, fortius quam extus dilatato. Antennis omnino brevibus, dimidium corporis haud attingentibus, articulo tertio duobus praecedentibus simul sumptis aequilongo, articulo quarto longissimo, quam tertio parum sed distincte longiore, articulo quinto brevior, articulis reliquis inter se adaequilongis, articulo ultimo quam penultimo parum longiore, articulis omnibus punctatis pilosisque.

Pronoto transverso, elytris haud angustiore, a basi antrorsum sat fortiter arcuatim angustato, margine postico medio truncato, utrinque fortius sinuato, angulis posticis obtusis, anticis totaliter rotundatis, sat fortiter deflexis, lateribus omnibus leviter marginatis, supra densissime fortiter pupilatim punctato. Scutello parvo, subtriangulari.

Elytris oblongo-ovatis, dorso fortiter punctato-striatis, intervallis paulo convexiusculis, subtiliter haud dense punctatis, sparsius sat longe luteo-pilosis.

Subtus; sterno, praecipue metasterno crebre punctato, abdominis segmentis modice haud dense punctatis, subtiliter pilosis, segmentis penultimis lateraliter modice productis, segmento ultimo simpliciter, subrotundato. Prosterno pro-

cessu intercoxali, bene distincto, sat lato, supra aplanato. Epipleuris normaliter formatis, sat dense punctatis ad basin abdominis sensim angustatis, dein paulo dilatatis et apicem versus sensim angustatis. Pedibus normalibus, femoribus sat latis, tarsis posticis quam tibiis brevioribus, articulo primo (metatarso) sequentibus articulis simul sumptis longiore.

Materialia examinata: 2 ♀♀, China mer. Shaowu-Fukien (500 m), 12. VI. et 4. VII. 1937 J. Klapperich legit; 1 specimen immaturum, valde defectum Shaowu 21. V. 1937.

Species haec nova a ceteris congeneribus iam longitudine multo minore manifeste discrepat.

### **Cistelopsis Klapperichi m. nov. spec.**

Long. 4,5—5 mm. Elongato-ovata, convexiuscula, subnitida, nigro-picea, obscuro-pilosa, subtus lateribus brunnescens.

Antennae articulis duobus vel tribus basalibus brunnescentibus, articulis ceteris nigris. Pedibus obscuro-brunneis.

Capite supra subnitido, microsculpturato. Labro breve, longitudine sua 3× latiore, antice haud emarginato. Clypeo transverso antrorsum rotundatim attenuato, postice linea profunda transversa limitato, tantum postice densius punctato. Temporibus brevissimis. Collo constricto. Palpis maxillaribus articulo ultimo extus parum fortius quam intus dilatato. Fronte inter oculos circa dimidium diametri oculi, supra sat sparse punctata. Antennis crassioribus, dimidium corporis haud attingentibus, articulo tertio duobus praecedentibus simul sumptis fere aequilongo, quam quarto valde longiore, articulis reliquis inter se fere aequilongis.

Pronoto basi longitudine duplo latiore, modice convexo, supra subnitido, microsculpturato, sat dense punctato, basi utrinque fortiter sinuato, striga ante basali utrinque valde distincta, sat profunda.

Elytris fere in medio latissimis, lateribus antice parum, postice fortius rotundatim attenuatis, supra nitidis, tantum minutissime microsculpturatis, punctato-striatis, stria prima fortius impressa, interstitiis planis triseriatim minute punctatis.

Abdomine minute microsculpturato, nitido, laeviter punctato, segmentis duobus ultimis sparsius punctatis, segmento ultimo apice modice rotundato.

Pedibus dense et fortiter punctatis, tarsis posticis articulo primo articulis reliquis simul sumptis fere aequilongo.

Sexuum differentia: ♂ discrepat a ♀ solum modo fronte inter oculos parum angustiore.

Materialia examinata: 5 specimina (2 ♂♂, 3 ♀♀) Shaowu-Fukien (500 m), 29. V. et 14. V. 1937 J. Klapperich legit.

Speciem hanc novam ad honorem domini clariss. J. Klapperich, viri de exploratione entomologica Chinae mer. optime meriti, nomino.