

Jan Bechyně:

261.

REVISE DRUHŮ SKUPINY TIMARCHA SARDEA VILLA.

SPECIERUM SECTIONIS TIMARCHA SARDEA VILLA REVISIO.
(COL. PHYTOPH. CHRYSOMELIDAE).

Skupina zde zpracovaná jest charakterisována nejen řadou specifických morfologických znaků, nýbrž i speciálním areálem rozšíření, který zaujímá západomediterránní ostrovy: Baleary, Korsiku, Sardinii a Sicilii. Na Balearách i na Sicilii jest zastoupen rod *Timarcha* ještě dalšími, morfologicky velmi vzdálenými skupinami, kdežto zbylé dva z jmenovaných ostrovů jsou obývány výhradně druhy této sekce.

Ostrov Malta má svůj zvláštní druh, mně neznámý (*T. melitensis* Weise), který podle originální i podle pozdějších diagnos zdá se náležeti většinou uváděných znaků k blízkosti africké skupiny *T. insignis* Guér. *T. melitensis* nemá štít po stranách opatřený marginální rýhou, kterýžto fakt nemálo přispívá k stanovení důležitosti tohoto znaku pro systematiku. (Tímto znakem má totiž býti stanoven podrod »*Metallotimarcha* Motsch.«, se kterým však tento maltský druh nemá zhola nic společného).

Vztahy k některým dalším (nejpříbuznějším) skupinám tohoto rodu zachycuji v této tabulce:

Sekce: Znak:	<i>T. sardea</i>	<i>T. pratensis</i>	<i>T. insignis</i>	<i>T. insparsa</i>	<i>T. goettin- gensis</i>
Obrys štítu	slabě srdčitý	silně srdčitý	velmi slabě srdčitý	na basi konstriktní	pravidelně kaokrouhlený
Klenutí štítu	nepravidelné, po stranách silnější	pravidelné	nepravidelné, po stranách silnější	pravidelné	nepravidelné, po stranách silnější
Tečkování štítu	nepravidelné, řídke	nepravidelné, husté	pravidelné, husté	pravidelné, řídke	pravidelné, husté
Tečkování krovek	foveolární řídke	rugosní, husté	jemné, řídke	jemné, řídke	různé, husté
Mesosternum	ploché	excisní	excisní	bifurkátní	bitubercul.
Marginální rýha štítu	vždy dosti silná		slabá až chybící, někdy zkrácená		
Velikost	malá až střední	střední	střední	střední až velká	malá až střední
Zeměpisné rozšíření	Západo-mediterr. ostrovy	Jihovýchodní Evropa, Malá Asie, Kavkaz	Severní Afrika	Španělsko	Kontinentální teplejší části Evropy
Vertikální rozšíření	formy submontánní		montánní	submontánní	nížinné až submontánní
Variační potenciál téže lokality	velmi malý	malý	velmi silný	malý	malý
Sexuální dimorfismus (relativně)	malý	značný	značný	značný	velmi silný

Druhy *T. šusterei* a *T. zavadili* jsem pojmenoval k počtě našich nejzasloužilejších hymenopterologů, pp. ředitelů O. Šustery a V. Zavadila, a na milou vzpomínku na čtyřleté společné prosbírávání jihomoravských xerothermních lokalit.

Sectio generis *Timarcha*, in pagellis sequentibus collaborata, non solum characteribus morphologicis numerosis, sed etiam distributione geographica specifica insignata est. Species huius sectionis insulas mediterraneas zonae occidentalis incolunt: Baleares, Corsicam, Sardiniam et Siciliam. Balearibus et Sicilia etiam species aliarum sectionum, sectioni huic valde diffinium occurrunt, Corsica Sardiniaque autem species sectioni *T. sardea* exclusive pertinentes habitant.

Insula Melita (Malta) speciem suam propriam, *T. melitensis* Weise, habet, quae species mihi in natura ignota est, sed ex descriptione originali atque e diagnosi postoriginalibus (Porta, l. c.) secundum signa essentialia in affinitatem sectionis africanae, *T. insignis* Guér., pertinere videtur. Pronotum *T. melitensis* sulco latero-marginali haud instructum est, quod factum ad recensionem criticam et ad gravitatem systematicam huius signi valde adjuvat; nam subgenus »*Metallotimarcha* Motsch.« signo hoc principatiter indicato delimitatum est, et ut et supra dicto certe apparet, hoc signum etiam in aliis speciebus producere potest.

Sectio haec aliis aliquot sectionibus affinis est, ut ex tabella adjuncta certificari potest:

Sectio: Signum	T. sardea	T. pratensis	T. insignis	T. insparsa	T. goettin- gensis
Pronoti contura	leviter cordiformi	fortiter cordiformi	minime cordiformi	basi constricta	lateribus regula- riter rotundatis
Pronoti convexio	irregularis, lateribus deflexis	regularis	irregularis, lateribus deflexis	regularis	irregularis, lateribus deflexis
Pronoti punctatio	irregularis, sparsa	irregularis, densa	irregularis, sparsa	regularis, sparsa	regularis, densa
Elytrorum punctatio	foveolaris, sparsa	rugosa, densa	tenuis, sparsa	tenuis, sparsa	diversa, densa
Mesoster- mum	fere planum	excisum	excisum	bifurcatum	bituberculatum
Pronoti sulco marginali	semper sat fortiter insculpto		tenuiter, nullo modo aut abbreviatim insculpto		
Corporis dimensio	parva aut media	media	media	media aut magna	parva aut media
Distributio geographica	Insulae medi- terraneae occi- dentales	Europa mer- or., Asia min., Caucasus	Africa bor.	Hispania	Europa conti- nentalis merid. et media
Distributio verticalis	formae submontanae		montanae	submontanae	submontanae et littorales
Variatio localis	minima	parva	maxima	parva	parum pronunciata
Dimor- phismus sexualis (relativ.)	parvus	pronunciatus	pronunciatus	pronunciatus	maximus

Sectioni *T. sardea* Villa characteria morphologica sequentia indico:

Corporis dimensionibus aut parvis aut mediis, corporis contura aut subglobosa aut plus minusve elongata. Supra nigra, rarius pro parte metallica, subtus et pedibus laetius metallicis. Capite punctato (antice in clypeo densius), sulco frontali vel ex toto vel pro parte fortiter insculpto, semper indicato. Antennis sat crassis. Pronoto in disco parum, ad latera fortiter convexo (lateribus subdeflexis), leviter cordiformi, ante angulos posticos plus minusve sinuato, punctis majoribus et minoribus irregulariter (ordinaliter maxime sparse) instructo, ambitu ex toto sulco bene insculpto marginato. Scutello lato, triangulari. Elytris haud rugosis, punctis magnis, rarissime pro parte confluentibus instructis, intervallis aut planis aut irregulariter convexis, quasi subundulatis. Prosterno nitido, in medio longitudinaliter, parum profunde canaliculato, mesosterno nitido, minus quam prosterno sculpturato, nec bituberculato nec apice profunde exciso; abdomine tenuiter sculpturato. Femoribus basi et tibiis fortiter punctatis. Dimorphismo sexuali minimo.

Femina. Tarsorum posteriorum articulo 3^o apice parum (in $\frac{1}{7}$ — $\frac{1}{6}$) exciso; corpore majore.

Species *T. šusterai* et *T. zavadili* ad honorem Dom. directorum O. Šustera et V. Zavadil, hymenopterologorum nostrorum optimorum, denomino.

Specierum et formarum conspectus.

1. **Timarcha elliptica** Fairmaire Baleares
2. **Timarcha cornuta** n. sp. Corsica.
3. **Timarcha prunneri** Herr.-Schäff. (= *sublaevis* Fairm.) Corsica.
4. **Timarcha zavadili** n. sp. Corsica.
5. **Timarcha sardea** — species geographica —
- subsp. **sardea** Villa Sardinia.
- subsp. **corsica** n. subsp. Corsica.
6. **Timarcha sicelidis** Reiche Sicilia.
7. **Timarcha šusterai** n. sp. Sardinia, Corsica?

Bibliographia in Junk-Schenkling, Col. Catal. 68, 1916, J. Weise.
Alii libri citati:

J. Achard: Bull. Soc. Ent. Fr. 1923, pg. 37 (notulae synonymicae).

A. Porta: Fauna coleopterorum italica IV, 1934, pg. 282—284.

Specierum synopsis:

- 1 (6) Sculptura superficiei corporis tenui; elytrorum intervallis nullo modo convexis. Corpore parvo, parum elongato.
- 2 (5) Clypeo depresso, sulco frontali fortiter insculpto. Elytris in $\frac{1}{4}$ anteriori latissimis.
- 3 (4) Antennis quam dimidio corporis longioribus. Scutello punctulato. Elytrorum intervallis microscopice punctulatis.
- 1. **Timarcha elliptica** Fairmaire.
- 4 (3) Antennis brevioribus, dimidio corporis haud attingentibus. Scutello laevi. Elytrorum intervallis vix microscopice punctulatis.
- 2. **Timarcha cornuta** n. sp.
- 5 (2) Clypeo vix depresso, sulco frontali abbreviato et minus pronunciato. Elytris pone medium latissimis, subglobosis, haud elongatis. Pronoti lateribus postice sensim sinuatis.
- 3. **Timarcha prunneri** H.-Schäff.

- 6 (1) Elytris crebre sculpturatis, eorumque intervallis irregulariter convexis. Corpore majore.
- 7 (8) Pronoto fortiter transverso, brevi (2,4—2,6× latiore quam longiore).
..... 4. **Timarcha zavadili n. sp.**
- 8 (7) Pronoto minus transverso et longiore (1,6—1,9× latiore quam longiore).
- 9 (14) Pronoto (praecipue ad latera) haud confluentim punctato.
- 10 (13) Antennis brevioribus, pronoto ad latera punctis foveiformibus haud instructo.
- 11 (12) Elytris (praecipue in femina) ad latera ante medium subparallelis. Corpore angustiore et elongatiore. 5. **Timarcha sardea subsp. sardea Villa.**
- 12 (11) Elytris ad latera fortiter rotundatis, ventricosis. Corpore minus elongato. **T. sardea subsp. corsica n. subsp.**
- 13 (10) Antennis longissimis, pronoto ad latera punctis magnis foveiformibus inter puncturam normalem instructis. Supra nigra. 6. **Timarcha sicelidis Reiche.**
- 14 (9) Pronoto coeruleo, dense et pro parte confluentim punctato, clypeo depresso et sulco antero-marginali instructo. 7. **Timarcha šusterai n. sp.**

1. **Timarcha elliptica** Fairm.

Species mihi ignota. Copiam descriptionis originalis affero (Ann. Soc. Ent. Fr. (5) III, 1873, pg. 180—181):

Long. 10 mm. — Ovato-elliptica, convexa, nigra, nitida, pedibus nigro-cyanescentibus, capite punctato, antice densius, et late impresso, summo sulcato, prothorace lato, lateribus rotundato, antice angustiore, sat dense inaequaliter punctato, elytris ovatis, a medio postice attenuatis, grosse punctatis, rugis tenuibus impressis, intervallis tenuissime punctatis, subtus punctata, mesosterno apice medio striato.

Ovalaire, presque elliptique, convexe d'un noir brillant, avec les pattes d'un noir bleuâtre. Tête ponctuée, plus finement et plus densément en avant; une large impression antérieure, un peu triangulaire, se terminant au sommet par un court sillon. Antennes dépassant un peu le milieu du corps, à articles ovalaires-oblongs; troisième article seulement un peu plus long que le 4ème. Corselet large, court, arrondi sur les côtés, rétréci en avant; marginé tout autour, à ponctuation assez serrée, inégale. Ecusson ayant quelques points. Elytres ovalaires, s'élargissant un peu de la base au quart antérieur et s'atténuant en arrière après le milieu, à peu près comme le corselet en avant, ce qui donne au corps une forme un peu elliptique; ponctuation assez forte, médiocrement serrée, avec quelques rides très fines, très courtes, les intervalles à ponctuation très fine; bord réfléchi plissé en dehors, ponctué en dedans. Dessous ponctué densément, rugueux sur la poitrine. Mésosternum assez large, oblique, fortement silloné au milieu du sommet. Pattes grandes et robustes.

Iles Baléares; un seul mâle, communiqué par M. Kraatz.

Cette espèce est remarquable par sa forme, qui rappelle un peu celle de *T. lusitanica* et *trapezicollis*. Sa véritable place est difficile à indiquer; mais, dans tous les cas, celle qui nous lui donnons ici (ante speciem sectionis aliae *T. interstitialis* Fairm.) est purement artificielle et ne s'accorde guère avec ses affinités apparentes.

2. *Timarcha cornuta* n. sp.

Hab. Corsica (typus 1 ♂ ex coll. Achard, in coll. Musei Nat. Pragae conservatur).

Long. corp.: ♂ 9 mm; ♀ ignota.

Nigra, nitida, aeneo-tincta, subtus opacior et violacea, pedibus nitidissimis et purpurascensibus.

Capite antice sparse (in vertice solum modo punctis aliquot) punctato, sulco frontali fortiter profundeque insculpto; clypeo fortiter impresso, antice in medio sulco longitudinali abbreviato instructo, margine anteriore relevato; antennarum calis tuberculato-productis. Antennis brevioribus, articulo 2° compresso, articulo 3° ($1,4 \times$ longiore quam latiore) quam 2° $1,6 \times$ longiore, articulo 3° quam 4° $1,2 \times$ longiore.

Pronoto fortiter convexo, parum transverso ($1,7 \times$ latiore quam longiore), nitidissimo, basin versus magis quam antrorsum rotundatim attenuato, angulis anterioribus productis, lateribus ante angulos posteriores vix sinuatis; in disco punctis tenuissimis majoribus ac minoribus instructo, ambitu ex toto sulco sat fortiter inciso marginato. — Scutello haud sculpturato, laevi.

Elytris quam pronoto opacioribus (in mare!), tenuiter punctatis, punctis ipsis per striolas tenues irregulariter conjugatis, quae striolae in sutura transversim coordinatae sunt; intervallis planis, haud convexis, vix microscopice punctulatis. Epipleuris parum sculpturatis.

Prosterno et mesosterno nitidis, in medio longitudinaliter canaliculatis; abdomine sat fortiter punctato, pygidio et propygidio fere rugoso-punctatis.

Mas. Tarsis anterioribus ovoideis, $1,8 \times$ longioribus quam latioribus, antrorsum attenuatis.

Femina. Ignota.

Observatio. — Species haec elytrorum contura praecipue, atque aliis signis nonnullis speciei mihi ignotae, *T. elliptica* Fairm., valde approximatur, sed (secundum descriptionem originalem supra transcriptam) antennis brevioribus) medium corporis haud attingentibus), pronoto tenuissime et quam maxime sparse punctato, scutello laevi, elytrorum intervallis vix micropunctatis, nec non corpore supra subaeneo-nigro, subtus violaceo pedibusque laete purpurascensibus ab ea discrepat.

3. *Timarcha prunneri* Herr.-Schäff. (= sublaevis Fairm.)

Hab. Corsica.

Long. corp. ♂♂ 8—9 mm; ♀♀ 9—10 mm.

Praecedenti similis, sed clypeo haud depresso, antice in medio haud sulcato, margine anteriori haud relevato, sulco frontali valde abbreviato, antennarum calis parum (ut ordinaliter in hoc genere) productis, antennarum articulo 2° elongato, pronoto magis transverso (fere duplo latiore quam longiore) et minus convexo, subcordiformi, basin versus sat fortiter attenuato, elytris ut in pronoto nitidis, haud opacioribus, sutura transversim fortiter striolata, epipleuris postice fortiter transversim sulcatis, mesosterno apice distincte exciso, haud longitudinaliter canaliculato, tarsis anterioribus in mare magis dilatatis nec non pedibus minus laete aeneometallicis manifeste discrepat.

Femina. Corpore robustiore et magis sculpturato.

Observatio. — Species tres primae huic sectioni pertinentes et supra descriptae, speciei *T. bruleriei* Bell. e Europa continentali similis est, et non solum in collectiones, sed etiam in litteratura saepe mixtae figurant. *T. bruleriei* Bell. in sectionem *T. goettingensis* L. numeranda est, et per pronotum

dense, regulariter et fortiter punctatum ab his speciebus insulicolis discrepat. — Haec tres species insulicolae supra descriptae ab aliis speciebus sectionis *T. sardea*, quarum diagnosae sequuntur, sculptura superficiei tenui, elytris planatis, corpore subgloboso et parvo discrepant. *T. zavadili* m., quae species per aspectum generalem ex omnibus reliquis maximam affinitatem his formis demonstrat, pronoto minus transverso et superficie tenuiter sculpturata certe dignoscenda est. Certificationem synonymicam huius speciei clar. J. A c h a r d in Bull. Soc. Ent. Fr. 1923, pg. 37 publicavit.

4. *Timarcha zavadili* n. sp.

Hab. Corsica (1 ♂ et 1 ♀ ex coll. A. Fleischer, typi, in coll. Musei Nat. Pragae conservantur).

Long. corp. ♂ 10 mm; ♀ 12 mm.

Nigra, nitida, subtus et pedibus obscure coeruleo-violaceis. Corpore sat brevi, subgloboso.

Capite antice in clypeo dense et pro parte confluentim, in vertice sparse et fortiter punctato, sulco frontali (medio) profunde insculpto, sulcis clypealibus obsoletis; clypeo antice relevato et subconcauiter truncato. Antennis brevioribus, multo densius et multo fortius quam in aliis speciebus huius generis punctatis, articulo 2° subgloboso, articulo 3° ($1,7\times$ longiore quam latiore) quam 2° fere duplo longiore, leviter dilatato, articulo 3° quam 4° $1,4\times$ longiore.

Pronoto fortiter convexo, valde transverso (in ♂ $2,4\times$, in ♀ $2,6\times$ latiore quam longiore), subcordiformi, in medio latissimo, antrorsum fere recte angustato, angulis anterioribus fere rectis, haud productis, a medio angulos posticos versus rotundatim attenuato et pone hos angulos leviter sinuato; in disco sparse punctis majoribus et minoribus instructo, ambitu ex toto sulco fortiter insculpto marginato. — Scutello minime sculpturato.

Elytris profunde et sat dense punctato-foveolatis, punctis fere omnibus asteriformibus (striolis microscopicis circum punctos asteriforme coordinatis), postice ex parte confluentibus, punctis microscopicis immixtis sparse instructis, intervallis irregulariter convexis. Sutura haud punctata, tenuiter transversim striolata. Epipleurorum sculptura minus quam in elytrorum disco pronunciata, e punctis et e striolis composita.

Prosterno nitido, subrugoso, in medio longitudinaliter canaliculato; mesosterno nitido et etiam canaliculato, apice solum modo leviter sinuato, haud exciso; abdomine tenuiter sculpturato, pygidio et propygidio crebre pro parte confluentim punctatis.

Mas. Tarsis anterioribus longe ovatis (fere duplo longioribus quam latioribus), antrorsum attenuatis.

Femina. Elytris minus dense punctis magnis, rarius asteriformibus, instructis. Corpore robustiore.

Observatio. — *T. zavadili* a ceteris huius sectionis speciebus per pronotum maxime transversum et per aspectum generalem (corporis contura leviter gloobsa) valde discrepat.

5. *Timarcha sardea* Villa, species geographica.

a) *subsp. sardea* s. str.

Hab. Sardinia.

Long. corp. ♂♂ 10—11 mm; ♀♀ 13—14 mm.

Rassae sequenti similis, sed corpore nitidiore, laetius metallico, capite sparsius punctato, elytris oblongioribus, et eorum lateribus (praecipue in femina)

ad medium subparallelis, mesosterno magis relevato et apice magis exciso nec non tarsis in mare minus dilatatis differens.

b) **subsp. corsica** m. n. subsp.

Hab. Corsica: Env. de Ajaccio (VIII., 1938, Bechyně lgt., typus 1 ♀ in collectione mea conservatur); Verghia, Coti, Chiavari (Lehký lgt., cotypi); Corse (Lehký lgt., XI. 1937, 5 ♂♂ et 4 ♀♀, cotypi, in collectione Musei Nat. Pragae conservantur), et specimina numerosa ex coll. Achard, Reitter, etc.

Long. corp. ♂♂ 10—11 mm; ♀♀ 12—14 mm.

Oblonga, pronoto parvo, nigra, nitida, rarius leviter subaeneo-micans, pedibus laetius metallicis.

Capite in clypeo sat dense, ceterum sparse punctato, sulco frontali fortiter insculpto, sulcis ceteris obsoletis. Antennis brevioribus, articulo 2° fere globoso, articulo 3° quam 2° fere duplo longiore, articulo 3° quam 4° 1,5× longiore.

Pronoto nitido, punctis majoribus et minoribus irregulariter et sparse instructo, valde convexo, subcordiformi, parum transverso (1,7—1,9× latiore quam longiore), lateribus ante medium rectis, postice fortiter rotundatis et ante angulos posticos (acutos) sat fortiter sinuato. — Scutello parum sculpturato.

Elytris sparse punctato-foveolatis (10× fortius quam in pronoto), punctis microscopice nonnullis immixtis instructis, intervallis irregulariter convexis; lateribus ventricosis, haud subparallelis. Sutura tenuiter transversim striolata; epipleuris magis tenuiter quam elytris punctatis.

Prosterno laevi, leviter undulato, in medio longitudinaliter canaliculato. Mesosterno apice abbreviatim canaliculato et leviter exciso. Abdomine sparse et tenuiter punctato.

Mas. Tarsis anterioribus ellipticis, 1,8× longioribus quam latioribus.

Femina. Corpore majore, paulo opaciore, pygidio et propygidio magis rugose punctatis.

Observatio. — Rassa haec Corsica maxime frequens esse videtur. Specimen de Ajaccio in altitudine cca 200 m legi.

6. **Timarcha sicelidis** Reiche.

Hab. Sicilia.

Long. corp. ♂♂ 10—11 mm; ♀♀ 12—13 mm.

Oblonga, nigra, nitida, subtus et pedibus atrovioleaceis vel atrocoeruleis.

Capite fortiter, antice densius quam postice punctato, clypeo leviter depresso, antice relevato. Antennis longissimis, articulo 2° subgloboso, articulo 3° quam 2° duplo longiore, articulo 3° quam 4° 1,5× longiore.

Pronoto tenuiter, sparse et irregulariter punctato, ad latera punctis magnis foveiformibus instructo; subcordiformi, lateribus regulariter rotundatis, ante angulos posteriores fortiter sinuatis. — Scutello parum sculpturato.

Elytris nec profunde nec dense punctatis, intervallis fortiter et valde irregulariter convexis; sutura transversim parum striolata; epipleuris rugosopunctatis.

Prosterno crebre sculpturato, nitido, in medio haud profunde longitudinaliter canaliculato. Mesosterno apice parum exciso, simili modo ut in prosterno sculpturato. Abdomine tenuiter et sparse punctato nec non irregulariter substriolato.

Mas. Tarsis anterioribus ovatis, 1,8× longioribus quam latioribus.

Femina, Corpore robustiore, magis sculpturato.

Acta entom. Musea Prague 1943-1944. XXI-XXII.

O b s e r v a t i o. — *T. šusterai* m. affinis, sed pronoto in disco sparse et tenuiter punctato, clypeo minus depresso et antice sulco marginali vix visibili nec non capite et pronoto haud metallicis ab ea discrepat. A ceteris huius sectionis speciebus pronoti punctis magnis foveiformibus ad latera sitis differt.

7. *Timarcha šusterai* n. sp.

Hab. Sardinia (Damry lgt., ex coll. Achard, 2 ♂♂ et 1 ♀, series typica, in coll. Musei Nat. Pragaе conservatur). Corsica? (1 ♂).

Long. corp. ♂♂ 10 mm; ♀ 12 mm.

T. sardea subsp. *sardea* simillima, sed characteribus nonnullis valde discrepans:

Atrocoerulea, elytris nigerrimis. Capite fortiter et dense (praecipue in clypeo) punctato, clypeo fortiter depresso, antice relevato et sulco profundo subarcuato antice marginato, antennis fere ut in *T. cornuta* m. constructis.

Pronoto dense et fortiter (fortissime in speciebus huius sectionis) pro parte confluentim, irregulariter punctato, paulo minus transverso (1,6—1,8× latiore quam longiore), ante angulos posteriores subsinuato. — Scutello punctis majoribus aliquot instructo.

Elytris in utroque sexu quam pronoto nitidioribus, fortiter punctatis, sutura subtiliter transversim striolata, epipleuris sparse et sat tenuiter sculpturatis.

Tibiis dense et fere confluentim punctatis.

Mas. Tarsis anterioribus vix ovatis, ellipticis, 1,7× longioribus quam latioribus.

Femina. Corpore majore et magis sculpturato.

O b s e r v a t i o. — Ab aliis huius sectionis speciebus clypeo antice fortiter relevato et sulco antero-marginali profundo, pronoto dense et fortiter punctato nec non coloratione coeruleo-metallica (elytris exceptis) manifestissime discrepat.
