

Ludvík Hoberlandt, Praha:

AD COGNITIONEM FAUNAE HETEROPTERORUM BALKANICAE.

In parte sequente inventa generis *Odontotarsus* Lap. pro fauna Bulgariae Graeciaeque nova enumero.

I.

Odontotarsus parvulus Horv.

Speciem hanc die 22. VI. 1938 in meo itinere balcanico in valle fluminis Struma prope Gara Pirin (Kresnesko defile) in Macedonia bulgarica (mer. or.) in specimine unico (♂) inveni. Species haec adhuc solum ex insula Creta cognita est.

Odontotarsus robustus Jak.

Speciem hanc, regionem mediterraneam incolentem, e plurimis localitatibus bulgaricis enumero: Zeitinburun, Strandža pl., Bulg. mer. or., VI. 1933, VII. 1934 Dr. J. Mařan lgt. — Kresnesko def., Macedonia bulg., VI. 1935 Dr. J. Mařan lgt., 26. VI., 29. VI., 2. VII. 1938 auct. lgt. — Sv. Vlas, Bulg. or., 30. VII., 2. VIII., 5. VIII. 1938 auct. lgt. Species haec cum forma sequente e Bulgaria adhuc incognita est.

Odontotarsus robustus f. flava Jak.

Zeitinburun, Strandža pl., Bulg. mer. or., VII. 34 Dr. K. Tábořský lgt. — Kresnesko def. VI. 1933 Dr. J. Mařan lgt., 25. VI., 62. VI. 1938 auct. lgt.

Odontotarsus purpureolineatus f. nigropunctata n.

Corpore quam in forma typica parum minore. Area corporis superiori obscure flavescenti; sine picturis fuscis universis. Pronoto scutelloque profunde rugulose nigropunctatis, interareis punctorum callose elevatis; linea scutelli intermedia angusta, partem scutelli mediam attingente, maculisque utrinque lateralibus basalibus callose levibus, pallide flavis. Punctis nigris pronoti scutellique in locis vittarum formae typicae plus minusve maioribus. Ventre flavescenti, concoloriter disperse punctato, solum paucis punctis nigris dispersis, in partibus lateralibus segmentorum singulorum magis dense congesticis, ornato. Antennis totis pallidis, articulo tertio brevissimo, breviori quam in forma typica, apice valide clavato.

Kresnesko defile, Macedonia bulgarica 24. VI. 1938 (1 ♀), 27. VI. 1938 (1 ♀) auct. lgt.

II.

Odontotarsus purpureolineatus f. confluens n.

Area corporis superiori punctato-rugulosa, picturis sature nigris. Vittis pronoti invicem fere omnino confluentibus, solum in parte anteriori areas angustissimas pallidas reliquentibus.

Vittis scutelli duabus secundariis, duabus lateralibus, duabus vittis posticis lateralibus et duabus marginalibus invicem omnino confluentibus. Vittis

duabus basalibus intermediis et duabus secundariis invicem fere omnino confluentibus, solum interareas pallidas angustissimas brevissimasque reliquentibus.

Antennis totis nigris, pedibus fusco brunneis. Ventre flavescenti, concoloriter disperse punctato, solum paucis punctis nigris dispersis, in partibus lateralibus densius congesticis ornato. Margine posteriori segmenti octi segmentoque genitali mari densissime nigro-punctatis, fere nigris.

Litochoron, Graecia sept. or., 8. VI. 1937 Dr. J. Mařan lgt. (1 ♂).
