

*Emil Jagemann, ze Sekce pro ochranu rostlin ZVÚZ v Brně:*

## DE ELATERIDARUM SPECIEBUS NOVIS.

### **Adelocera aurosquamosa** sp. n.

Brunneo-niger, subnitidus, antennis, pedibus elytrisque brunneis. Planus, squamis aureo-flavis vestitus; inter eas squammae brunnae in prothorace rarissime in elytris parte aequali dissiminatae.

Caput fortiter ac dense punctatum, fronte triangulariter impressa.

Antennae ab articulo tertio late dilatatae; articulus tertius perspicue latitudine longiore, quarto latitudine longitudini aequali, ad finem articuli longitudine decrescente.

Prothorax longius quam latus, densissime ac grossissime punctatus, usque ad marginem anteriorem late sulcatus. In duabus posterioribus partibus tertiis margines laterales paribus fere intervallis inter se distant, ante angulos posticos vix emarginati sunt. Angulis anticis rotundatis, posticis acutis, divergentibus. In parte media anteriore cum duabus foveis rotundatis, in posteriore cum duabus foveis ovalibus.

Scutellum triangulum, dense spuamosum, latitudine longiore, latere posteriore rotundato.

Elytra basis prothoracis latitudine latiore, in duabus anteriores partes tertiis margines laterales paribus fere intervallis inter se distant, deinde ad finem rotundate attenuata. Grossissime dense ac profunde irregulariter punctata.

Sulcis femoribus tibiisque pedum anteriorum distinctis.

Patria: Asia Minor — Amasia.

Longit.: 15 mm, latit.: 4,5 mm.

Ex affinitate Adeloc. Delagrangei, sed sulcis tarsalibus distinctis et prothorace longiore a specie ea differt.

### **Lacon Buyssoni** Pečírka i. l.

Rubrobrunneus, nitidus, depressus; aureoflavo et griseo squamosus; in elytris squamae aureoflavae seriatae, griseae dense intersparsi sunt.

Caput planum, medio depressum, fortiter dense punctatum.

Antennis ferrugineis, ab articulo quarto fortiter serratis; articulo secundo tertio dimidio longiore, quarto longitudine latiore, 5. et 6. longitudine latitudini aequali, a 7. latitudine longiore; articulus ultimus fere duplo longius quam latus.

Prothorax longius quam latus, post medium bituberculatus, densiusculus sed grosse, praeter margines laterales densius punctatus; marginibus lateralibus conspicue marginatis, angulis anticis posticisque rotundatis. In prima longitudinis suae parte tertia in latitudinem totam cum marginibus lateralibus elevatus, margines laterales hoc loco convexae, ante angulos posticos graviter emarginatae sunt.

Scutello plano, post basim fortiter emarginato, margine posteriore rotundatum arenato.

Elytra eadem sunt quam basis prothoracis latitudine, usque ad primam longitudinis partem tertiam subdilatata, ad finem fere recte angustata; ad finem utrumque elytrum late rotundatum, elevatum. Striato-punctata, striarum punctis grossis; interstitiis densissime, subtiliter punctulatis.

Pedes eiusdem sunt quam antennae colore.

Pube infra aureoflava, rare densa. Sulcis tarsorum mediorum male, anteriorum perspicue definitis.

Patria: Thibet.

Longit. 12—14 mm; latit. in prima longitudinis parte tertia 4,2—5 mm.

Ex affinitate *L. furunculosi* Cd.

### **Lacon Schwarzi** Pečírka i. l.

Rufus brunneus, nitidus, depressus; capite, disco prosternali, marginis anterioris parte media, elytrorum sutura plus minusve obscure brunneis. Praeter fasciam longitudinalem in prothoracis disco flavo squamosus.

Caput planum, dense fortiterque punctatum.

Antennis ferrugineo-brunneis, articulo secundo longitudine tertio fere duplo; ab articulo 4. fortiter serratis; articulo 5., 6. et 7. latitudine paulo longiore, articulo ultimo latitudine fere duplo longiore.

Prothorax paulo longius quam latus; post angulos anteriores rotundatos tenue rotundato-foveolatus. Pone eosdem marginibus lateralibus arcuatis, ante angulos posticos valde emarginatis. Angulis posticis divergentibus, acutis, carinatis; carina prope marginem lateralem sita, longissima, usque ad foveam post angulos posteriores prominens. Ad margines laterales densius fortiterque, disco disperse subtiliter punctato, post medium bituberculato.

Scutellum pentagonum, post basim subemarginatum, planum.

Elytra post callum humeralem fovea lata tenui subconstricta, adeo ut callus humeralis promineat. Post callum humeralem in prima longitudinis parte quarta latissima, deinde ad finem modice rotundata, finibus promiscue rotundatis. Punctato-striata, striarum punctis nigris, grossissimis, altis.

Pedes ferrugineo-brunnei, tibiis obscuris.

Infra subtiliter flavo-squamosus; sulcus tarsorum mediorum male, anteriorum perspicue definitis.

Patria: Thibet.

Longit.: 16,2—17 mm; latit. in prima longitudinis parte quarta 6 mm.

Ex affinitate *L. macroderi* Cd.

### **Lacon Schwarzi** var. n. **Pečírka**.

Thorace valde densius punctato, fortiter tuberculato, tuberculis transverse productis, inter ea ac angulos posticos foveae, quae ad *L. Schwarzi* vix perspectu. Anguli postici truncati. Elytrorum striae subtiliter punctatae.

### **Lacon adanensis** sp. n.

Dilute rubro-brunneus, nitidissimus, planus, latus, griseoflavus squamosus.

Caput modice convexum, in vertice longe tenue unisulcatum, fronte triangulariter concava.

Antennarum articulus tertius duplo longior quam secundus; antennae ab articulo quarto serratae.

Prothorax longitudine latiore, in prima parte tertia latissimus, ad angulos anticos quam ad posticos magis attenuatus. Margine laterali ante angulos posticos non emarginato. Angulis anticis rotundatis, posticis acutis, non carinatis. Disco subtiliter, disperse, lateribus densius punctato. Prothoracis basis ante scutellum elevata.

Scutellum planum, semiovale.

Elytra in prima longitudinis parte tertia latissima, deinde ad finem arcuate rotundata, finibus promiscue rotundatis. Brevia, prothorace non duplo longiora, striato punctata, striis leviter significatis, primis iuxta suturam difficile perspectu. Striarum punctis parvis, interstitiis planis, punctatis eiusdemmodi atque in striis.

Infra sulcis tarsorum mediorum, anteriorumque perspicue definitis.

Patria: Asia Minor: Adana.

Long.: 4 mm; lat.: 1,6 mm.

Ex affinitate *L. cyprii* Baudi.

### ***Compsolaeon tonkinensis* sp. n.**

Nigro-brunneus, planus, nitidus, geniculis, tarsis, antennisque ferrugineo-brunneis. Flavobrunneo squamosus; squamis in elytris seriatim posticis.

Caput planum, dense et grosse punctatum.

Antennarum articulus secundus tertio fere dimidio longior; articulis a quarto serratis, ultimo excepto longitudine latiore, quarto latissimo, ultimo magis dimidio longiore quam lato.

Prothorax longius quam latus, ad angulos anticos quam ad posticos magis attenuatus. Angulis anticis rotundatis, posticis truncatis, marginis lateralibus modice convexis, ante angulos posticos leviter emarginatis. Anguli postici forte carinati, carina prope marginem lateralem crenulatum adeo ut paribus fere intervallis inter se distent, sita, angulos anticos paene attingit. Prothorax densissime, satis fortiter, propter margines laterales paulum densius punctatus. Prothoracis basis perspicue marginata, ante scutellum elevata.

Scutellum quadrangulare, margine postico leviter arcuato.

Elytra in parte media (aut post eam) latissima, basis eorum eadem sunt quam basis prothoracis latitudine; ad finem utrumque elytrum separate rotundatum. Punctato-striata, striarum punctis grossissimis, profundis, interstitiis subconvexis, dense subtiliter punctulatis. Squamarum series duae in omnia interstitia positae.

Patria: Laos — Tonkin.

Longit.:  $9\frac{1}{2}$  mm, latit. in elytrorum parte latissima 3,7 mm.

### ***Compsolaeon himalayanus* sp. n.**

Robustus, nitidus, supra planus, in omnibus partibus rubro vel obscuro-brunneus; antennis pedibusque clare rufobrunneis.

Caput planum, dimidia parte concava; dense punctatum, punctis perspicue quam in prothorace subtilioribus.

Antennarum articulus tertius quam secundus paulum longius, ab articulo quarto antennae serratae, excepto ultimo longitudine latiore. Articulo quarto latissimo, ad finem articulis longitudine crescente, ultimo magis dimidio latitudine longiore. In parte media omnium articulorum partum planarum linea obscura percipitur.

Prothorax longius quam latus, marginibus lateralibus fortiter crenulatis, ad angulos anticos quam ad posticos magis attenuatus, angulis posticis truncatis, carinatis. Carina anteriorem prothoracis partem tertiam attingit. Prope marginem lateralem crenulatum sita est adeo ut paribus fere intervallis inter se distent. Dense ac grosse, propter margines laterales paulum densius punctatus.

tatus. Basis ante scutellum elevata. Linea media supra basim sine punctis. in exemplare uno usque ad marginem anteriorem cognoscitur.

Scutellum pentagonum, ad basim emarginatum, planum. Parte sua posteriore Cardiophorinarum scutellis simile.

Elytra in ultima longitudinis parte tertia latissima, deinde ad finem arcuate, punctato-striata; striis in disco subtilissime, ad finem perspicue punctatis. Striarum lateralium punctis altis, grossissimis. Squamarum series duae in omnia interstitia positae.

Sulcis femorum alteriorum definitis, impunctatis.

Patria: Himalaya.

Longit.: 14—15½ mm; latit. in elytrorum parte latissima 5—5¼ mm.

---