

Doc. Dr. Jan Obenberger:

**DVA NOVÉ MADAGASCARSKÉ DRUHY RODU PHLOCTEIS KERR.  
(COL. BUPR.)**

**DE DUABUS GENERIS PHLOCTEIS KERR. INSULAE MADAGASCARIS  
SPECIEBUS NOVIS (COL. BUPR.)**

Druhy rodu *Phlocteis* Kerr. patří k nejzajímavějším ze všech Agrilinů. Zdá se, že zvláště na Madagaskaru jsou velmi četnými druhy zastoupeny — jsou však vesměs velice vzácné a biologie jejich je neznáma. Nalézání jsou jen ojediněle a ve sbírkách jsou to většinou vzácnosti. Popsati jednotlivé druhy přesněji je věc značně obtížná, protože je zde velká řada těžce popisovatelných a nesnadno slovně vyjádřitelných detailů, pročež popisy musí vypadnouti nakonec velmi obšírně. Nehledě ale na tuto, spíše nedostatkem slovní vyjádřitelností podmíněnou obtížnost při tvoření diagnos, jsou to druhy vesměs neobvykle nápadné, krásné a vzájemě od sebe velice odlišné. Zdá se, že je to prastarý africký rod a také všechny druhy jsou archaického rázu. Typy obou druhů jsou uloženy v mé sbírce.

**1. *Phlocteis iridipennis* n. sp.**

Hab.: Madagascar: Midongy sud. Long.: 11, lat.: 3.5 mm.

Species robusta, elongata, elytrorum dorso subdeplanato. Colore subtus aeneo, capite thoraceque aeneocupreis, irregulariter ochraceopilosis, scutello cupreo, elytris roseocupreis, obscurius seriomicantibus, parte anteriori disci cyanescente, apice elytrorum cyaneo. Elytris pube nigra adhaerente, ornamento ochraceo et griseo undulato ornatis.

Capite satis magno, fronte valde lata, medio impressa et excavata, excavatione hac lata inter summum verticis et inter medium longitudinis frontis posita — fronte in medio transverse vallatim elevata, parte frontis anteriori valde declivi; vallo hoc a latere observato uti angulo quodam prominente. Lateribus frontis in tertia parte superiori marginis interni oculi leviter sinuatis, versus anticem oblique modice attenuatis. Oculis modice convexis. Antennis nigris, brevibus. Thorace longitudine duplo latiori, in quarta parte basali summum latitudinis attingente, angulis posticis late rotundatis, lateribus versus anticem longe curvatim attenuatis, margine antico fortiter bisinuato et modice profunde emarginato, margine basali fortiter sinuato, lobo medio lato, rotundato et satis producto. Superficie thoracis valde inaequali, lateribus carina acuta prae humerali sinuata longa, fere iam a basiusque fere ad anticem producta, notatis, prope hanc carinam lateraliter thorace late depresso, etiam ante basim transverse depresso. Medio disci thoracis longitudinaliter subelevato, linea media antice foveolatim, longitudinaliter excavata; superficie tota satis confuse et in sensu diverso dense strigosa, sed striis hic et ibi sub pubescentia irregulari indistincta. Pilositate hac sparsa, adhaerente, ochracea, vaga; mamulis parvis quinque in parte media disci positae maioribus et densioribus. Scutello magno, longe triangulari, postice acuminato, stria acuta interne (triangulum internum efficiente) marginato. Elytris latitudine circiter  $2\frac{1}{2}$  longioribus, lateribus subparallelis, leviter sinuatis, ante tertiam partem apicalem subdilatis, dein versus apicem longe, primo recte, oblique, dein arcuatim attenuatis, apicibus ipsis satis anguste rotundatis. Elytris utrimque

carina longitudinali elevata et usque ad tertiam partem apicalem distincta notatis, parte inter suturam et carinam deplanata, lata, humeris gibbiformiter elevatis; superficie praecipue antice dense, subtilissime, in sensu diverso striata, superficiei parte maiore glabra, maculo vel plagulis et fasciis ochraceis notata; ornamentis his e pilis totaliter adhaerentibus, in sensu diverso, irregulari dispositis compositis, ornamentis his uti sequitur dispositis: 1. macula parva subhumerali laterali. 2. macula parvula inter costam et suturam circiter in septima parte basali posita; 3. macula maiore, transversa in tertia parte anteriori inter suturam et inter costam posita; 4. macula parvula extra costam sublaterally posita. 5. fasciis duabus valde flexuosis, praeapicalibus, valde conspicuis, aureo ochraceis, postice potius griseis praeapicalibus, fere totum spatium inter tertiam partem posteriorem et quintam partem posteriorem occupantibus. Corpore subtus cupreo aeneo, sparse subtiliter, griseo piloso, sternitis 2, 3, 4, 5 lateraliter pilis aureis magis condensatis notatis. Sterniti basalis margine superiori (pleurali) reliephum cariniforme longitudinale laevigatum portante. Tergito anali supra in medio carinato, carina in forma spinae acutae angustae mediae producta.

## 2. *Phlocteis ambanjana* n. sp.

Hab.: Madagascar: Ambanja. Long.: 15, lat.: 4.8 mm.

Corpore toto purpureo- vel carmineo cupreo, leviter sericeomicante, elytris maculis et fasciis copiosis, dilaceratis argenteosericeis subtilibus notatis. Corporis forma generali speciem antecedentem appropinquans, sed nitidior et gracilior; longior et magis protractus. Apud *Ph. iridipennem* m. elytris abdomen lateraliter fere totaliter tegentibus, hic parte longa laterodorsali abdominis detecta et elytris valde angustioribus.

Capite satis magno, fronte satis lata, antice subparallela, medio sulco profundo ininterrupto notata, lateribus sulci inaequalibus et hic et ibi subgibbosis, antennis brevibus nigris, cyanescentibus. Thorace longitudie fere  $1\frac{3}{4}$  latiore, in quarta parte posteriori summum latitudinis attingente, angulis basalibus late rotundatis, parte basali valde obliquatim rotundata et attenuata; lateribus versus anticem longe, satis fortiter et fere recte attenuatis, margine antico leviter bisinuato et haud profunde emarginato; carina sinuata praehumerali valde forti et elevata; disco thoracis satis deplanato, utrimque ante basim late foveolatim impresso et in conspicue griseopubescente, interna parte praehumeralis depressione longitudinali vaga delimitata, antice etiam foveolis vel depressionibus aliquot superficialibus — quorum depressio ovalis in medio linea antice posita, brevi, satis profunda maxime est conspicua. Sculptura thoracis potius e punctis densissimis parvulis quam e rugis (hic solum hic et ibi antice et lateraliter visibilibus) composita. Scutello longe triangulari, immarginato, acuto, cyaneo. Colore capitis carmineo, thoracis carmineo cupreo; elytris obscurioribus, carminocupreis, in tertia parte apicali leviter cyaneonitentibus, carinis longitudinalibus costis elytralibus) solum in quarta parte anteriori laevigatis et magis elevatis, versus posticem punctatis et indistinctis, in parte praeapicali omnino evanescentibus. Partibus aspectu glabro uti in specie praecedente pilis valde inconspicuis, totaliter adhaerentibus nigris tectis; elytris utrimque maculis vel fasciis (potius partibus fasciolarum) circiter viginti notatis — his haud valde conspicuis atque partes dilaceratas fasciarum valde undulatarum in tertia parte basali, post medium et ante apicem positarum repraesentantibus. Corpore subtus purpureo violascente, abdomine densissime, subtilissime undulatim striato, fere glabro, abdominis parte latero-

superiori dense transverse rugosa, sternito basali (= sternito 1+2 iuncto) in parte laterali (superiori), prope marginem elytrorum posita reliepho parvo in angulo antico, reliepho altero anguloso, simili, in medio longitudinis lateraliter posito, hoc postice pilis griseis delimitato notato. Pedibus nigris. Sternito anali supra vage carinato, margine apicali medio in forma spinæ brevis producto.

---