

Doc. Dr. Jan Čbenberger:

**NOVÉ ORIENTÁLNÍ DRUHY RODU MELIBOEUS H. DEYR.
(COL. BUPR.)**

**DE GENERIS MELIBOEUS H. DEYR. REGIONIS ORIENTALIS
SPECIEBUS NOVIS (COL. BUPR.)**

Rod *Meliboeus* H. Deyr. je rozšířen v řadě druhů v oblasti palaearktické, v četných druzích o Africe a zvláště hojně v Asii. Odtud oddělil A. Thér y některé druhy, jež mají zvláštní rýhu pro uložení tykadél pod okrajem štítu, do zvláštního rodu *Nalanda* Théry. Tento rod je ale bohužel neudržitelný, protože existují všechny druhy přechodů od velmi ostrého takového vtisku až po slabý žlábek vpředu pod štítem a konečně až po normální tvar štítu bez rýhy; takovou plynulou řadu je možno zjistiti i u palaearktických druhů, které jsou celkem méně četné nežli druhy exotické. Čtyři druhy, jež zde popisují, odpovídaly by asi onomu rodu *Nalanda*, protože jejich vtisk tykadlový, pod štítem je velmi zřetelný. Tři z nich patří neobyčejně obtížné skupině, charakterisované modrými nebo modročernými krovkami a zlatovou hlavou a štítem. Tyto druhy lze nejnázne rozlišiti podle tvaru posledního tergitu, jenž mívá charakteristické zoubky a j. skulpturu, což je snadno i při pohledu shora viditelno. Typy všech těchto nových druhů jsou uloženy v mé sbírce.

1. *Meliboeus celebensis* n. sp.

Hab.: Celebes. Long.: 4.1, lat.: 1 mm.

Species valde nitida, convexa, glabra, sulculo antennali sublaterali thoracis instructa. Capite thoraceque nigroaeneis, nitidis, elytris violaceonigris, scutello nigro.

Capite magno, vertice desuper observato versus anticem late fortiter producto, medio leviter anguste sulcatulo, oculis convexis, valde postice lateraliter posit. Fronte transverse rugosa, glabra, antennis brevibus, nigris. Vertice sparse subsemicirculatim strigosis. Thorace longitudine longitudine circiter $1\frac{2}{3}$ latiore, circiter in tertia parte basali summum latitudinis attingente, versus basim haud, inconspicue, versus anticem rotundatim attenuato, angulis posticis fere rectis, margine antico late bisinuatim emarginato, basi bisinuata, lobo medio late producto. Parte dorsali discali aequaliter convexa et elevata, thorace lateraliter et ante basim late depresso, valde nitido, glabro, sparse aequaliter, acute transverse strigoso, strigis punctatis. Scutello transverso, postice producto. Elytris latitudine $2\frac{1}{2}$ longioribus: usque ad medium fere subparallelis, post medium subdilatis, versus apicem longe oblique attenuatis, apicibus late separatim rotundatis et sparse denticulatis. Elytris nitidissimis, aspectu glabro, sed in veritate ex omnibus punctis longulis, post rugas superficiei posit. capillo inconspicuo griseo nascente. Sculptura valde regulari, e striis transversis, serie punctorum postice marginatis composita. Elytris postice valde declivibus. Tergito anali medio longitudinaliter carinato, apice obtusangulo, nullo modo in spinam producto. Corpore subtus, pedibus, antennis nigris, glabris, nitidis, antennis in sulculo sublaterali thoracis posit.

2. *Meliboeus sinuaticollis* n. sp.

Hab.: Ceylon. Long.: 4, lat.: 0.9 mm.

Corpora subtus, antennis, pedibus, scutello nigris, glabris, fronte sericeo-

virescente, aureo, vertice lato rubro aureo, thorace et elytris laete coeruleis, thoracis lateribus aenescentibus.

Capite magno, lato, convexo, oculis convexis, nullo modo prominulis, fronte alutacea, sericea, latitudine $1\frac{1}{4}$ longiore, parallela, vertice lato, convexo, nullo modo impresso. Thorace longitudine $1\frac{2}{5}$ latiore, in tertia parte anteriori summum latitudinis attingente, lateribus ante basim breviter fere parallelis, angulis basalibus fere rectis. Medio disci convexae late subgibbose elevato, lateribus thoracis et parte basali depressis, basi bisinuata, ante scutellum producta, superficie satis dense, in dorso circulatim strigosa, impunctata; sub margine laterali thoracis sulco antennali profundo, acute delimitato. Scutello nigro, parvo, pentagonali, postice producto. Elytris latitudine $2\frac{2}{3}$ longioribus, in medio leviter subdilatis, versus apicem longe attenuatis, apicibus separatim satis late rotundatis. Elytris dorso subdeplanatis, satis grosse, plane, transverse rugosis, rugis ipsis granulosis, postice nullis punctis piliferis notatis. Superficie glabra, nitida. Tergito anali apice angulum circiter 80° (apice anguste obtuso) efficiente, supra carinato, carina postice nullo modo producta, margine posteriori denticulato.

3. *Meliboeus formosanus* n. sp.

Hab.: Formosa. Long.: 4—5.7, lat.: 1.2—1.5 mm.

Aspectu glabro, valde nitido. Capite thoraceque aureo-aeneis, valde nitidis, elytris laete viridibus, corpore subtus, pedibus, antennis, scutello nigris.

Capite desuper viso magno, lato, vertice late producto, oculis postice positis et convexis, impressione media nulla. Fronte nitida, leviter declivi, transverse rugosa, parte interoculari frontis longitudine haud latiore, lateribus rectis, versus anticem leviter attenuatis. Vertice magno, valde lato, nitidissimo, sparse punctato. Thorace longitudine circiter $1\frac{3}{4}$ latiore, circiter in medio summum latitudinis attingente, lateribus valde rotundatis, versus anticem fortiter rotundatim attenuatis, versus basim modice rotundatim attenuatis, angulis posticis subobtusis, basi bisinuata, lobo antescutellari lato, parum producto. Margine antico satis anguste, profunde bisinuatim emarginato, angulis anticis acutis. Parte media et anteriori dorsi late elevata et convexa, lateribus antice late subdepressis, basi late transverse subdepressa. Parte media discali satis dense, fortiter punctata, superficie altera satis dense, in medio circulatim striata. Sulco antennali sub margine laterali thoracis posito distincto et forti. Scutello nigro, parvo, pentagonali, postice longe producto. Elytris aspectu glabro, latitudine circiter $2\frac{1}{2}$ longioribus, post medium subdilatis, versus apicem longe arcuatim attenuatis, apicibus late simpliciter, separatim rotundatis, dorso plane convexo, superficie tota aequaliter, dense et subtiliter sculpta, sculpturae rugis transversalibus, postice serie punctorum ruga utroque notata, pilis e punctis nascentibus fere inconspicuis, brevissimis. Tergito anali nullo modo denticulato vel crenulato, apice satis anguste tridentato, dentibus externis rectangularibus, dente medio brevi; medio tergiti analis carinato. Corpore subtus glabro, angulo lateroposteriori coxarum posteriorum acut angulo, angulo hoc desuper uti spina brevissima acuta visibili.

4. *Meliboeus Rajah* n. sp.

Hab.: India or.: Gorintala. Long.: 4.3, lat.: 11 mm.

Species satis lata, brevis, aspectu glabro, valde nitida. Capite thoraceque aureis, thoracis parte latero anteriori virescente, scutello nigro, elytris nigrocyaneis, postice leviter violascentibus.

Capite desuper viso lato, conice subrotundato, oculis planis. Fronte dense punctata, lateribus frontis parallelis, parte interoculari frontis angusta, latitudine circiter $1\frac{1}{2}$ longiore. Vertice angusto, punctato. Thorace longitudine fere duplo latiore, a latere viso medio gibboso, lateribus in medio fere parallelis, dein versus anticem angulose, fortiter angustatis, postice versus basim oblique leviter angustatis, lateribus leviter, plane subdepressis, basi late transverse, subdepressa, parte discali anteriori transverse subgibbose elevata, disco medio fortiter sparse punctato et transverse strigoso, striis in parte centrali circulariter dispositis, lateribus inter striis fortiter dense punctatis. Scutello nigro, pentagonali, postice acute producto. Elytris latis, supra plane, regulariter convexis, latitudine circiter $2\frac{1}{3}$ longioribus, post medium leviter dilatatis, punctis longitudinalibus piliferis regulariter tectis et transverse, haud dense strigosis. Pilis brevissimis, in conspicuis. Tergito anali medio carinato, apice simpliciter rotundato, margine apicali integro. Coxarum posteriorum angulo lateroposteriori acuto. Corpore subtus glabro.

O P R A V A.

(C o r r e c t i o.)

V minulém ročníku tohoto Sborníku XX, 1942, p. 253 mezi zkratkami (Abbreviationes) schází »Kr. h.« = Krč, hliniště. — Za »Bř.« dlužno přidat »B.«, takže tato zkratka i s vysvětlením bude: Bř. B. = Břevnov, formace *Berteroa incana*. — Začátek odstavce na str. 252: Místo »Jeníkov« má být »Jeníkovice«.

Roubal.