


330.

*Dr. Josef Mařan:***DESCRIPTION D'UN NOUVEAU ACINOPUS LATR. DE CRÈTE.**

Coleoptera. Carabidae.

***Acinopus creticus* m. nov. sp.**

Long. 12—15,5 mm. Noir, brillant en dessus, les antennes et les palpes rougeâtres; pattes noirâtres à tarses rougeâtres. Tête de grosseur normale, plus étroite que le pronotum dans les deux sexes. Arête supérieure de la mandibule droite nettement échancrée, la partie la plus profonde de l'échancrure, fait donc face aux flancs du labre. Épistome très



peu échancré à son bord antérieur avec 2 pores à chacun de ses angles, très rarement avec un seul pore ou avec 3 pores sur chaque angle de l'épistome.

Pronotum large, peu convexe sur le disque, à bords latéraux arrondis, les angles postérieurs arrondis. Élytres subcylindriques, courtes, larges, quère en peu plus larges que le pronotum, peu convexes, brillantes,

à stries peu profondes, les interstries très peu convexes, sans ou quelquefois avec un seul point dorsal sur le 3<sup>e</sup> interstrie, avec 1—2 points au sommet du 5<sup>e</sup> et jusqu'à 6 points au bout du 7<sup>e</sup>, mais ces points manquent aussi quelquefois.

Prosternum sans goître chez le mâle, avec les flancs à ponctuation irrégulière plus ou moins fine, quelquefois très fine et même à peu près nulle.

Episternes métathoraciques courts, leur bord interne à peu près aussi long que leur bord basal à ponctuation irrégulière assez forte.

Abdomen à ponctuation moins profonde et moins dense.

Organ copulateur à partie apicale droite, l'apex un peu infléchi du côté dorsal, lorsqu'on l'examine de profil.

Espèce spéciale à la Crète; voisine d'*Acinopus subquadratus* BRULL. et *A. baudii* FIORI. Il s'en sépare pourtant par la forme du penis. Chez *A. subquadratus* BRULL. et *A. baudii* FIORI (race de Peloponnes) l'organe copulateur est de profil droit et bisinué à son extrémité chez *A. creticus* m. le penis est de profil droit non bisinué à son extrémité, le bout restant encore brièvement incliné en dedans, de la même forme générale que chez *A. picipes* OLIV., mais de face en forme de coin plus arrondi au bout, en peu assymétrique.

Bien différent des espèces *A. subquadratus* et *baudii* par ses tarses antérieurs et intermédiaires chez le mâle moins dilatés et dessus deux fois moins pubescent, par la ponctuation du pronotum et de l'abdomen plus fine, par sa forme générale plus courte, moins convexe etc. Du *A. pueli* SCHATZM. différent par la ponctuation du prosternum moins dense, par la forme du penis et par les caractères chétotaxiques.

Loc. class: Crète, plateau Nida dans les montagnes Psiloritis (Ida) jusque vers 1600 m. V. 1934, une série de 110 exemplaires.