

DESCRIPTIONS DE DEUX ESPÈCES NOUVELLES
DU GENRE MYCETOCHARA BERTH. (COLEOPTERA, ALLECULIDAE)

Josef Mařan

(Accepté pour la publication du 24. Mai 1954.)

1. *Mycetochara* (*Ernocharis* Thoms.) *cretica* n. sp.

Nigra, nitida, subtiliter nigropilosa, labro, parte anteriore clypei, articulis duobus primis parteque apicali articuli ultimi antennarum tarsisque rufescentibus. Capite fortiter sat dense punctato. Prothorace longitudini duplo latiore, fortiter haud dense punctato, in lateribus ante angulos posticos haud sinuato igitur nullo modo cordiformi. Elytris subparallelis, striis internis tribus distincte impressis, punctatis, stria quarta obsoleta, ceteris dispersis. Antennis articulis leviter compressis, articulo 5—10-o latitudine longiore. Ad sectionem *M. linearis* Illig. pertinens et cum *M. laticornis* Rtt r. proxime affinis. Habitat: Creta.

Allongé, brillant, orné d'une pubescence noirâtre soulevée. Noir, le labre, la partie antérieure du clypeus, les deux premiers articles des antennes et les tarse roussâtres, les jambes obscurcies, les cuisses noirâtres. Tête moins large que le prothorax, à ponctuation forte et assez rapprochée, tempes assez courtes (comme chez la ♀ de *M. linearis*). Antennes robustes, les articles 1 et 2 très courts, les articles 5—10 nettement plus longs que larges, noirâtres, le dernier roussâtre dans la partie apicale, un peu plus court que le précédent. Prothorax presque deux fois plus large que long, transversal, arrondi antérieurement, peu rétréci à la base à côtés non sinués avant les angles postérieurs, ces angles droits; très faiblement impressionné au milieu, à ponctuation assez forte mais assez éparse. Elytres un peu plus larges que le prothorax, subparallèles assez finement strié-ponctués, les 3 stries internes bien impressionnées, la 4^e peu distincte; les intervalles plus finement ponctués que les stries. Long. 5.5 mm.

D'après la description apparenté à *M. laticornis* Rtt r. du Liban, mais le prothorax à ponctuation moins dense, les élytres avec les 3 stries internes plus fortement impressionnées; se distingue en outre de toutes les espèces du groupe *M. linearis* Illig. par la forme du prothorax, qui est plus large, à côtés non sinués avant les angles postérieurs. *M. cretica* n. sp. ressemble aussi beaucoup à *M. jonica* Obenb., mais les articles

des antennes sont, chez cette espèce de l'île de Corfu, beaucoup plus courtes.

Loc. class.: Crête, Montagnes, Leuka-Ori. Type 1 ♀ provenant des chasses du Dr. Ot. Štěpánek et Dr. K. Táborský (V. 1938) dans les coll. entomologique au Musée National de Prague.

2. *Mycetochara* (*Ernocharis* Thoms.) *quadrispilota* n. sp.

Brunnea, obscurius pubescens, labro, clypeo, articulis 4 basalibus et articulo ultimo antennarum pedibusque rufotestaceis. Capite thoraceque subtiliter punctatis. Elytris subparallelis cum striis 4 internis profunde impressis, dense atque fortiter punctatis etiamque striis 5—6 etsi obsoletioribus tamen bene distinctis, macula oblongata humerali alteraque minori rotundata ante apicem rufotestacea ornatis.

Ad species *M. quadrimaculata* Latr. et *M. collina* ponenda, ab illis autem iam striis internis elytrorum valde profunde impressis fortissimeque punctatis bene distincta.

Habitat: Korea (1 ♀ *M. quadrispilota* Obenb. in litt.).

Allongé, brun, luisant, le dessus hérissé de poils grisâtres, mi-couchés. Labre, clypeus, les 4 articles basales et le dernier article des antennes, les tarsi et le dessous du corps d'un roux testacé. Elytres ornés de deux taches d'un roux testacé. Tête à ponctuation fine et peu rapprochée sur le front, les yeux assez grands, les tempes courtes. Antennes assez robustes, brunes, avec les 4 articles basales et le dernier article roux-testacés, le 1^{er} article allongé, le 2^e très court le 3^e 1½ plus long que le 4^e, les articles 5—11 plus longs que larges, le dernier aussi long que le précédent. Prothorax large, bien rétréci sur la base en ligne très légèrement sub-sinuée avant les angles postérieurs, ces angles subacuminés; convexe, creusé d'une fossette avant chaque quart externe de la base, déprimé assez largement sur la ligne médiane, marqué de points peu serrés. Elytres subparallèles, en peu plus larges que le prothorax, médiocrement convexes, les 4 stries internes très profondément impressionnées et marquées de points forts à disposition dense et régulière, les stries 5—6 plus fines mais bien visibles; bruns, orné de deux taches d'roux testacé. La première tache humérale longitudinalement ovale, en peu moins rapprochée de la base que du bord externe, la deuxième antéapicale plus petite, ovale, s'étendant depuis la deuxième strie jusqu'à la sixième. Intervalles marqués de points fins peu serrés. Long. 4.5 mm.

Resemble à *M. quadrimaculata* Latr., mais les élytres sont plus allongés, plus fortement striés, les taches antéapicales sont plus petites, plus arrondies et plus éloignées de l'apex, le prothorax et nettement plus rétréci sur la base.

Apparenté aussi à *M. collina* Lew. (Loc. class. Kashiwagi Japan) mais, d'après la description les stries des élytres sont chez cette espèce « not well defined », chez *M. quadrispilota* n. sp. ces stries sont au contraire très profondément impressionnées et très distinctes. 1 ♀ se trouvait dans la collection Obenberger sous le nom que je lui ai conservé.

Loc. class. Korea: Pu-ry-ong. Type 1 ♀ dans coll. Dr. J. Obenberger au Musée National de Prague.