

**NOVÝ DRUH KRASCE Z RODU CHRYSOBOTHRIS SOL.
Z GUATEMALY (COLEOPTERA, BUPRESTIDAE).**

**SUR UNE NOUVELLE ESPÈCE DU GENRE CHRYSOBOTHRIS SOL.
DE GUATÉMALA (COLEOPTERA, BUPRESTIDAE).**

JAN OBENBERGER

(Národní museum, entomologické oddělení, Praha)

Pan doc. Dr. habil. Günther Becker zaslal mi k určení krasce z rodu *Chrysobothris*, který se mu vylihl z kůry slabých větví středoaamerické borovice *Pinus rudis* E n d l. Uvedený badatel byl několik měsíců v Guatemale a nasbíral větvičky, ze kterých se mu pak jediný exemplář krasce vylihl v okolí místa Quezaltenango (Guatemala, C.—A.) ve výši 2.500 m. v měsíci květnu r. 1951. Tento druh podobá se velmi značně některým druhům ze Severní Ameriky. Je dosud neznámý a nepopsaný a patří do systematicky neobyčejně nesnadné a na druhy bohaté skupiny měďově zbarvených a různými proláklami a hrbolky na krovkách vyznačených druhů, která zejména se vyskytují v severní Americe a pak v hornatějších končinách Ameriky střední a jižní. Nálezce byl tak velmi laskav, že mi přenechal jediný typ tohoto druhu, který je uložen v Coll. Obenberger entomologického oddělení Národního musea v Praze. Pojmenoval jsem jej k počtě jeho objevitele.

***Chrysobothris beckeri* n. sp.**

Hab.: Quezaltenango, Guatémale, S.—A., el. 2.500 m, Mai 1951, élevé des rameaux du *Pinus rudis* E n d l. M. Doc. Dr. habil. Günther Becker (Berlin-Dahlem) lgt.

L'espèce présente m'était envoyée par M. le Dr G. Becker et porte son nom. Le type unique, cédé à moi très généreusement par M. Becker est conservé dans la Coll. Obenberger de la Section entomologique du Mus. Nat. de Prague.

Long.: 9,75, lat. 4,5 mm.

D'un bronzé cuivreux clair et légèrement luisant en dessus, d'un cuivreux plus clair et rougeâtre en dessous, avec la partie médiane de l'abdomen largement teintée de vert clair. Parties élevées de la face supérieure sont plus

obscuras. Pattes cuivreuses, tarsi noirâtres. Face supérieure à peu près glabre, le dessous à pubescence abondante grise et assez longue, peu dense.

Tête plane, à sculpture très fine, presque soyeuse, à polissité très courte, mais dense, blanche, un peu hérissée. Le front est plan, sans aucune trace d'une élévation transversale, qui se trouve chez beaucoup d'espèces voisines, à sculpture uniforme depuis le vertex, qui est étroit entre les yeux, jusqu'à l'épistome, qui est largement et subsinueusement échancré en arc. Au milieu du vertex une forte et étroite ligne élevée, courte et luisante, très distincte. Les antennes sont assez courtes, d'un bronzé obscur et peu luisant, presque noirâtres, l'article 3 est deux fois plus long que l'article 2, les deux articles en ensemble étant de la même longueur que l'article basal.

Prothorax environ $2\frac{1}{3}$ fois plus large que long, au bord antérieur profondément et largement échancré en arc légèrement subsinue, ayant la plus grande largeur dans le quart basal, aux bord latéraux assez fortement arrondis, plus fortement atténué en avant qu'en arrière, avec un sillon assez large et profond, très distinct au milieu, aux parties latérales assez déprimées, à surface assez inégale, à ponctuation très dense et condensée, assez grossière latéralement, plus fine et plus espacée vers le milieu, où les parties, delimitantes de part et d'autre le sillon médian sont luisantes et à ponctuation plus éparsée et isolée. Bord latéral est assez aigu, mais crénelé. Par l'aspect général et par la coloration les élytres ressemblent assez fortement à *Chr. floricola* Gory de l'Amérique du Nord, mais ils sont un peu plus larges, plus courts et plus arrondis postérieurement. Les dépressions et les élévations élytrales sont assez semblables comme chez l'espèce citée, mais les parties élevées sont ici plus aplanies et moins marquées. Les élytres sont un peu plus larges que le prothorax, parallèles jusqu'au milieu et puis atténués en ligne assez fortement arrondie vers le sommet, qui est assez largement conjointement arrondi, partie latérale arrondie étant finement et assez densément dentée. L'abdomen est assez luisant, surtout dans la partie médiane, sternite basal avec un étroit sillon longitudinal au milieu de sa moitié antérieure. Sternite anal au bord latéral uni, sans denticulation, largement subdéprimé au sommet au milieu, ici sans aucune trace d'une carène élevée, simplement et assez largement échancré en arc peu profond au sommet, entre deux épines apicales courtes. Sculpture abdominale est formée de ponctuation, un peu rugueuse longitudinalement, pas trop dense. Milieu de la saillie prosternale est étroitement lisse. Pattes assez courtes, fémurs antérieurs avec une dent distincte.

Ressemblance de cette espèce avec le *Chr. floricola* Gory est assez superficielle. Les élytres, arrondis conjointement, forme générale, surtout du prothorax et du sternite anal, caractérisé par la marge latérale simple et sans dentelures distinctes placent cette espèce à une distance des autres espèces à ressemblance superficielle.