

**GENERIS LAMPROPEPLA FAIRM. REVISIO (COL. BUPR.).  
REVISE RODU LAMPROPEPLA FAIRM. (COL. BUPR.).**

JAN OBENBERGER

(Entomologická laboratoř, ČSAV, Praha)

Rod *Lampropepla* Fairm. byl popsán Fairmairem v roce 1904 v *Ann. Soc. Entom. Belg.* XLVIII (1904) p. 231. Genotypem je *Chalcophopsis Rothschildi* Gahan, popsaný v *Ann. Nat. Hist.* 6<sup>e</sup> Sér. II. 1893, p. 224. Tento druh je také nejznámější a je nejvíce rozšířen ve sbírkách. Kerremans popsal tento rod pod názvem *Madecassia* Kerr. ve Wytzman, *Genera Ins.* fasc. 12, Buprest. (1903) a vyobrazil zde dokonce druh *L. (Madecassia) Rothschildi* Gah. na Tab. I, fig. 10. Jméno toto je však zadáno a Fairmaire je právem změnil. Dosud byly známy dva druhy, tvarem, zbarvením a skulpturou značně se od sebe lišící: *L. ophthalmica* Fairm., která tvarem těla upomíná na některé druhy rodu *Paracupta* H. Deyrolle a *L. Rothschildi* Kerr., spíše podobná některým velkým Chalcophorám.

Všechny známé druhy obývají Madagaskar a patří k velikým vzácnostem, které jsou jen velmi pořádku zastoupeny ve sbírkách, ačkoliv jsou to druhy veliké, nápadné a velmi ozdobné.

Dosud byly známy jen dva uvedené druhy. K nim připojuji nyní druh nový, který od obou druhů známých se velice liší a který představuje nový překvapující přírůstek fauny krasců Madagaskaru, jejíž bohatství ještě dlouho nebude vyčerpáno.

Genus *Lampropepla* Fairm. hucusque duabus speciebus gaudebat: *L. Rothschildi* Gahan et *L. ophthalmica* Fairm. Nunc hic tertia species generis huius splendidissimi describitur. Dom. Kerremans in Wytzman, *Genera Ins.* fasc. 12. Buprestidae, 1903, p. 82 speciem unicam, tempore hoc notam, in genus speciale *Madecassia* Kerr. separavit. Illud nomen genericum praeoccupatum anno 1904 Dom. Fairmaire (*Ann. Soc. Ent. Belg.* XLVIII, 1904, p. 231) in nomen *Lampropepla* Fairm. permutavit atque speciem alteram, *L. ophthalmicam* descripsit.

Genotypus generis huius est *Lampropepla Rothschildi* Gahan, quae species minus rara quam species altera, *L. ophthalmica* Fairm. esse videtur. Species ambae solum in insula Madagascar occurrunt atque valde rare inveniuntur, qua de causa praecipue illa *L. ophthalmica* Fairm. solum in collectionibus maximis invenitur. His speciebus ambabus species tertia hic additur. Quae species forma, colore, sculptura illis praecedentibus valde diffinis esse videtur.

*Lampropepla Fairmairei* n. sp.

Hab.: Madagascar (localitas specialis ignota). Long.: 30. lat.: 8,5 mm.

Species elongata, protracta, postice longe attenuata, gracilis. Colore superficiei obscure piceo aenescente, impressionibus variegatis punctiformibus elytrorum atque sulcis tribus thoracis in fundamento aureovirescentibus, capite potius virescente, antennarum articulis ambobus basalibus viridibus, his sequentibus nigrocyaneis, pedibus virescentibus, tarsis viridibus.

Capite parvo, sparse breviter albo pubescente, oculis convexis, sed solum paulo prominentibus, parte interoculari frontis latitudine circiter  $1\frac{1}{2}$  longiori, versus verticem in linea recta attenuata. Fronte medio supra linatim impressa et depressa, sculptura antice satis grossa, irregulariter rugulosa et punctata, punctis versus verticem subtilioribus. Epistomate subangulatim profunde emarginato, labro arcuatim emarginato et valde dense in emarginatione piloso. Antennis satis gracilibus, satis longis (usque ad tertiam partem basalem thoracis productis); articulo basali omnium longissimo, articulo secundo parvulo, his ambobus viridibus (sequentibus obscuratis); articulo tertio latitudine duplo longiore, articulo quarto articulum tertium longitudine paulo superante, articulo quinto illo tertio paulo brevioribus, longitudine articulorum sequentium versus apicem antennae passim diminvente, articulo ultimo parvulo. Thorace trapezoidali, in basi summum latitudinis attingente, lateribus versus angulos anticos in linea fere recta attenuatis, margine antico leviter bisinuato, lobo medio late breviter producto. Thorace modice convexo, lineis impressis angustis tribus aureopunctatis sulciformibus notato: linea media profunde impressa angusta atque duabus lineis sinuatis lateralibus. His lineis ab angulis anticis primo recte, dein fere a medio oblique versus quartam partem interiorum basis productis. Impressionem hac antice angulatim post marginem anticum fere ad medium in linea transversali recta producta. Hac linea impressa laterali et anteriori reliephum laevigatum, parum conspicuum, impunctatum externe bene delimita, reliepho hoc interne, versus sulcum medium solum valde indistincte delimitato. Thoracis basis prope angulos basales breviter longitudinaliter depressiusculo. Parte anteriori et media solum vage irregulariter subtiliter punctata, lateribus fortius et minus sparse punctatis. Margine basali thoracis anguste laevigato, viridi, nitido. Scutello parvulo. Elytris thorace parum, sed distincte latioribus latitudine  $2\frac{1}{2}$  longioribus, usque post medium parallelibus, modice convexis, dein versus apicem longe arcuatim attenuatis, in parte hac obliqua lateraliter sulculo lato pubescente notatis, apice angusto, utrimque acuminato, margine lateroposteriori denticulis acutis 5—6 notato. Elytris costulis elevatis tribus signatis, illa externa vagiore; prope tertiam partem posteriorem (inter sulcum lateralem et inter costulam subsuturalem) reliepho rotundo nigroviolaceo, valde distincto, nitido notatis; superficiei altera omnino variegata punctata et in punctis et impressionibus dense, subtiliter, uti apud *L. ophthalmicam* Fairm. pilosa, sed impressionibus his multo minoribus. Parte apicali (in tertia parte apicali) inter costulas dense aequaliter, sed haud conspicue pubescenti, reliephis ambobus pubes-

centia simili anguste circumdatis. Corpore subtus obscuro, in depressionibus viridiaeneo, dense irregulariter inter irregulares rugositates abdominis piloso, pilositate hac subochracea. Processu prosternali angusto, apice acuminato, medio subsulcato, grosse, sparse, irregulariter punctato. Sternito anali lateribus et apice dense pubescentibus, reliepho angusto obscuro subtriangulari medio glabro. Pedibus satis brevibus et satis fortibus, tarsis viridibus, tarsorum posteriorum articulo basali longitudine illos tres articulos sequentes adaequante.

Species haec ab ambabus hucusque speciebus notis valde distat atque discrepat. Tres huius generis species uti sequitur discernendae sunt:

- 1 (4) Species maiores. Elytris reliepho nullo notatis. Reliephis thoracis omnino optime delimitatis, nigris, nitidissimis.
- 2 (3) Species longior, supra postice minus depressiuscula. Depressionibus thoracis laete viridibus vel smaragdineis, elytris purpureoviolascentibus, minute dense viridipunctatis. Long. 46—50 mm. Madagascar: Plateau d'Androy, Ranonamty, Befotaka, Betafo, Tananarive . . .  
*Lampropepla Rothschildi* G a h a n.
- 3 (2) Species latior, elytris postice subdepressis. Superficie tota nigro-cyanescente, punctis auratis notata, punctis et pubescentia ante tertiam partem apicalem vage transverse condensatis. Long. 38—40 mm. Madagascar: Behara (Androy), Ranonamty, Région S. O. . . .  
*Lampropepla ophthalmica* F a i r m.
- 4 (1) Species minor et gracilior, superficie obscure aeneopicea, reliephis thoracis interne male delimitatis. Elytris in tertia parte apicali reliepho nigroviolaceo valde distincto circulari notato. Long. 30 mm. Madagascar . . . . . *Lampropepla Fairmairei* sp. nn.

#### Conspectus specierum.

1. *Lampropepla Fairmairei* n. sp. Madagascar
2. *Lampropepla ophthalmica* Fairmaire,  
*Ann. Soc. Ent. Belg.* XLVIII, 1904 p. 231  
 Madagascar
3. *Lampropepla Rothschildi* G a h a n,  
*Chalcophoropsis Rothschildi* Gahan, *Ann. Nat. Hist.* 6<sup>e</sup> Sér. II. 1893, p. 223.  
*Madecassia Rothschildi* Kerremans in Wytsman, *Genera Ins.* fasc. 12, Buprestidae, I, 1, fig. 10.  
*Lampropela Rothschildi* Fairmaire, l. c. p. 231.  
 Madagascar.